

Appunti del corso di Elementi di Algebra  
Superiore  
Prof. Giovanni Gaiffi (A.A. 2007/08)

Giacomo d'Antonio

6 ottobre 2008

# Indice

<b>1</b>	<b>Moduli</b>	<b>4</b>
1.1	Moduli proiettivi e moduli liberi . . . . .	9
1.1.1	Moduli proiettivi su domini ad ideali principali . . . . .	15
1.2	Moduli iniettivi . . . . .	18
1.2.1	Moduli iniettivi su domini ad ideali principali . . . . .	20
1.2.2	Moduli coliberi . . . . .	23
<b>2</b>	<b>Categorie e Funtori</b>	<b>28</b>
2.1	Funtori . . . . .	30
2.1.1	Trasformazioni naturali . . . . .	31
2.1.2	Biduale di spazi vettoriali . . . . .	32
2.2	Costruzioni universali . . . . .	33
2.2.1	Prodotti e coprodotti di oggetti in categorie . . . . .	33
2.2.2	Pull back e push out . . . . .	34
2.3	Funtori aggiunti . . . . .	37
<b>3</b>	<b>Estensioni di moduli</b>	<b>43</b>
3.1	Il funtore Ext . . . . .	50
3.2	Prodotto tensore e funtore Tor . . . . .	60
3.2.1	Il funtore Tor . . . . .	64
<b>4</b>	<b>Funtori derivati</b>	<b>68</b>
4.1	Complessi . . . . .	68
4.1.1	Categorie additive . . . . .	68
4.1.2	Caratteristica di Eulero . . . . .	72
4.1.3	Successione esatta lunga in omologia . . . . .	74
4.1.4	Successione Hom-Ext . . . . .	75
4.2	Omotopia . . . . .	78
4.3	Funtori derivati . . . . .	79
4.3.1	Risoluzioni . . . . .	80
4.3.2	Prima successione esatta lunga per i funtori derivati . . . . .	84

4.3.3	Seconda successione esatta lunga per i funtori derivati .	88
<b>5</b>	<b>Omologia e coomologia di gruppi</b>	<b>91</b>
5.1	Digressione topologica . . . . .	94
5.2	Ancora su $H^1(G, A)$ . . . . .	96
5.2.1	Applicazione: Teorema 90 di Hilbert . . . . .	99
5.3	$\mathbb{Z}[G]$ -risoluzioni proiettive di $\mathbb{Z}$ . . . . .	101
5.3.1	Bar-resolution omogenea . . . . .	101
5.3.2	Bar-resolution non omogenea . . . . .	102
5.4	Prodotti semidiretti ed estensioni . . . . .	105
5.5	Cambio di anelli . . . . .	111
<b>6</b>	<b>Coomologia delle algebre di Lie</b>	<b>116</b>
6.1	Algebra involupante universale . . . . .	117
6.2	Coomologia delle algebre di Lie . . . . .	119
6.2.1	Risoluzione speciale . . . . .	120
6.3	Algebre semisemplici e risolubili . . . . .	121
6.3.1	Lemmi di Whitehead . . . . .	122
6.3.2	Il teorema di Levi-Malcev . . . . .	124
<b>7</b>	<b>Cenni sulle successioni spettrali</b>	<b>127</b>
7.0.3	Moduli filtrati differenziali . . . . .	127
7.0.4	Coppie esatte . . . . .	129

# Capitolo 1

## Moduli

26/02/08

**Definizione 1.** Sia  $\Lambda$  un anello con unità (non necessariamente commutativo),  $M$  un gruppo abeliano; se esiste  $\omega : \Lambda \rightarrow \text{End } M$  omomorfismo di anelli allora  $M$  si dice  $\Lambda$ -modulo.

Possiamo anche presentare un modulo nel seguente, più familiare, modo:

**Definizione 2.** Un gruppo abeliano  $M$  si dice  $\Lambda$ -modulo *sinistro* se esiste un'applicazione  $\omega : \Lambda \times M \rightarrow M$  (e scriviamo  $\omega(\lambda, v) = \lambda v$ ) tale che per ogni  $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$  e  $v, v_1, v_2 \in M$  valgono:

$$(1) (\lambda_1 + \lambda_2)v = \lambda_1 v + \lambda_2 v$$

$$(2) (\lambda_1 \lambda_2)v = \lambda_1(\lambda_2 v)$$

$$(3) 1v = v$$

$$(4) \lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$$

Se tentiamo di interpretare  $\omega$  nella definizione 1 come moltiplicazione a destra incappiamo in un problema:

$$\begin{aligned} v(\lambda_1 \lambda_2) &= \omega(\lambda_1 \lambda_2)(v) = (\omega(\lambda_1) \circ \omega(\lambda_2))(v) = \omega(\lambda_1)(\omega(\lambda_2)(v)) = \\ &= \omega(\lambda_1)(v \lambda_2) = (v \lambda_2) \lambda_1. \end{aligned}$$

Per ovviare definiamo

$$\Lambda^{opp} = \{\lambda^{opp} : \lambda \in \Lambda\}.$$

$\Lambda^{opp}$  è un anello con le operazioni

$$\begin{aligned} \lambda_1^{opp} + \lambda_2^{opp} &= (\lambda_1 + \lambda_2)^{opp} \\ \lambda_1^{opp} \lambda_2^{opp} &= (\lambda_2 \lambda_1)^{opp}. \end{aligned}$$

**Definizione 3.** Un gruppo abeliano  $M$  si dice  $\Lambda$ -modulo destro se è un  $\Lambda^{opp}$ -modulo sinistro.

*Esempio 1.* - Sia  $K$  un campo e  $V$  un  $K$ -spazio vettoriale;  $T \in \text{End } V$ ; consideriamo l'anello  $K[T]$  (dei polinomi in  $T$  a coefficienti in  $K$ ); allora  $K[T]$  agisce nel modo noto su  $V$  e  $V$  risulta essere un  $K[T]$ -modulo.

- Sia  $G$  un gruppo finito che agisce su di uno spazio vettoriale  $V$ ; cioè esiste un omomorfismo  $\rho : G \rightarrow \text{Aut } V$  (e scriviamo  $\rho(g)(v) = gv$ ); costruiamo l'anello

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} \gamma_g g : \gamma_g \in K \right\},$$

con la moltiplicazione

$$\left( \sum_{g \in G} \gamma_g g \right) \left( \sum_{x \in G} \gamma_x x \right) = \sum_{g, x \in G} \gamma_g \gamma_x gx;$$

allora  $V$  è un  $K[G]$ -modulo con l'azione  $\rho$ .

**Definizione 4.** Dati  $M, N$   $\Lambda$ -moduli,  $\varphi : M \rightarrow N$  si dice *omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli* se è un omomorfismo di gruppi abeliani e per ogni  $\lambda \in \Lambda, v \in M$   $\varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v)$ .

**Definizione 5.** Sia  $\varphi : A \rightarrow B$  omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli; il *conucleo* di  $\varphi$  è  $\text{coKer } \varphi = B/\text{Im } \varphi$ .

La notazione del seguente teorema verrà utilizzata durante tutto il corso; si legge “dato il seguente diagramma commutativo di  $\Lambda$ -moduli con righe esatte vale..”.

**Teorema 1.**  $\Lambda$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{\nu} & A & \xrightarrow{\varepsilon} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \alpha' \downarrow & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha'' & & \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\eta} & B & \xrightarrow{\beta} & B'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Se due tra  $\alpha, \alpha'$  e  $\alpha''$  sono isomorfismi allora anche il terzo lo è.

*Dimostrazione.* (**Caso  $\alpha', \alpha''$  isomorfismi**) Mostriamo l'iniettività di  $\alpha$ ; sia  $a \in \text{Ker } \alpha$ , allora  $\alpha'' \circ \varepsilon(a) = \beta \circ \alpha(a) = 0 \Rightarrow (\alpha'' \text{ iniettivo}) a \in \text{Ker } \varepsilon = \text{Im } \nu \Rightarrow a = \nu(a')$ . Ora  $\eta \circ \alpha'(a') = \alpha \circ \nu(a') = 0 \Rightarrow (\alpha' \text{ ed } \eta \text{ iniettivi}) a' = 0 \Rightarrow a = 0$ . Vediamo la surgettività; sia  $b \in B$ ,  $\alpha'' \circ \varepsilon$  surgettiva  $\Rightarrow \beta(b) = \alpha'' \circ \varepsilon(a)$  e  $\beta \circ \alpha(a) = \alpha'' \circ \varepsilon(a) = \beta(b) \Rightarrow b - \alpha(a) \in \text{Ker } \beta = \text{Im } \eta \Rightarrow b = \alpha(a) + \eta(b')$ . Ma  $\alpha'$  è surgettiva, perciò  $b' = \alpha'(a')$  ed  $\eta(b') = \eta \circ \alpha'(a') = \alpha \circ \nu(a')$  da cui  $b = \alpha(a + \nu(a'))$ .

Moduli

**(Caso  $\alpha, \alpha''$  isomorfismi)** Sia  $a \in \text{Ker } \varepsilon$ , allora  $\beta \circ \alpha(a) = \alpha'' \circ \varepsilon(a) = 0 \Rightarrow \alpha(a) \in \text{Ker } \beta$ , d'altronde se  $\alpha(a) \in \text{Ker } \beta$  allora  $\alpha'' \circ \varepsilon(a) = 0 \Rightarrow a \in \text{Ker } \varepsilon$ ; perciò  $\alpha(\text{Ker } \varepsilon) = \text{Ker } \beta$  ed  $\alpha|_{\text{Ker } \varepsilon} : \text{Ker } \varepsilon \rightarrow \text{Ker } \beta$  è un isomorfismo. Ora  $\nu : A' \rightarrow \text{Ker } \varepsilon$  ed  $\eta : B' \rightarrow \text{Ker } \beta$  sono isomorfismi, inoltre per la commutatività del diagramma  $\alpha' = \eta^{-1} \circ \alpha|_{\text{Ker } \varepsilon} \circ \nu$  ed è isomorfismo.

**(Caso  $\alpha', \alpha$  isomorfismi)** Osserviamo che  $\alpha \circ \nu(A') = \eta \circ \alpha'(A') = \eta(B')$  (perché  $\alpha'$  è surgettivo). Dunque  $\alpha$  induce un isomorfismo sui conuclei

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} : A/\nu(A') &\rightarrow B/\eta(B') \\ [a] &\mapsto [\alpha(a)]. \end{aligned}$$

D'altra parte anche  $\varepsilon$  e  $\beta$  inducono isomorfismi

$$\begin{aligned} \tilde{\varepsilon} : A/\nu(A') &\rightarrow A'', & \tilde{\beta} : B/\eta(B') &\rightarrow B'' \\ [a] &\mapsto \varepsilon(a) & [b] &\mapsto \beta(b) \end{aligned}$$

ed è immediato verificare che  $\alpha'' = \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha} \circ \tilde{\varepsilon}^{-1}$  e quindi è isomorfismo.  $\square$

Osserviamo che perché il teorema sia vero devono esistere tutti e tre gli omomorfismi  $\alpha, \alpha'$  e  $\alpha''$ ; infatti consideriamo il seguente esempio

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{2\cdot} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow id & & & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{n \mapsto (n, [n])} & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \xrightarrow{\beta} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\beta$  si può definire in modo che la seconda riga sia esatta ma non esiste  $\alpha : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  che fa commutare il diagramma perché altrimenti sarebbe un isomorfismo.

*Esercizio 1.* Dare controesempi in cui non esistono  $\alpha'$  od  $\alpha''$ .

*Dimostrazione.* Non si possono dare controesempi perché il fatto è vero. Supponiamo di avere il seguente diagramma commutativo con righe esatte dove  $\alpha$  ed  $\alpha''$  sono isomorfismi:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{\nu} & A & \xrightarrow{\varepsilon} & A'' \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha'' \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\eta} & B & \xrightarrow{\beta} & B'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Allora come nella dimostrazione precedente  $\alpha_{|\text{Ker } \varepsilon} : \text{Ker } \varepsilon \rightarrow \text{Ker } \beta$  è isomorfismo e definendo  $\alpha' = \eta^{-1} \circ \alpha_{|\text{Ker } \varepsilon} \circ \nu$  si ha un isomorfismo che fa commutare il diagramma.

Allo stesso modo se abbiamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{\nu} & A & \xrightarrow{\varepsilon} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \alpha' \downarrow & & \downarrow \alpha & & & & \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\eta} & B & \xrightarrow{\beta} & B'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

come prima  $\alpha, \varepsilon$  e  $\beta$  inducono gli isomorfismi  $\tilde{\alpha}, \tilde{\varepsilon}$  e  $\tilde{\beta}$  e l'omomorfismo  $\alpha'' = \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha} \circ \tilde{\varepsilon}^{-1}$  fa commutare il diagramma.  $\square$

**Il gruppo degli omomorfismi** Siano  $A, B$   $\Lambda$ -moduli; allora  $\text{Hom}_\Lambda(A, B)$  è un gruppo abeliano con l'operazione

$$(\varphi + \psi)(a) = \varphi(a) + \psi(a).$$

Ci chiediamo adesso se  $\text{Hom}_\Lambda(A, B)$  è un  $\Lambda$ -modulo con l'operazione

$$(\lambda\varphi)(a) = \lambda(\varphi(a)) = \varphi(\lambda a).$$

Notiamo che

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda_1 \lambda_2 a) &= \lambda_1 \lambda_2 \varphi(a) = (\lambda_1 \lambda_2 \varphi)(a) = \\ (\lambda_1(\lambda_2 \varphi))(a) &= \lambda_1((\lambda_2 \varphi)(a)) = (\lambda_2 \varphi)(\lambda_1 a) = \varphi(\lambda_2 \lambda_1 a). \end{aligned}$$

Perciò se  $\Lambda$  è commutativo  $\text{Hom}_\Lambda(A, B)$  è un  $\Lambda$ -modulo con l'operazione ovvia.

**Un paio di funtori** Siano  $A, B, C$   $\Lambda$ -moduli; possiamo associare ad ogni omomorfismo di moduli  $\beta : B \rightarrow C$  un omomorfismo di gruppi  $\beta_* : \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$  definendo  $\beta_*(\varphi) = \beta \circ \varphi$ . Con queste associazioni valgono le seguenti proprietà ( $D$  è un altro  $\Lambda$ -modulo e  $\gamma : C \rightarrow D$  un omomorfismo di moduli):

$$(1) (\gamma \circ \beta)_* = \gamma_* \circ \beta_*$$

$$(2) \beta = id_B \Rightarrow \beta_* = id_{\text{Hom}(A, B)}$$

Si dice che  $\text{Hom}(A, \cdot)$  è un *functore covariante* tra la categoria dei  $\Lambda$ -moduli e quella dei gruppi abeliani.

Ma possiamo anche fare un'altra cosa: a  $\beta : B \rightarrow C$  associamo l'omomorfismo di gruppi  $\beta^* : \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(B, A)$  definito da  $\beta^*(\varphi) = \varphi \circ \beta$ . E ancora sono verificate le proprietà:

## Moduli

$$(1) (\beta \circ \gamma)^* = \gamma^* \circ \beta^*$$

$$(2) id^* = id$$

Si dice che  $\text{Hom}(\cdot, A)$  è un *functore controvariante* tra la categoria dei  $\Lambda$ -moduli e quella dei gruppi abeliani.

**Teorema 2.**  $\Lambda$

$$0 \longrightarrow B' \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varepsilon} B''$$

Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo allora la successione di gruppi abeliani

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B') \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(A, B) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}(A, B'')$$

è esatta.

*Dimostrazione.* Osserviamo che  $\varepsilon \circ \mu = 0 \Rightarrow \varepsilon_* \circ \mu_* = 0 \Rightarrow \text{Im } \mu_* \subseteq \text{Ker } \varepsilon_*$ , vediamo che  $\text{Ker } \varepsilon_* \subseteq \text{Im } \mu_*$ . Sia  $\varphi \in \text{Ker } \varepsilon_*$  allora  $\varepsilon \circ \varphi = 0$  cioè per ogni  $a \in A$   $\varepsilon(\varphi(a)) = 0$  e quindi  $\varphi(a) \in \text{Im } \mu$ ; ma  $\mu$  è iniettiva e quindi esiste un unico  $b \in B'$  tale che  $\mu(b) = \varphi(a)$  ed è ben definita  $\vartheta : A \rightarrow B'$  con  $\vartheta(a) = b$ ; è immediato verificare che  $\vartheta$  è omomorfismo e  $\mu^*(\vartheta) = \varphi$ .

Veniamo all'iniettività di  $\mu^*$ . Sia  $\varphi : A \rightarrow B'$  tale che  $\mu \circ \varphi = \mu_*(\varphi) = 0$ , allora  $\text{Im } \varphi \subseteq \text{Ker } \mu = (0) \Rightarrow \varphi = 0$ .  $\square$

**Teorema 3.**  $\Lambda$

$$B' \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varepsilon} B'' \longrightarrow 0$$

Allora la successione di gruppi abeliani

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(B'', A) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}(B, A) \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(B', A)$$

è esatta.

*Dimostrazione.* Mostriamo che  $\varepsilon^*$  è iniettiva; sia  $\varphi : B'' \rightarrow A$  tale che  $\varphi \circ \varepsilon = \varepsilon^*(\varphi) = 0$ , allora  $B'' = \text{Im } \varepsilon \subseteq \text{Ker } \varphi \Rightarrow \varphi = 0$ .

Come sempre  $\varepsilon \circ \mu = 0 \Rightarrow \mu^* \circ \varepsilon^* = 0 \Rightarrow \text{Im } \varepsilon^* \subseteq \text{Ker } \mu^*$ . Sia  $\varphi \in \text{Ker } \mu^*$ ,  $\varphi \circ \mu = \mu^*(\varphi) = 0 \Rightarrow \text{Im } \mu = \text{Ker } \varepsilon \subseteq \text{Ker } \varphi$  e quindi è ben definito l'omomorfismo

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : B'' &\rightarrow A \\ \varepsilon(b) &\mapsto \varphi(b). \end{aligned}$$

Infatti se  $\varepsilon(b_1) = \varepsilon(b_2)$ , allora  $b_1 - b_2 \in \text{Ker } \varepsilon \subseteq \text{Ker } \varphi \Rightarrow \varphi(b_1) = \varphi(b_2)$  e per definizione  $\tilde{\varphi}$  verifica  $\varepsilon^*(\tilde{\varphi}) = \tilde{\varphi} \circ \varepsilon = \varphi$ .  $\square$

Osservazione 1. Se anche fosse

$$0 \longrightarrow B' \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varepsilon} B'' \longrightarrow 0$$

non potremmo dire che le successioni

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B') \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(A, B) \xrightarrow{\varepsilon_*} \text{Hom}(A, B'') \longrightarrow 0$$

e

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(B'', A) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}(B, A) \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(B', A) \longrightarrow 0$$

siano esatte. Infatti consideriamo il solito controesempio

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mu=n\cdot} \mathbb{Z} \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

allora

$$\varepsilon_* : \underbrace{\text{Hom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})}_{=(0)} \rightarrow \underbrace{\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})}_{\neq(0)}$$

non è surgettivo. Inoltre se scegliamo  $B = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  abbiamo  $\mu^* : \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  e  $\mu(k) = nk \Rightarrow \mu^*(\varphi)(k) = \varphi(nk) = n\varphi(k) = 0$  e quindi  $\mu^* = 0$  e non è surgettiva.

## 1.1 Moduli proiettivi e moduli liberi

Vogliamo dare delle condizioni per cui la  $\varepsilon_*$  (o la  $\mu^*$  nel caso controvariante) sia surgettiva. Vieni fuori che nel caso controvariante questa è una proprietà di  $B''$  ed è sufficiente che  $B''$  sia:

**Definizione 6.** Un modulo  $P$  si dice *proiettivo* se

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \swarrow \vartheta & \downarrow \varphi \\ A & \xrightarrow{\sigma} & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

Cioè se per ogni coppia di moduli  $A, B$  e omomorfismi  $\sigma : A \rightarrow B$  surgettivo,  $\varphi : P \rightarrow B$  esiste  $\vartheta : P \rightarrow A$  tale che  $\sigma \circ \vartheta = \varphi$ .

**Proposizione 4.** Se  $A$  è un modulo proiettivo e

$$0 \longrightarrow B' \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varepsilon} B'' \longrightarrow 0$$

allora

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B') \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(A, B) \xrightarrow{\varepsilon_*} \text{Hom}(A, B'') \longrightarrow 0$$

è esatta.

Moduli

*Dimostrazione.* L'unica cosa da dire è che  $\varepsilon_*$  è surgettiva; sia  $\varphi \in \text{Hom}(A, B'')$  allora esiste  $\vartheta : A \rightarrow B$  tale che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & \swarrow \vartheta & \downarrow \varphi \\ B & \xrightarrow{\varepsilon} & B'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

e quindi  $\varphi = \varepsilon \circ \vartheta = \varepsilon_*(\vartheta)$ . □

**Definizione 7.** Sia  $F$  un  $\Lambda$ -modulo ed  $S \subseteq F$  un sottoinsieme,  $F$  si dice *modulo libero su  $S$*  se per ogni  $\Lambda$ -modulo  $A$  e funzione  $\varphi : S \rightarrow A$  esiste un unico omomorfismo  $\tilde{\varphi} : F \rightarrow A$  tale che  $\tilde{\varphi}|_S = \varphi$ .

Equivalentemente un  $\Lambda$ -modulo è libero su  $S$  se  $S$  è un insieme di generatori per  $F$  *privo di relazioni*; cioè tale che  $\sum_{s \in S} \lambda_s s = 0 \Rightarrow \lambda_s = 0 \forall s \in S$  (la somma si intende finita), o ancora se per ogni  $v \in F$  esiste un'unica combinazione lineare finita  $\sum_{s \in S} \lambda_s s = v$  o infine se  $F \cong \bigoplus_{s \in S} \Lambda$ .

Un  $\Lambda$ -modulo  $F$  si dice *libero* se esiste  $S \subseteq F$  tale che  $F$  è libero su  $S$ .

**Proposizione 5.** Un modulo libero è proiettivo

*Dimostrazione.* Sia  $F$   $\Lambda$ -modulo libero su  $S \subseteq F$  e sia  $\sigma : A \rightarrow B$  omomorfismo surgettivo e  $\varphi : F \rightarrow B$  omomorfismo; allora definiamo per ogni  $s \in S$   $f(s) \in A$  tale che  $\sigma(f(s)) = \varphi(s)$  e sia  $\vartheta : F \rightarrow A$  tale che  $\vartheta|_S = f$ ; ora  $\sigma \circ \vartheta - \varphi : F \rightarrow B$  è un omomorfismo nullo su  $S$  e quindi (sempre per la definizione di modulo libero ma usando l'unicità) è l'omomorfismo nullo. □

*Osservazione 2.* Se  $\Lambda$  è un anello commutativo è ben definito il *rango* di un modulo libero (cioè la cardinalità, costante, delle sue basi); ma nel caso generico ci sono dei problemi, vediamo un esempio. Sia  $V = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$  e  $\Lambda = \text{End}(V)$ ,  $V \cong \left( \bigoplus_{i \text{ pari}} \mathbb{R} \right) \oplus \left( \bigoplus_{i \text{ dispari}} \mathbb{R} \right) \Rightarrow \Lambda = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, V) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V \oplus V, V) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, V) \oplus \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, V) = \Lambda \oplus \Lambda$ . Quindi  $\Lambda$  è ovviamente un  $\Lambda$ -modulo libero ma ha una base costituita da un solo elemento ed una costituita da due elementi.

03/03/08

**Definizione 8.** Siano  $(A_i)_{i \in I}$   $\Lambda$ -moduli. Un  $\Lambda$ -modulo  $M$  si dice *somma diretta di  $(A_i)_{i \in I}$*  e si scrive  $M = \bigoplus_{i \in I} A_i$  se esistono gli omomorfismi  $j_i : A_i \rightarrow M$  (detti *inclusioni*) tali che per ogni  $\Lambda$ -modulo  $N$  ed omomorfismi  $\varphi_i : A_i \rightarrow N$  esiste un unico omomorfismo  $\varphi : M \rightarrow N$  tale che

$$\begin{array}{ccc} A_i & & \\ j_i \downarrow & \searrow \varphi_i & \\ M & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}$$

È facile vedere che la somma diretta, se esiste, è unica a meno di isomorfismo.

**Proposizione 6.** Siano  $(A_i)_{i \in I}$   $\Lambda$ -moduli; allora

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I} : a_i \in A_i \text{ e } a_i = 0 \text{ eccetto che per un numero finito di indici}\}$$

con le inclusioni ovvie.

*Dimostrazione.* Basta verificare che la definizione data soddisfa la proprietà universale. Sia  $N$  un  $\Lambda$ -modulo e  $\varphi_i : A_i \rightarrow N$  omomorfismi; definiamo  $\varphi : \bigoplus_{i \in I} A_i \rightarrow N$  come  $\varphi((a_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \varphi_i(a_i)$  (osserviamo che la somma è ben definita perché gli  $a_i$  sono tutti nulli eccetto un numero finito). È ovvio che  $\varphi$  è omomorfismo e fa commutare il diagramma. Questa è l'unica scelta possibile, infatti se  $\psi$  è un altro omomorfismo che fa commutare il diagramma  $\psi((a_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \psi \circ j_i(a_i) = \sum_{i \in I} \varphi_i(a_i) = \varphi((a_i)_{i \in I})$ .  $\square$

**Definizione 9.** Siano  $(A_i)_{i \in I}$   $\Lambda$ -moduli. Un  $\Lambda$ -modulo  $M$  si dice *prodotto diretto di  $(A_i)_{i \in I}$*  e si scrive  $M = \prod_{i \in I} A_i$  se esistono gli omomorfismi  $\pi_i : M \rightarrow A_i$  detti *proiezioni* tali che per ogni  $\Lambda$ -modulo  $N$  ed omomorfismi  $\varphi_i : N \rightarrow A_i$  esiste unico  $\varphi : N \rightarrow M$  che fa commutare

$$\begin{array}{ccc} & & A_i \\ & \nearrow \varphi_i & \uparrow \pi_i \\ N & \xrightarrow{\varphi} & M \end{array}$$

Come prima (e come sempre) se esiste il prodotto diretto è unico a meno di isomorfismo. Inoltre

**Proposizione 7.** Siano  $(A_i)_{i \in I}$   $\Lambda$ -moduli; allora

$$\prod_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I}\}$$

con le proiezioni  $\pi_k((a_i)_{i \in I}) = a_k$ .

*Dimostrazione.* Siano  $N$  e  $(\varphi_i)_{i \in I}$  come nella proprietà universale del prodotto. Definiamo  $\varphi : N \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$  come  $\varphi(n) = (\varphi_i(n))_{i \in I}$ ; anche qui è ovvio che  $\varphi$  è omomorfismo e fa commutare il diagramma. Sia  $\psi : N \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$  un altro omomorfismo che fa commutare il diagramma, allora se  $\psi(n) = (b_i)_{i \in I}$  per ogni  $j \in I$   $b_j = \pi_j \circ \psi(n) = \varphi_j(n)$  da cui  $\psi(n) = \varphi(n)$ .  $\square$

**Proposizione 8.**  $A = \bigoplus_{i \in I} A_i$  è un  $\Lambda$ -modulo proiettivo se e solo se  $A_i$  è  $\Lambda$ -modulo proiettivo per ogni  $i \in I$ .

Moduli

*Dimostrazione.* Supponiamo che ogni  $A_i$  sia proiettivo allora

$$\begin{array}{ccc}
 & A_i & \\
 \vartheta_i \swarrow & \downarrow j_i & \\
 & A & \\
 \vartheta \swarrow & \downarrow \varphi & \\
 B & \xrightarrow{\sigma} & C \longrightarrow 0
 \end{array}$$

dove i  $\vartheta_i$  esistono perché gli  $A_i$  sono proiettivi e  $\vartheta$  esiste per la proprietà universale della somma. Per verificare che il diagramma commuta usiamo ancora la proprietà universale della somma, infatti abbiamo il seguente diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc}
 A_i & \xrightarrow{\varphi \circ j_i} & C \\
 \downarrow j_i & & \uparrow \varphi \\
 & A & \xrightarrow{\sigma \circ \vartheta} & C
 \end{array}$$

e per unicità  $\varphi = \sigma \circ \vartheta$ .

Viceversa supponiamo che  $A$  sia un modulo proiettivo; e sia

$$\begin{array}{ccc}
 & A_i & \\
 & \downarrow \varphi_i & \\
 B & \xrightarrow{\sigma} & C \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Allora per le proprietà della somma diretta  $\varphi_i$  si estende a  $\varphi : A \rightarrow C$  nulla fuori da  $A_i$  (cioè tale che per ogni  $k \neq i$   $\varphi \circ j_k = 0$ ). Ma  $A$  è proiettivo e quindi esiste  $\vartheta : A \rightarrow B$  tale che  $\sigma \circ \vartheta = \varphi$  e basta scegliere  $\vartheta_i = \vartheta \circ j_i$ , infatti  $\sigma \circ \vartheta_i = \varphi \circ j_i = \varphi_i$ .  $\square$

**Teorema 9.**  $\Lambda$

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\mu} B \begin{array}{c} \xrightarrow{\varepsilon} \\ \xleftarrow{\sigma} \end{array} C \longrightarrow 0$$

dove  $\sigma : C \rightarrow B$  è un'inversa destra di  $\varepsilon$ , cioè  $\varepsilon \circ \sigma = id_C$ . Allora la successione spezza, cioè  $B \cong A \oplus C$  e

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i_A} & A \oplus C & \xrightarrow{\pi} & C \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow id & & \downarrow \vartheta | & & \downarrow id \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\mu} & B & \xrightarrow{\varepsilon} & C \longrightarrow 0
 \end{array}$$

con  $\vartheta$  isomorfismo.

*Dimostrazione.* Definiamo  $\vartheta(a, c) = \mu(a) + \sigma(c)$ . Il diagramma commuta; infatti  $\vartheta \circ i_A(a) = \vartheta(a, 0) = \mu(a)$  e  $\varepsilon \circ \vartheta(a, c) = \varepsilon \circ \mu(a) + \varepsilon \circ \sigma(c) = c = \pi(a, c)$ ; inoltre  $\vartheta$  è isomorfismo per il teorema 1  $\square$

**Teorema 10.**  $\Lambda$

$$0 \longrightarrow A \begin{array}{c} \xrightarrow{\mu} \\ \xleftarrow{\gamma} \end{array} B \xrightarrow{\varepsilon} C \longrightarrow 0$$

dove  $\gamma : B \rightarrow A$  è un'inversa sinistra di  $\mu$ , cioè  $\gamma \circ \mu = id_A$ . Allora la successione *spezza*, cioè  $B \cong A \oplus C$  e

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\mu} & B & \xrightarrow{\varepsilon} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & id \downarrow & & \vartheta \downarrow & & id \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i_A} & A \oplus C & \xrightarrow{\pi} & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

con  $\vartheta$  isomorfismo.

*Dimostrazione.* Come prima è sufficiente definire  $\vartheta : B \rightarrow A \oplus C$  in modo che il diagramma commuti. Dunque poniamo  $\vartheta(b) = (\gamma(b), \varepsilon(b))$  ed abbiamo che  $\vartheta \circ \mu(a) = (\mu \circ \gamma(a), \varepsilon \circ \mu(a)) = (a, 0) = i_A(a)$  e  $\pi \circ \vartheta(b) = \pi(\gamma(b), \varepsilon(b)) = \varepsilon(b)$ ; cioè il diagramma commuta.  $\square$

*Osservazione 3.* I teoremi precedenti sono dei se e solo se; cioè se  $B \cong A \oplus C$  è facile costruire un'inversa sinistra di  $\mu$  ed un'inversa destra di  $\varepsilon$ .

**Teorema 11.** Sia  $P$  un  $\Lambda$ -modulo; allora le seguenti sono equivalenti

- (1)  $P$  è proiettivo.
- (2) Per ogni successione esatta corta

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

la successione

$$0 \rightarrow \text{Hom}(P, A) \rightarrow \text{Hom}(P, B) \rightarrow \text{Hom}(P, C) \rightarrow 0$$

è esatta.

- (3) Se  $\varepsilon : B \rightarrow C \rightarrow 0$  esiste  $\sigma : C \rightarrow B$  inversa destra di  $\varepsilon$ , cioè tale che  $\varepsilon \circ \sigma = id_C$ .
- (4)  $P$  è addendo diretto di ogni modulo di cui è quoziente.
- (5)  $P$  è addendo diretto di un modulo libero.

## Moduli

*Dimostrazione.* ((1)  $\Rightarrow$  (2)) Già visto.

((2)  $\Rightarrow$  (3)) Consideriamo la successione esatta corta

$$0 \longrightarrow \text{Ker } \varepsilon \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\varepsilon} P \longrightarrow 0$$

allora la successione

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(P, \text{Ker } \varepsilon) \xrightarrow{i_*} \text{Hom}(P, B) \xrightarrow{\varepsilon_*} \text{Hom}(P, P) \longrightarrow 0$$

è esatta ed in particolare esiste  $\sigma \in \text{Hom}(P, B)$  tale che  $id_P = \varepsilon_*(\sigma) = \varepsilon \circ \sigma$ .

((3)  $\Rightarrow$  (4)) Sia  $P \cong A/B$ ; consideriamo

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0.$$

Allora esiste  $\sigma : P \rightarrow A$  inversa a destra di  $\pi$  e la successione spezza; da cui  $A \cong P \oplus B$ .

((4)  $\Rightarrow$  (5)) Ogni modulo è quoziente di un modulo libero.

((5)  $\Rightarrow$  (1))  $P$  è addendo diretto di un modulo libero che in particolare è proiettivo e il risultato segue dalla proposizione 8.  $\square$

*Esempio 2.* (1) Gli spazi vettoriali sono liberi e proiettivi.

(2)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  non è libero (perché ha torsione) ma neanche proiettivo perché altrimenti la successione

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mu=n\cdot} \mathbb{Z} \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

spezzerebbe.

(3) Un gruppo abeliano finitamente generato come  $\mathbb{Z}$ -modulo è proiettivo se e solo se è isomorfo a  $\mathbb{Z}^n$  (perché altrimenti per il teorema di struttura avrebbe un fattore diretto isomorfo a  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  che non è proiettivo) se e solo se è libero, se e solo se non ha torsione.

(4) Consideriamo la successione di  $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ -moduli

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Se  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  fosse proiettivo come  $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ -modulo avremmo che  $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  che non è (il secondo ha torsione come  $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ -modulo mentre il primo no). In particolare  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  non è libero come  $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ -modulo.

- (5) Sia  $\Lambda = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  allora  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  come  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  moduli (mediante  $([a], [b]) \mapsto [4a + 3b]$ ).  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  è un  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ -modulo libero e quindi proiettivo da cui  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  sono  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ -moduli proiettivi ma non liberi.

*Esercizio 2.* (1) Studiare in  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  e in  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  i sottomoduli (rispettivamente come  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ -moduli e  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ -moduli) e dire se sono o non sono proiettivi.

- (2) Mostrare che  $\mathbb{Q}$  non è un  $\mathbb{Z}$ -modulo libero.

*Dimostrazione.* (1) In  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  gli unici sottomoduli non banali sono  $3\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  e  $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ , inoltre  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  quindi entrambi i sottomoduli sono proiettivi. In  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  l'unico sottomodulo non banale è  $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  e questo non è proiettivo perché se lo fosse allora sarebbe un fattore diretto di  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  e per questioni di ordine dovrebbe essere  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  che è assurdo.

- (2) Due qualunque elementi di  $\mathbb{Q}$  hanno una relazione. Infatti siano  $a = \frac{p_1}{q_1}, b = \frac{p_2}{q_2} \in \mathbb{Q}$  (con  $(p_i, q_i) = 1$ ) allora  $q_1 p_2 a - q_2 p_1 b = 0$ . Perciò se  $\mathbb{Q}$  fosse libero avrebbe rango 1 ma  $\mathbb{Q} \not\cong \mathbb{Z}$ . □

### 1.1.1 Moduli proiettivi su domini ad ideali principali

**Teorema 12.** Sia  $R$  un dominio ad ideali principali ed  $E$  un  $R$ -modulo libero;  $F \subseteq E$  sottomodulo. Allora  $F$  è libero.

Più precisamente se  $\{v_i\}_{i \in I}$  è una base di  $E$  ed  $F \neq (0)$  allora esiste una base di  $F$  indicizzata da un sottoinsieme di  $I$  (in particolare se  $\text{rk } E < \infty$  allora  $\text{rk } F \leq \text{rk } E$ ).

*Dimostrazione.* (Caso finitamente generato) Sia  $\{v_i\}_{i \in I}$  una base di  $E$  con  $I = \{1, \dots, n\}$ . Definiamo  $F_i = F \cap (v_1, v_2, \dots, v_i)$ .

$$(0) \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n = F.$$

Mostriamo per induzione su  $\text{rk } E$  che  $F$  è libero. Se  $\text{rk } E = 1$  allora  $F = (0)$  oppure  $F$  è (isomorfo ad) un ideale di  $R$ ; ma  $R$  è ad ideali principali e quindi  $F = (a)$  con  $a \in R$  è libero su di un elemento.

Vediamo il passo induttivo. Per ipotesi induttiva i sottomoduli di  $(v_1, \dots, v_{n-1})$  sono liberi; in particolare  $F_{n-1}$  è libero. Se  $F_n = F_{n-1}$  è libero. Se  $F_{n-1} \subsetneq F_n$  per ogni  $x \in F$  esiste  $\alpha_x$  tale che

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_{n-1} v_{n-1} + \alpha_x v_n$$

## Moduli

(perchè  $v_1, \dots, v_n$  generano  $E$ ). Ma  $\alpha_x$  è anche unico perché  $E$  è libero. Quindi  $J = \{\alpha_x : x \in F\} \subseteq R$  è un ideale (perché  $\alpha_x + \alpha_y = \alpha_{x+y} \in J$  e  $\lambda\alpha_x = \alpha_{\lambda x}$ ). Allora  $J = (b)$  ed esiste  $w \in F$  tale che  $w = a_1v_1 + \dots + a_{n-1}v_{n-1} + bv_n$ .

Sia  $f \in F$ ; allora  $f = a_1v_1 + \dots + a_{n-1}v_{n-1} + \alpha_f v_n$  ed esiste  $c \in R$  tale che  $f - cw \in F_{n-1}$  per qualche  $c$ . Quindi  $F \cong F_{n-1} \oplus Rw$  ed è libero.

(Caso generale) Per ogni  $J \subseteq I$  definiamo  $F_J = F \cap (v_j)_{j \in J}$  e consideriamo l'insieme

$$\Sigma = \{(F_J, w) : J \subseteq I, w : J' \rightarrow F_J \text{ con } J' \subseteq J \text{ e } w(J') \text{ è una base di } F_J\}.$$

Per il caso precedente  $\Sigma$  è non vuoto (esiste un  $J \subseteq I$  finito tale che  $F_J \neq (0)$ ). Inoltre  $\Sigma$  è parzialmente ordinato con la relazione

$$(F_J, w) \prec (F_K, u) \Leftrightarrow J \subseteq K, J' \subseteq K' \text{ e } u|_{J'} = w.$$

Inoltre  $(\Sigma, \prec)$  verifica le condizioni del lemma di Zorn; sia  $(F_{J_\alpha}, w_\alpha)_{\alpha \in A}$  una catena e consideriamo  $(F_J, w)$  con  $J = \cup_{\alpha \in A} J_\alpha$ ,  $J' = \cup_{\alpha \in A} J'_\alpha$  e  $w : J' \rightarrow F$  definita da  $w(j) = w_\alpha(j)$  (dove  $j \in J'_\alpha$ ); vediamo che  $w(J')$  è base. Sia  $x \in F_J$  allora  $x \in F_{J_n}$  per qualche  $n$  e quindi  $x \in (w_\alpha(J'_\alpha)) \subseteq (w(J'))$  e  $w(J')$  è un sistema di generatori.

Sia  $\sum_{j \in J'} a_j w(j) = 0$  dove la combinazione lineare è finita; allora  $\{j \in J' : a_j \neq 0\} \subseteq J'_\alpha$  per qualche  $\alpha \in A$  e quindi dal fatto che  $w(J'_\alpha) = w_\alpha(J'_\alpha)$  è base di  $F_{J_\alpha}$  abbiamo che  $a_j = 0$  per ogni  $j \in J'$ .

Sia dunque  $(F_J, w)$  un elemento massimale e supponiamo che  $J \neq I$ ; allora esiste  $k \in I \setminus J$  e ogni elemento di  $F_{J \cup \{k\}}$  si scrive come

$$x = \sum_{j \in J'} a_j v_k + \alpha_x v_k$$

e  $(a_j)_{j \in J'}$  è a supporto finito, inoltre come prima tale scrittura è unica ed  $S = \{\alpha_x : x \in F_{J \cup \{k\}}\} \subseteq R$  è un ideale; allora  $S = (b)$  ed esiste  $v \in F_{J \cup \{k\}}$  tale che  $\alpha_v = b$ . Sempre come prima  $F_{J \cup \{k\}} \cong F_J \oplus Rv$  e in particolare definendo  $\tilde{w} : J' \cup \{k\} \rightarrow F_{J \cup \{k\}}$  tale che  $\tilde{w}(j) = w(j)$  se  $j \in J'$  e  $\tilde{w}(k) = v$  si ottiene  $(F_J, w) \prec (F_{J \cup \{k\}}, \tilde{w}) \in \Sigma$  che è assurdo.  $\square$

**Corollario 13.** Se  $\Lambda$  è un dominio ad ideali principali, un  $\Lambda$ -modulo proiettivo è libero.

*Dimostrazione.*  $P$  proiettivo  $\Rightarrow P$  è addendo diretto di un modulo libero  $\Rightarrow P$  è sottomodulo di modulo libero  $\Rightarrow P$  è libero.  $\square$

**Corollario 14.** Se  $\Lambda$  è un dominio ad ideali principali ogni sottomodulo di un modulo proiettivo è proiettivo.

*Osservazione 4.* Sia  $\Lambda$  dominio ad ideali principali,  $M$   $\Lambda$ -modulo finitamente generato,  $N \subseteq M$  sottomodulo,  $F$   $\Lambda$ -modulo libero tale che  $M$  è quoziente di  $F$ ; allora

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & & \downarrow \pi \\ N & \xrightarrow{i} & M \end{array}$$

$\pi^{-1}(N)$  è sottomodulo di modulo libero e; in particolare è libero e  $\text{rk } \pi^{-1}(N) \leq \text{rk } M < \infty$ , cioè  $\pi^{-1}(N)$  è finitamente generato e quindi lo è anche  $N$ ; in altre parole *se  $\Lambda$  è dominio ad ideali principali ogni sottomodulo di un modulo finitamente generato è finitamente generato.*

Osservazione sull'osservazione: questo fatto è vero più in generale per  $\Lambda$  noetheriano.

*Esempio 3.*  $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}$  non è libero (e quindi neanche proiettivo) come  $\mathbb{Z}$ -modulo; per una dimostrazione ci si può riferire a [Sch].

**Teorema 15** (Dei divisori elementari). Sia  $R$  un dominio ad ideali principali;  $F$   $R$ -modulo libero,  $M \subseteq F$  sottomodulo finitamente generato con  $M \neq (0)$ . Allora esistono una base  $\mathcal{B}$  di  $F$ , degli elementi  $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{B}$  e degli elementi  $a_1, \dots, a_n \in R \setminus \{0\}$  tali che

(1)  $M = \langle a_1 e_1, \dots, a_n e_n \rangle$  e

(2)  $a_i \mid a_{i+1}$ .

*Dimostrazione.* Possiamo supporre che  $F$  sia finitamente generato, altrimenti scriviamo i generatori di  $M$  come combinazione lineare di elementi di  $\mathcal{B}$  e consideriamo il sottomodulo generato dagli elementi di  $\mathcal{B}$  che compaiono in tali scritture (che sono in numero finito).

Sia  $\lambda \in \text{Hom}_R(F, R)$  e definiamo  $J_\lambda = \lambda(M)$ , chiaramente ogni  $J_\lambda$  è un ideale. La famiglia di ideali di  $R$

$$\mathcal{F} = \{J_\lambda : \lambda \in \text{Hom}_R(F, R)\}$$

ammette elementi massimali (perché è non vuota ed  $R$  è noetheriano). Sia  $J_{\lambda_1}$  massimale in  $\mathcal{F}$ ,  $R$  è PID e quindi  $J_{\lambda_1} = (a_1)$  ed  $a_1 \neq 0$  (perché, scelto  $m \in M$  con  $m \neq 0$ , è semplice costruire un funzionale non nullo su  $m$ ).

Sia  $x_1 \in M$  tale che  $\lambda_1(x_1) = a_1$ ; per ogni  $\lambda \in \text{Hom}_R(F, R)$  si ha  $\lambda(x_1) \in (a_1)$ . Infatti sia  $(d) = (\lambda(x_1), a_1) (\Rightarrow (a_1) \subseteq (d))$ ,  $d = h\lambda(x_1) + k\lambda_1(x_1)$  e  $\mu = h\lambda + k\lambda_1 \in \text{Hom}_R(F, R)$ .  $J_{\lambda_1} = (a_1) \subseteq (d) \subseteq J_\mu$  (dove l'ultima inclusione viene da  $d = \mu(x_1)$ ) e quindi per massimalità  $(a_1) = (d) = J_\mu$  e, a meno di associati,  $a_1 = d \mid \lambda(x_1)$ .

Perciò se scriviamo  $x_1$  in termini di una qualunque base di  $F$  e consideriamo come funzionale la proiezione su di una coordinata abbiamo che ogni coefficiente di  $x_1$  è multiplo di  $a_1$  ed  $x_1 = a_1 e_1$ . Inoltre  $\lambda_1(e_1) = 1$ . Vogliamo quindi dimostrare che  $F = \langle e_1 \rangle \oplus \text{Ker } \lambda_1$ , è chiaro che  $\langle e_1 \rangle \cap \text{Ker } \lambda_1 = (0)$ . Sia  $x \in F$ , allora  $x - \lambda_1(x)e_1 \in \text{Ker } \lambda_1 \Rightarrow F = \langle e_1 \rangle \oplus \text{Ker } \lambda_1$ .  $F_1 := \text{Ker } \lambda_1$  è libero per il teorema 12; chiamiamo  $M_1 = F_1 \cap M$ , allora  $M = \langle x_1 \rangle \oplus M_1$ . Infatti chiaramente  $\langle x_1 \rangle \cap M_1 = (0)$  e per ogni  $x \in M$   $\lambda_1(x) = ba_1$  e  $x - bx_1 \in M_1$ .

Adesso si completa la dimostrazione con un procedimento induttivo e per avere il secondo punto basta osservare che per ogni funzionale  $\lambda \in \text{Hom}_R(F_1, R)$   $\lambda(M_1) \subseteq \lambda_1(M)$ . Infatti estendiamo  $\lambda$  ad un funzionale  $F \rightarrow R$  con  $\lambda(e_1) = 0$  e consideriamo il funzionale  $\mu = \lambda + \lambda_1$ . Allora  $\mu(x_1) = a_1 \Rightarrow (a_1) \subseteq J_\mu$  e per massimalità  $J_\mu = (a_1)$ . Infine per ogni  $m \in M_1$   $\lambda(m) = \mu(m) - \lambda_1(m) \in (a_1)$ .  $\square$

## 1.2 Moduli iniettivi

04/03/08

**Definizione 10.** Un  $\Lambda$ -modulo  $I$  si dice *iniettivo* se comunque dati  $A, B$   $\Lambda$ -moduli,  $\alpha : A \rightarrow I$  omomorfismo e  $\gamma : A \rightarrow B$  omomorfismo iniettivo esiste  $\beta : B \rightarrow I$  che fa commutare il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & & I \\ & \nearrow \beta & \uparrow \alpha \\ B & \xleftarrow{\gamma} & A \longleftarrow 0 \end{array}$$

In parole povere un modulo  $I$  è iniettivo se (identificando tramite  $\gamma$   $A$  come sottomodulo di  $B$ ), per ogni  $A \subseteq B$  moduli ogni omomorfismo  $\alpha : A \rightarrow I$  si estende ad un omomorfismo  $\beta : B \rightarrow I$ .

**Proposizione 16.** Un prodotto  $\prod_{i \in I} A_i$  è iniettivo se e solo se ogni  $A_i$  è iniettivo.

*Dimostrazione.* Supponiamo che ogni  $A_i$  sia iniettivo; allora

$$\begin{array}{ccc} & & A_i \\ & \nearrow \beta_i & \uparrow \pi_i \\ & & \prod_{i \in I} A_i \\ & \nearrow \beta & \uparrow \alpha \\ B & \xleftarrow{\gamma} & A \longleftarrow 0 \end{array}$$

Dove i  $\beta_i$  esistono perché  $A_i$  è iniettivo e  $\beta$  esiste per la proprietà universale del prodotto. Per verificare che il diagramma commuta osserviamo che  $\beta_i \circ \gamma = \pi_i \circ \alpha$  per ogni  $i \in I$  (per costruzione) e per proprietà universale del prodotto  $\pi_i \circ \beta = \beta_i$  per ogni  $i \in I$ . Quindi il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\beta_i \circ \gamma} & A_i \\
 \searrow \alpha & & \nearrow \pi_i \\
 & \prod_{i \in I} A_i & 
 \end{array}$$

e per unicità  $\beta \circ \gamma = \alpha$ .

Viceversa sia  $\prod_{i \in I} A_i$  iniettivo e consideriamo  $\alpha : A \rightarrow A_k$  e  $\gamma : A \hookrightarrow B$ ; se definiamo la famiglia di omomorfismi  $\alpha_i : A \rightarrow A_i$  come  $\alpha_i = 0$  se  $i \neq k$  e  $\alpha_k = \alpha$ . Per la proprietà universale del prodotto esiste  $\tilde{\alpha} : A \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$  tale che  $\pi_i \circ \tilde{\alpha} = \alpha_i$  e quindi

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A_i & & \\
 & & \uparrow \pi_i & & \\
 & & \prod_{i \in I} A_i & & \\
 & & \uparrow \tilde{\alpha} & & \\
 B & \xleftarrow{\gamma} & A & \xleftarrow{\alpha} & 0
 \end{array}$$

dove  $\beta$  esiste perché  $\prod_{i \in I} A_i$  è iniettivo e  $\beta_i = \pi_i \circ \beta$ . □

**Proposizione 17.** Sia  $B$  un  $\Lambda$ -modulo ed  $\{A_i\}_{i \in J}$  una famiglia di  $\Lambda$ -moduli; allora esiste un isomorfismo

$$\text{Hom}_\Lambda(\oplus_{i \in I} A_i, B) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}_\Lambda(A_i, B)$$

*Dimostrazione.* Dimostriamo che  $\text{Hom}_\Lambda(\oplus_{i \in I} A_i, B)$  soddisfa la proprietà universale del prodotto. Per ogni  $i \in I$  chiamiamo  $j_i$  l'inclusione  $A_i \rightarrow \oplus_{i \in I} A_i$  e definiamo le proiezioni  $\pi_i : \text{Hom}_\Lambda(\oplus_{i \in I} A_i, B) \rightarrow \text{Hom}_\Lambda(A_i, B)$  come  $\pi_i(\varphi) = \varphi \circ j_i$ .

Consideriamo una famiglia di omomorfismi  $\beta_i : N \rightarrow \text{Hom}_\Lambda(A_i, B)$  per ogni  $n \in N$  esiste un unico omomorfismo  $\beta(n)$  tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccc}
 A_i & \xrightarrow{\beta_i(n)} & B \\
 \searrow j_i & & \nearrow \beta(n) \\
 & \oplus_{i \in I} A_i & 
 \end{array}$$

## Moduli

Definiamo  $\beta : N \rightarrow \text{Hom}_\Lambda(\oplus_{i \in I} A_i, B)$  come  $n \mapsto \beta(n)$ .  $\beta$  è omomorfismo, infatti per ogni  $n_1, n_2 \in N$  e per ogni  $i \in I$   $(\beta(n_1) + \beta(n_2)) \circ j_i = \beta(n_1) \circ j_i + \beta(n_2) \circ j_i = \beta_i(n_1) + \beta_i(n_2) = \beta_i(n_1 + n_2)$  e per unicità  $\beta(n_1) + \beta(n_2) = \beta(n_1 + n_2)$ . Inoltre per ogni  $n \in N$   $\pi_i(\beta(n)) = \beta(n) \circ j_i = \beta_i(n)$  e quindi  $\beta$  risolve il problema universale.  $\square$

In particolare  $(\oplus_{i=0}^\infty \mathbb{R})^* \cong \prod_{i=0}^\infty \mathbb{R}$  che è come dire che  $(\mathbb{R}[x])^* \cong \mathbb{R}[[x]]$ .

### 1.2.1 Moduli iniettivi su domini ad ideali principali

**Definizione 11.** Sia  $\Lambda$  un dominio; un  $\Lambda$ -modulo  $D$  si dice *divisibile* se  $\forall d \in D \forall \lambda \in \Lambda \setminus \{0\} \exists c \in D$  tale che  $\lambda c = d$ .

*Esempio 4.* (1)  $\mathbb{Q}$  è uno  $\mathbb{Z}$ -modulo divisibile

(2)  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  è uno  $\mathbb{Z}$ -modulo divisibile ma  $c$  non è unico:  $0 = \frac{1}{4}4 = \frac{1}{2}4$ .

(3)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è uno  $\mathbb{Z}$ -modulo non divisibile (ad esempio  $n = 4, d = 1, \lambda = 2$ ).

(4)  $\mathbb{Z}$  non è uno  $\mathbb{Z}$ -modulo divisibile.

(5) Un gruppo abeliano finitamente generato non è mai divisibile.

**Teorema 18.** Sia  $\Lambda$  un dominio d'integrità; allora un  $\Lambda$ -modulo iniettivo è divisibile. Se  $\Lambda$  è un dominio ad ideali principali un  $\Lambda$ -modulo divisibile è iniettivo.

*Dimostrazione.* Sia  $\Lambda$  dominio di integrità e  $D$   $\Lambda$ -modulo iniettivo. Sia  $d \in D$  e  $\lambda \in \Lambda$  con  $\lambda \neq 0$ , vogliamo trovare  $c \in D$  tale che  $\lambda c = d$ . Consideriamo

$$\begin{array}{ccc} & & D \\ & \nearrow \vartheta & \uparrow \varepsilon \\ \Lambda & \xleftarrow{\mu} & \Lambda \longleftarrow 0 \end{array}$$

con  $\mu(1) = \lambda$  (è iniettivo perché  $\Lambda$  è un dominio) e  $\varepsilon(1) = d$ . Per iniettività esiste  $\vartheta : \Lambda \rightarrow D$  che fa commutare il diagramma; in particolare  $d = \varepsilon(1) = \vartheta \circ \mu(1) = \vartheta(\lambda) = \lambda \vartheta(1)$ .

Adesso sia  $\Lambda$  un dominio ad ideali principali e  $D$  un  $\Lambda$ -modulo divisibile. Consideriamo

$$\begin{array}{ccc} & & D \\ & & \uparrow \alpha \\ B & \xleftarrow{\mu} & A \longleftarrow 0 \end{array}$$

A meno di identificare  $A$  con  $\mu(A)$  possiamo supporre  $A \subseteq B$ . Sia

$$\Sigma = \{(L, \gamma) : A \subseteq L \subseteq B \text{ e } \gamma : L \rightarrow D, \gamma|_A = \alpha\}.$$

$(A, \alpha) \in \Sigma \Rightarrow \Sigma \neq \emptyset$ .  $\Sigma$  è parzialmente ordinato con la relazione

$$(L, \gamma) \prec (M, \eta) \Leftrightarrow L \subseteq M, \text{ e } \eta|_L = \gamma$$

$(\Sigma, \prec)$  verifica le condizioni del lemma di Zorn: sia  $(\bar{A}, \bar{\alpha}) \in \Sigma$  un elemento massimale. Se  $\bar{A} \neq B$  esiste  $b \in B \setminus \bar{A}$ ; sia  $I = \{\lambda \in \Lambda : \lambda b \in \bar{A}\}$ .  $I$  è un ideale di  $\Lambda$  e quindi  $I = \langle \lambda_0 \rangle$ . Sia  $\tilde{A} = \langle \bar{A}, b \rangle$ , vogliamo definire  $\tilde{\alpha} : \tilde{A} \rightarrow D$  che estende  $\alpha$ . Se  $\lambda_0 \neq 0$  per divisibilità esiste  $c \in D$  tale che  $\lambda_0 c = \bar{\alpha}(\lambda_0 b)$ ; se  $\lambda_0 = 0$  scegliamo  $c \in D$  arbitrario e definiamo

$$\tilde{\alpha}(\bar{a} + \lambda b) = \bar{\alpha}(\bar{a}) + \lambda c$$

e l'unica cosa da verificare è  $\lambda b \in \bar{A} \Rightarrow \tilde{\alpha}(\lambda b) = \bar{\alpha}(\lambda b)$  ma questo segue dalla definizione; infatti sia  $\lambda = \xi \lambda_0$  allora  $\bar{\alpha}(\lambda b) = \xi \bar{\alpha}(\lambda_0 b) = \xi \lambda_0 c = \lambda c = \tilde{\alpha}(\lambda b)$ . Perciò  $(\bar{A}, \bar{\alpha}) \prec (\tilde{A}, \tilde{\alpha})$  che è assurdo.  $\square$

**Proposizione 19.** Quoziente di un modulo divisibile è divisibile.

*Dimostrazione.* È ovvio.  $\square$

**Teorema 20.** Ogni gruppo abeliano (come  $\mathbb{Z}$ -modulo) può essere immerso in un gruppo abeliano divisibile (cioè uno  $\mathbb{Z}$ -modulo iniettivo).

*Dimostrazione.* Sia  $A$  un gruppo abeliano ed  $a \in A$  con  $a \neq 0$ . Consideriamo  $\langle a \rangle \subseteq A$  e la mappa  $\alpha_a : \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  definita nel seguente modo: se  $o(a) = \infty$  allora  $\alpha_a(a)$  è qualunque elemento non nullo di  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ ; se  $o(a) = n$  allora  $\alpha_a(a)$  è un elemento con ordine che divide  $n$ . Consideriamo

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ & \nearrow \vartheta_a & \uparrow \alpha_a \\ A & \longleftarrow & \langle a \rangle \longleftarrow 0 \end{array}$$

dove  $\vartheta_a$  esiste per l'iniettività di  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ . Adesso consideriamo

$$\begin{array}{ccc} & & \prod_{a \in A} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_a \\ & \nearrow u & \downarrow \pi_a \\ A & \xrightarrow{\vartheta_a} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

dove  $u$  esiste per la proprietà universale del prodotto.  $u$  è anche iniettiva perché per ogni  $a \in A$  con  $a \neq 0$   $\pi_a(u(a)) = \vartheta_a(a) \neq 0$  per costruzione. La tesi segue dalla proposizione 16.  $\square$

Moduli

**Definizione 12.** Un gruppo abeliano si dice *colibero* se è isomorfo ad  $\prod_{i \in I} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_i$ .

*Esercizio 3.* (1)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è iniettivo come  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  modulo.

(2) Ogni gruppo abeliano  $A$  ha un sottogruppo divisibile massimale.

*Dimostrazione.* (1) Consideriamo l'omomorfismo iniettivo

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ 1 &\mapsto \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & & \\ & & \nearrow & \uparrow \psi & \\ & \tilde{\beta} & & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \\ & \nearrow \beta & & \uparrow \alpha & \\ B & \xleftarrow{\gamma} & A & \xleftarrow{\quad} & 0 \end{array}$$

Dove  $A$  e  $B$  sono  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -moduli, cioè gruppi abeliani di  $n$ -torsione e  $\psi \circ \alpha$  è omomorfismo di gruppi abeliani.  $\tilde{\beta}$  esiste per l'iniettività di  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  e  $\text{Im } \tilde{\beta}$  è un sottogruppo di  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  che ha  $n$ -torsione  $\Rightarrow \text{Im } \tilde{\beta} \subseteq \langle \frac{1}{n} \rangle$  e se chiamiamo  $\psi^{-1} : \langle \frac{1}{n} \rangle \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  basta porre  $\beta = \psi^{-1} \circ \tilde{\beta}$ .

(2) Mostriamo che somma diretta di moduli divisibili è divisibile. Sia  $A = \bigoplus_{i \in I} A_i$ ,  $(a_i)_{i \in I} \in A$  e  $\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}$  definiamo  $c = (c_i)_{i \in I}$  come

$$c_i = \begin{cases} 0 & \text{se } a_i = 0 \\ d \in A_i : \lambda d = a_i & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$c$  ha supporto finito e quindi  $c \in A$  e  $\lambda c = a$ .

Sia ora  $A$  un gruppo abeliano e consideriamo la famiglia  $\{A_i\}_{i \in I}$  dei suoi sottogruppi divisibili. Per ogni  $i \in I$  consideriamo l'inclusione  $\varphi_i : A_i \rightarrow A$ , queste inducono un'omomorfismo  $\varphi : \bigoplus_{i \in I} A_i \rightarrow A$ . Ora  $\bigoplus_{i \in I} A_i$  è divisibile e quindi lo è anche  $B = \text{Im } \varphi \subseteq A$  (che è un quoziente di  $\bigoplus_{i \in I} A_i$ ), inoltre per ogni sottogruppo divisibile  $A_i \subseteq A$  abbiamo  $A_i = \varphi_i(A_i) = \varphi \circ j_i(A_i) \subseteq B$ . Quindi  $B$  è il massimo sottogruppo divisibile di  $A$ .

□

## 1.2.2 Moduli coliberi

Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo *destro* e  $G$  un gruppo abeliano; consideriamo  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G)$  (omomorfismi di gruppi abeliani). Vogliamo mettere su quest'ultimo una struttura di  $\Lambda$ -modulo *sinistro*. Perciò se  $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G)$  definiamo  $\lambda\varphi(a) = \varphi(a\lambda)$ .

*Esercizio 4.* Verificare che  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G)$  con la moltiplicazione per scalare così definita è veramente un  $\Lambda$ -modulo sinistro.

*Dimostrazione.* È tutto ovvio ad eccezione di  $(\lambda_1\lambda_2)\varphi = \lambda_1(\lambda_2\varphi)$ , ma per ogni  $a \in A$   $(\lambda_1\lambda_2)\varphi(a) = \varphi(a(\lambda_1\lambda_2)) = \varphi((a\lambda_1)\lambda_2) = (\lambda_2\varphi)(a\lambda_1) = \lambda_1(\lambda_2\varphi)(a)$ .  $\square$

**Teorema 21.** Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo *sinistro* e  $G$  un gruppo abeliano; consideriamo  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)$  come  $\Lambda$ -modulo sinistro (Perché  $\Lambda$  è in modo naturale un  $\Lambda$ -modulo destro). Allora esiste un *isomorfismo* di gruppi abeliani

$$\eta_A : \text{Hom}_{\Lambda}(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G).$$

Inoltre se  $\alpha : A \rightarrow B$  è omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\Lambda}(B, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)) & \xrightarrow{\eta_B} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(B, G) \\ \alpha^* \downarrow & & \downarrow \alpha^* \\ \text{Hom}_{\Lambda}(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)) & \xrightarrow{\eta_A} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G) \end{array}$$

*Dimostrazione.* Sia  $\varphi \in \text{Hom}_{\Lambda}(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G))$  ed  $a \in A$ , definiamo  $\eta_A(\varphi)(a) = \varphi(a)(1)$ . Dobbiamo fare un paio di verifiche:

- (1)  $\eta_A(\varphi)(a) \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G)$ :  $\eta_A(\varphi)(a_1 + a_2) = \varphi(a_1 + a_2)(1) = \varphi(a_1)(1) + \varphi(a_2)(1) = \eta_A(\varphi)(a_1) + \eta_A(\varphi)(a_2)$  e anche  $\eta_A(\varphi)(ka) = \varphi(ka)(1) = k\varphi(a)(1) = k\eta_A(\varphi)(a)$ .
- (2)  $\eta_A$  è un omomorfismo di gruppi abeliani:  $\eta_A(\varphi_1 + \varphi_2)(a) = (\varphi_1 + \varphi_2)(a)(1) = (\varphi_1(a) + \varphi_2(a))(1) = \varphi_1(a)(1) + \varphi_2(a)(1) = \eta_A(\varphi_1)(a) + \eta_A(\varphi_2)(a)$ .

Per vedere che  $\eta_A$  è un isomorfismo costruiamo un'inversa  $\xi_A : \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda}(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G))$  definendo  $\xi_A(\psi)(a)(\lambda) = \psi(\lambda a)$ . Anche qui dobbiamo fare un po' di verifiche noiose

- (1)  $\xi_A(\psi)(a) \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)$ , cioè è un omomorfismo di gruppi abeliani:  $\xi_A(\psi)(a)(\lambda_1 + \lambda_2) = \psi((\lambda_1 + \lambda_2)a) = \psi(\lambda_1 a + \lambda_2 a) = \psi(\lambda_1 a) + \psi(\lambda_2 a) = \xi_A(\psi)(a)(\lambda_1) + \xi_A(\psi)(a)(\lambda_2)$ .

Moduli

(2)  $\xi_A(\psi) \in \text{Hom}_\Lambda(A, \text{Hom}_\mathbb{Z}(\Lambda, G))$ :  $\xi_A(\psi)(a_1 + a_2)(\lambda) = \psi(\lambda(a_1 + a_2)) = \psi(\lambda a_1 + \lambda a_2) = \psi(\lambda a_1) + \psi(\lambda a_2) = \xi_A(\psi)(a_1)(\lambda) + \xi_A(\psi)(a_2)(\lambda)$  e anche  $\xi_A(\psi)(\lambda_1 a)(\lambda) = \psi(\lambda \lambda_1 a) = \xi_A(\psi)(a)(\lambda \lambda_1) = \lambda_1 \xi_A(\psi)(a)(\lambda)$ .

(3)  $\xi_A$  è un omomorfismo di gruppi abeliani:  $\xi_A(\psi_1 + \psi_2)(a)(\lambda) = (\psi_1 + \psi_2)(\lambda a) = \psi_1(\lambda a) + \psi_2(\lambda a) = \xi_A(\psi_1)(a)(\lambda) + \xi_A(\psi_2)(a)(\lambda)$ .

Finalmente possiamo vedere che  $\eta_A$  e  $\xi_A$  sono l'una inversa dell'altra.  $\xi_A \circ \eta_A(\varphi)(a)(\lambda) = \eta_A(\varphi)(\lambda a) = \varphi(\lambda a)(1) = \lambda \varphi(a)(1) = \varphi(a)(\lambda)$ , cioè  $\xi_1 \circ \eta_A = id$ . Inoltre  $\eta_A \circ \xi_A(\varphi)(a) = \xi_A(\varphi)(a)(1) = \varphi(a)$  e  $\eta_A \circ \xi_A = id$ .

E, dulcis in fundo,  $\eta_A$  è naturale:  $(\eta_A \circ \alpha^*)(\varphi)(a) = \alpha^*(\varphi)(a)(1) = (\varphi \circ \alpha)(a)(1)$  e  $(\alpha^* \circ \eta_B)(\varphi)(a) = (\eta_B(\varphi) \circ \alpha)(a) = \varphi(\alpha(a))(1) = (\varphi \circ \alpha)(a)(1)$ .  $\square$

*Osservazione 5.*  $\eta$  è un esempio di *trasformazione naturale tra funtori*; cioè se  $\mathfrak{C}$  ed  $\mathfrak{D}$  sono categorie ed  $F, G : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  sono funtori, una trasformazione naturale tra  $F$  e  $G$  è data da un morfismo  $\eta_C : F(C) \rightarrow G(C)$  per ogni  $C \in \mathfrak{C}$ , in modo che per ogni  $C, D \in \mathfrak{C}$  e morfismo  $\alpha : C \rightarrow D$  il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} F(C) & \xrightarrow{\eta_C} & G(C) \\ \alpha_* \downarrow & & \downarrow \alpha_* \\ F(D) & \xrightarrow{\eta_D} & G(D) \end{array}$$

**Definizione 13.** Un  $\Lambda$ -modulo si dice *colibero* se è (isomorfo a)  $\prod_{i \in I} \text{Hom}_\mathbb{Z}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$

*Osservazione 6.* Se  $\Lambda = \mathbb{Z}$  abbiamo che  $\text{Hom}_\mathbb{Z}(\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  (tramite  $\varphi \mapsto \varphi(1)$ ) e quindi questa definizione è coerente con quella data per i gruppi abeliani.

**Teorema 22.** Ogni  $\Lambda$ -modulo sinistro  $A$  può essere immerso in un modulo colibero.

*Dimostrazione.*  $A$  è un gruppo abeliano e quindi sappiamo (perché lo abbiamo visto nella dimostrazione del teorema 20) che per ogni  $a \in A$  esiste  $\vartheta_a : A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  omomorfismo di gruppi abeliani tale che  $\vartheta_a(a) \neq 0$  se  $a \neq 0$ ; in particolare  $\vartheta_a \in \text{Hom}_\mathbb{Z}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  e quindi posso considerare (teorema 21)  $\varphi_a = \eta_A^{-1}(\vartheta_a) : A \rightarrow \text{Hom}_\mathbb{Z}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ , inoltre se  $a \neq 0$   $\varphi_a(a)(1) = \eta_A^{-1}(\vartheta_a)(a)(1) = \vartheta_a(a) \neq 0$  cioè  $\varphi_a(a) \neq 0$ . E adesso

$$\begin{array}{ccc} & \prod_{a \in A} (\text{Hom}_\mathbb{Z}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}))_a & \\ & \nearrow \varphi & \downarrow \pi_a \\ A & \xrightarrow{\varphi_a} & \text{Hom}_\mathbb{Z}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \end{array}$$

e  $\varphi$  è iniettiva perché  $a \neq 0 \Rightarrow \pi_a(\varphi(a)) = \varphi_a(a) \neq 0 \Rightarrow \varphi(a) \neq 0$ .  $\square$

**Teorema 23.** Un  $\Lambda$ -modulo colibero è iniettivo.

*Dimostrazione.* Basta dimostrare che  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  è iniettivo. Sia

$$\begin{array}{ccc} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \\ & \uparrow \alpha & \\ B & \xleftarrow{\sigma} & A \xleftarrow{\quad} 0 \end{array}$$

dobbiamo dimostrare che esiste  $\beta : B \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  che fa commutare il diagramma. Ma applicando la trasformazione naturale  $\eta_A$  e usando il fatto che  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  è iniettivo sappiamo che

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \\ & \nearrow \delta & \uparrow \eta_A(\alpha) \\ B & \xleftarrow{\sigma} & A \xleftarrow{\quad} 0 \end{array}$$

dove gli omomorfismi sono di gruppi abeliani. E quindi possiamo definire  $\beta = \eta_B^{-1}(\delta) : B \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  che è un omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli.

Resta da vedere che  $\beta$  fa commutare il diagramma; per definizione  $\delta = \eta_B(\beta)$  e usando la naturalità di  $\eta$  abbiamo  $\eta_A(\alpha) = \sigma^*(\delta) = \sigma^* \circ \eta_B(\beta) = \eta_A \circ \sigma^*(\beta)$  e poi dall'iniettività di  $\eta_A$ :  $\alpha = \sigma^* \circ \beta$ .  $\square$

**Corollario 24.** Ogni  $\Lambda$ -modulo è sottomodulo di un modulo iniettivo.

**Teorema 25.** Per un  $\Lambda$ -modulo  $I$  le seguenti condizioni sono equivalenti:

- (1)  $I$  è iniettivo.
- (2) Per ogni successione esatta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varepsilon} C \longrightarrow 0$$

la successione

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(C, I) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}(B, I) \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(A, I) \longrightarrow 0$$

è esatta.

- (3) Se  $\mu : I \rightarrow B$  è iniettiva allora esiste  $\beta : B \rightarrow I$  inversa a sinistra di  $\mu$ ; cioè tale che  $\beta \circ \mu = id_I$ .

Moduli

(4)  $I$  è addendo diretto di ogni modulo che lo contiene come sottomodulo.

(5)  $I$  è addendo diretto di un modulo colibero.

*Dimostrazione.* ((1)  $\Rightarrow$  (2)) L'unica cosa da dimostrare è che  $\mu^*$  è surgettiva; sia  $\alpha \in \text{Hom}(A, I)$  allora

$$\begin{array}{ccc} & & I \\ & \nearrow \beta & \uparrow \alpha \\ B & \xleftarrow{\mu} & A \xleftarrow{\quad} 0 \end{array}$$

e quindi  $\alpha = \mu^*(\beta)$ .

((2)  $\Rightarrow$  (3)) Consideriamo la successione esatta

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\pi} \text{coKer } \mu \longrightarrow 0$$

allora  $\mu^* : \text{Hom}(B, I) \rightarrow \text{Hom}(I, I)$  è surgettiva e quindi esiste  $\beta \in \text{Hom}(B, I)$  tale che  $\mu^*(\beta) = \beta \circ \mu = id_I$ .

((3)  $\Rightarrow$  (4)) Sia  $I \subseteq A$ ; consideriamo la successione esatta

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A/I \longrightarrow 0$$

allora esiste  $\beta : A \rightarrow I$  tale che  $\beta \circ i = id_I$  e per il teorema 10  $A \cong I \oplus A/I$ .

((4)  $\Rightarrow$  (5)) Ogni modulo si può immergere in un modulo colibero.

((5)  $\Rightarrow$  (1))  $I$  è addendo diretto di un modulo colibero che in particolare è iniettivo e per la proposizione 16 è iniettivo.  $\square$

*Esempio 5.* - Gli spazi vettoriali su un campo  $K$  sono iniettivi. Se  $W \subseteq V$  è un sottospazio ed  $\alpha : W \rightarrow L$  è applicazione lineare si può estendere  $\alpha$  a  $\tilde{\alpha} : V \rightarrow L$ .

- Le rappresentazioni di gruppi finiti sono  $K[G]$ -moduli iniettivi se  $\text{char } K = 0$  o  $\text{char } K \nmid o(G)$ . Siano  $W \subseteq V$   $K[G]$ -moduli ed  $F$  un supplementare qualsiasi di  $W$  in  $V$  ( $F$  è uno spazio vettoriale ma in generale *non* è un  $K[G]$ -modulo); consideriamo  $\pi_W : V \rightarrow W$  proiezione e sia

$$T = \frac{1}{o(G)} \sum_{\gamma \in G} (g\pi_W)$$

dove  $g\pi_W : v \mapsto g\pi_W(g^{-1}v)$  (usiamo l'ipotesi su  $\text{char } K$  per invertire  $o(G)$ ).  $T$  è un omomorfismo di  $K[G]$ -moduli; infatti è  $K$ -lineare e per ogni  $h \in G, v \in V$

$$T(hv) = \frac{1}{o(G)} \sum_{g \in G} g\pi_W(g^{-1}hv) = \frac{1}{o(G)} \sum_{g \in G} h(h^{-1}g)\pi_W((h^{-1}g)^{-1}v) = \frac{1}{o(G)} \sum_{g' \in G} hg'\pi_W(g'^{-1}v) = hT(v).$$

Ora  $T|_W = id_W$  e  $\text{Ker } T \oplus W = V$ ; infatti se  $w \in \text{Ker } T \cap W$  allora  $w = T(w) = 0$  e quindi  $\text{Ker } T \cap W = (0)$ , inoltre per ogni  $v \in V$   $v - T(v) \in \text{Ker } T$  da cui  $V = \text{Ker } T + W$ . Ora  $\text{Ker } T$  è un  $K[G]$ -modulo. Perciò se  $V$  è un  $K[G]$ -modulo (con le ipotesi dette su  $K$ ) ogni suo sottomodulo ha un addendo diretto e si ragiona come per gli spazi vettoriali.

# Capitolo 2

## Categorie e Funtori

Per definire una categoria  $\mathfrak{C}$  servono tre informazioni:

- (1) Una *classe* di oggetti.
- (2) Per ogni coppia di oggetti  $A, B \in \mathfrak{C}$  un *insieme* di morfismi  $\mathfrak{C}(A, B)$  da  $A$  a  $B$ .
- (3) Per ogni  $A, B, C \in \mathfrak{C}$  una *legge di composizione*

$$\mathfrak{C}(A, B) \times \mathfrak{C}(B, C) \rightarrow \mathfrak{C}(A, C).$$

*Osservazione 7.* I morfismi *non* sono necessariamente funzioni. I termini *classe* e *insieme* sono intesi nel senso della teoria degli insiemi. Infatti il primo esempio di categoria è  $\mathfrak{S}$  in cui gli oggetti sono gli insiemi e i morfismi le funzioni tra insiemi.

Quando si parla di classe ci si può riferire alla teoria assiomatica di Gödel-Bernays<sup>1</sup> anziché a quella di Zermelo-Frankel in cui gli oggetti sono classi e gli insiemi sono classi che appartengono ad altre classi.

Se in una categoria  $\mathfrak{C}$  gli oggetti formano un insieme si parla di *small category*.

A volte si scrive  $f : A \rightarrow B$  per  $f \in \mathfrak{C}(A, B)$ . Una categoria è definita dai tre punti precedenti e dai seguenti *assiomi*:

**(A1)** Se  $A_1 \neq A_2$  o  $B_1 \neq B_2$  allora  $\mathfrak{C}(A_1, B_1) \cap \mathfrak{C}(A_2, B_2) = \emptyset$ .

**(A2, associatività)** Dati  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow C$  ed  $h : C \rightarrow D$  si ha  $h(gf) = (hg)f$ .

---

<sup>1</sup>cfr. [AHS90] e [Ber91]

**(A3, unità)** Per ogni  $A \in \mathfrak{C}$  esiste  $1_A : A \rightarrow A$  morfismo tale che per ogni  $f : A \rightarrow B$  e  $g : C \rightarrow A$

$$1_A g = g, \quad f 1_A = f.$$

*Osservazione 8.* - Per ogni  $A \in \mathfrak{C}$  il morfismo  $1_A$  è univocamente determinato.

- Si può definire il concetto di morfismo invertibile e di oggetti isomorfi.

**Definizione 14.** Un oggetto *zero* in una categoria  $\mathfrak{C}$  è un oggetto tale che per ogni  $X \in \mathfrak{C}$   $\mathfrak{C}(0, X)$  ed  $\mathfrak{C}(X, 0)$  hanno un solo elemento.

Non tutte le categorie hanno uno zero; ad esempio:

- gli anelli commutativi con unità non hanno zero;
- La categoria  $\mathfrak{S}$  degli insiemi non ha zero; gli unici candidati zero sono i singoletti o l'insieme vuoto ( $\emptyset$  è l'unico oggetto tale che  $\mathfrak{C}(\emptyset, X)$  ha un solo elemento per ogni  $X \in \mathfrak{C}$ , mentre i singoletti sono gli unici oggetti tali che  $\mathfrak{C}(X, \{*\})$  ha un solo elemento per ogni  $X$ ). Ma  $\mathfrak{C}(\{*\}, X)$  ha più di un elemento se  $X$  ha più di un elemento e  $\mathfrak{C}(X, \emptyset) = \emptyset$  per ogni  $X \in \mathfrak{S}$  (con  $X \neq \emptyset$ ).

*Osservazione 9.* - Gli zeri di una categoria sono isomorfi tra loro.

- Se esiste uno zero allora per ogni  $X, Y \in \mathfrak{C}$  esiste un morfismo  $0_{X,Y}$  definito da

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{0_{X,Y}} & Y \\ & \searrow & \nearrow \\ & 0 & \end{array}$$

**Definizione 15.** Siano  $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}$  categorie;  $\mathfrak{D}$  è una *sottocategoria* di  $\mathfrak{C}$  se

- (1)  $X \in \mathfrak{D} \Rightarrow X \in \mathfrak{C}$
- (2)  $\mathfrak{D}(X, Y) \subseteq \mathfrak{C}(X, Y)$
- (3)  $f \in \mathfrak{D}(X, Y), g \in \mathfrak{D}(Y, Z) \Rightarrow f \circ_{\mathfrak{D}} g = f \circ_{\mathfrak{C}} g$ .

Se per ogni  $A, B \in \mathfrak{D}$   $\mathfrak{D}(A, B) = \mathfrak{C}(A, B)$   $\mathfrak{D}$  si dice *sottocategoria piena* di  $\mathfrak{C}$ .

*Esempio 6.* -  $\mathfrak{Ab}$  (gruppi abeliani) è una sottocategoria piena di  $\mathfrak{G}$  (gruppi).

- $\mathfrak{A}_1$  (anelli commutativi con unità) è una sottocategoria di  $\mathfrak{A}$  (anelli) ma non è una sottocategoria piena.

Alcuni esempi di categorie:

- $\mathfrak{C} = X$  insieme parzialmente ordinato; i morfismi sono le relazioni  $a \leq b$ . In particolare i morfismi non sono funzioni.
- $\mathfrak{C} = \{G\}$  con  $G$  gruppo.  $\mathfrak{C}(G, G)$  corrispondono alle moltiplicazioni per  $g \in G$  che sono date invertibili. Una sottocategoria è un sottogruppo ma c'è una sola sottocategoria piena:  $\mathfrak{C}$  stessa.

## 2.1 Funtori

**Definizione 16.** Date due categorie  $\mathfrak{C}$  e  $\mathfrak{D}$  un *funto*re  $F : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  è una regola che associa ad un oggetto  $X \in \mathfrak{C}$  un oggetto  $FX \in \mathfrak{D}$  e ad ogni morfismo  $f \in \mathfrak{C}(X, Y)$  un morfismo  $Ff \in \mathfrak{D}(FX, FY)$  in modo che

$$(1) F(fg) = F(f)F(g),$$

$$(2) F(1_X) = 1_{FX}.$$

Esiste il concetto di funto

re identico (con la definizione ovvia) e si possono comporre funtori; quindi esiste anche il concetto di funtore isomorfismo e di categorie isomorfe ma non si rivela molto utile.

*Esempio 7.* -  $F : \mathfrak{G} \rightarrow \mathfrak{Ab}$  funto

re che associa ad un gruppo il suo abelianizzato.

- $\pi_1 : \text{Spazi topologici puntati} \rightarrow \mathfrak{G}$  che associa ad uno spazio topologico con punto base il suo gruppo fondamentale.
- $F : \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$  ( $\mathfrak{M}_\Lambda^l$  è la categoria dei  $\Lambda$ -moduli sinistri) con  $FX = \text{Hom}_\Lambda(A, X)$ .

In generale se  $\mathfrak{C}$  è una categoria ed  $A \in \mathfrak{C}$  il funto

re  $\mathfrak{C}(A, \cdot) : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{G}$  si dice *funto*re rappresentato da  $A$ .

Sia  $\mathfrak{C}$  una categoria; si definisce la categoria  $\mathfrak{C}^{opp}$  con gli stessi oggetti di  $\mathfrak{C}$  e  $\mathfrak{C}^{opp}(X, Y) = \mathfrak{C}(Y, X)$  con la legge di composizione necessaria.  $\mathfrak{C}^{opp}$  ha gli stessi  $1_A$  di  $\mathfrak{C}$  e gli stessi  $0$  (se esistono).

**Definizione 17.** Un *funto*re controvariante  $\mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  è un funto

re  $\mathfrak{C}^{opp} \rightarrow \mathfrak{D}$ .

Un esempio di funto

re controvariante è  $\text{Hom}_\Lambda(\cdot, M)$ .

**Definizione 18.** Un funtore  $F : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  si dice *pieno* se

$$\mathfrak{C}(A, B) \xrightarrow{F} \mathfrak{C}(FA, FB)$$

è surgettiva;  $F$  si dice *fedele* se

$$\mathfrak{C}(A, B) \xrightarrow{F} \mathfrak{C}(FA, FB)$$

è iniettiva e si dice *full embedding* se è pieno, fedele e iniettivo sugli oggetti.

Non è detto che l'immagine di un funtore sia una sottocategoria della categoria di arrivo. Come controesempio si può considerare la categoria data dall'insieme parzialmente ordinato  $S = \{a, b, c, d\}$  con l'ordine riflessivo e  $a \prec b, c \prec d$  e la categoria data da  $T = \{x, y, z\}$  con  $x \prec y, y \prec z, x \prec z$ . Un funtore  $F : S \rightarrow T$  è una funzione che preserva l'ordine, ad esempio  $F : a \mapsto x, b \mapsto y, c \mapsto y, d \mapsto z$ . Se  $FS$  fosse una categoria allora la composizione dei morfismi  $x \rightarrow y \rightarrow z$  sarebbe immagine di un morfismo  $a \rightarrow d$  che non esiste.

Però se il funtore è un *full embedding*  $F\mathfrak{C}$  è una sottocategoria piena.

### 2.1.1 Trasformazioni naturali

**Definizione 19.** Siano  $F$  e  $G$  due funtori  $\mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$ . Una *trasformazione naturale*  $t$  da  $F$  a  $G$  è una regola che assegna ad ogni oggetto  $X \in \mathfrak{C}$  un morfismo  $t_X \in \mathfrak{D}(FX, GX)$  tale che per ogni morfismo  $f : X \rightarrow Y$  il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{t_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{t_Y} & GY \end{array}$$

Se tutti i  $t_X$  sono isomorfismi  $t$  si dice *equivalenza naturale*. I  $t_X$  si dicono *componenti* della trasformazione naturale  $t$ .

Il teorema 21 fornisce un esempio di equivalenza naturale.

11/03/08

Le trasformazioni naturali si possono comporre e la composizione è associativa; perciò possiamo definire:

**Definizione 20.** Se  $F : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  e  $G : \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{C}$  sono funtori che verificano  $FG \cong Id_{\mathfrak{D}}$  (cioè il funtore  $FG$  è naturalmente equivalente al funtore identità  $\mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{D}$ ) e  $GF \cong Id_{\mathfrak{C}}$  allora  $\mathfrak{C}$  e  $\mathfrak{D}$  si dicono *categorie equivalenti*.

*Esempio 8.* Sia  $\mathfrak{V}_K^d$  la categoria degli spazi vettoriali su  $K$  di dimensione  $d$  ed  $\mathfrak{R}^d$  la categoria con l'unico oggetto  $\mathbb{R}^d$  ed  $\mathfrak{R}^d(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d) = \text{End}(\mathbb{R}^d)$ . Allora esiste un funtore  $F : \mathfrak{R}^d \rightarrow \mathfrak{V}_K^d$  (iniezione classica) e un altro funtore  $G : \mathfrak{V}_K^d \rightarrow \mathfrak{R}^d$  che per ogni spazio vettoriale sceglie una base (questo è possibile perché nella teoria assiomatica di Gödel-Bernays è presente il cosiddetto *axiom of global choice*).  $F$  e  $G$  producono un'equivalenza naturale tra le due categorie.

### 2.1.2 Biduale di spazi vettoriali

Con gli strumenti introdotti finora possiamo formalizzare in modo preciso il fatto che, nel caso di dimensione finita, l'isomorfismo tra uno spazio vettoriale e il suo biduale è canonico. Sia  $\mathfrak{V}_K$  la categoria degli spazi vettoriali su  $K$  e consideriamo " $i : \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$ "; cioè ad ogni  $V \in \mathfrak{V}_K$  associamo un'applicazione lineare  $i_V : V \rightarrow V^{**}$  definita da  $i_V(v) = \tilde{v}$  e se  $\varphi \in V^*$   $\tilde{v}(\varphi) = \varphi(v)$ . Vogliamo interpretare  $i$  come una trasformazione naturale. Consideriamo il funtore identico  $\mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$  ed il funtore duale  $*$  :  $\mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$  che associa ad uno spazio  $V \in \mathfrak{V}_K$  il suo duale  $V^* \in \mathfrak{V}_K$  ed ad un'applicazione lineare  $\varphi : V \rightarrow W$  la sua trasposta  $\varphi^* : W^* \rightarrow V^*$  (cioè  $\varphi^*(f) = f \circ \varphi$ ). Componendo il funtore duale con se stesso otteniamo il funtore *biduale*  $** : \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$ .  $i$  è una trasformazione naturale tra il funtore identico ed il funtore biduale:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{i_V} & V^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ W & \xrightarrow{i_W} & W^{**} \end{array}$$

il diagramma commuta; infatti sia  $\varphi \in W^*$ ,  $f^{**} \circ i_V(v)(\varphi) = i_V(v)(f^*(\varphi)) = i_V(v)(\varphi \circ f) = (\varphi \circ f)(v)$ ; ma anche  $(i_W \circ f)(v)(\varphi) = f(v)(\varphi) = \varphi(f(v)) = (\varphi \circ f)(v)$ .

Se  $V$  ha dimensione finita  $i_V$  è un isomorfismo dunque  $i$  induce su  $\mathfrak{V}_K^d$  un'equivalenza naturale.

Se  $\mathfrak{C}$  ed  $\mathfrak{D}$  sono categorie indichiamo con  $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$  la categoria in cui gli oggetti sono i funtori fra  $\mathfrak{C}$  e  $\mathfrak{D}$  ed  $\text{mor}(F, G)$  sono le trasformazioni naturali. In generale non è detto che  $\text{mor}(F, G)$  sia un insieme.

*Esercizio 5.* Trovare il controesempio.

Ma se  $\mathfrak{C}$  ed  $\mathfrak{D}$  sono *small category* allora  $\text{mor}(F, G)$  è un insieme.

## 2.2 Costruzioni universali

### 2.2.1 Prodotti e coprodotti di oggetti in categorie

**Definizione 21.** Sia  $\{X_i\}_{i \in I}$  una famiglia di oggetti in una categoria  $\mathfrak{C}$ ; un *prodotto*  $(X, \{p_i\}_{i \in I})$  è dato da un oggetto  $X \in \mathfrak{C}$  e dai morfismi  $p_i \in \mathfrak{C}(X, X_i)$  tali che

$$\begin{array}{ccc}
 & & X_i \\
 & \nearrow f_i & \uparrow p_i \\
 Y & \xrightarrow{\exists! f} & X
 \end{array}$$

Se il prodotto esiste è unico.

- In  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$  il prodotto esiste sempre ed è  $\prod$  (prodotto diretto).
- Anche in  $\mathfrak{S}$  il prodotto esiste sempre ed è il prodotto cartesiano.
- In  $\mathfrak{S}(2)$  (insiemi di cardinalità 2) non esiste il prodotto. Infatti supponiamo di avere il seguente diagramma commutativo in  $\mathfrak{S}(2)$  e supponiamo che  $D$  sia un prodotto.

$$\begin{array}{ccc}
 & & B \\
 & \nearrow f & \uparrow \pi_B \\
 A & \xrightarrow{h} & D \\
 & \searrow g & \downarrow \pi_C \\
 & & C
 \end{array}$$

Allora  $\pi_B$  e  $\pi_C$  devono essere surgettive (basta scegliere  $f$  e  $g$  surgettive) e quindi (sono morfismi in  $\mathfrak{S}(2)$ ) iniettive. Segue che  $h = \pi_B^{-1} \circ f = \pi_C^{-1} \circ g \Rightarrow g = \pi_C \circ \pi_B^{-1} \circ f$  che è assurdo (perché  $|\mathfrak{S}(2)(A, C)| > 1$ ).

- Nella categoria dei gruppi ciclici non esiste il prodotto.

*Esempio 9.* Consideriamo la categoria  $\mathfrak{S}_{tor}$  dei gruppi di torsione. Posso considerare il prodotto diretto nella categoria dei gruppi abeliani ma il prodotto di gruppi di torsione non è necessariamente un gruppo di torsione (ad esempio  $\prod_{n \in \mathbb{N}_{>0}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ). Però se  $\{G_i\}_{i \in I}$  è una famiglia di gruppi di torsione,  $H$  è un gruppo di torsione,  $T \subseteq \prod_{i \in I} G_i$  è il sottogruppo di torsione ed abbiamo

$$\begin{array}{ccc}
 & & G_i \\
 & \nearrow f_i & \uparrow \pi_i \\
 H & \xrightarrow{f} & \prod_{i \in I} G_i
 \end{array}$$

allora necessariamente  $f(H) \subseteq T$  e quindi  $T$  è il prodotto nella categoria dei gruppi di torsione di  $\{G_i\}_{i \in I}$ . In particolare il prodotto esiste ma non coincide con quello di  $\mathfrak{Ab}$ .

**Definizione 22.** In una categoria  $\mathfrak{C}$  il *coprodotto* di una famiglia  $\{X_i\}_{i \in I}$  è il prodotto degli  $\{X_i\}_{i \in I}$  nella categoria  $\mathfrak{C}^{opp}$ . In particolare è dato da un oggetto  $\coprod_{i \in I} X_i \in \mathfrak{C}$  e dai morfismi  $g_i : X_i \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$  tali che

$$\begin{array}{ccc}
 & X_i & \\
 f_i \swarrow & & \downarrow g_i \\
 Y & \xleftarrow{\exists! f} & \coprod_{i \in I} X_i
 \end{array}$$

- In  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$  il coprodotto è la somma diretta.
- In  $\mathfrak{S}$  è l'unione disgiunta.
- Nella categoria degli spazi topologici è l'unione disgiunta (con la topologia ovvia)
- In  $\mathfrak{G}$  è il prodotto libero  $G * H$ .

**Definizione 23.** In una categoria  $\mathfrak{C}$  un *oggetto iniziale* è un  $X \in \mathfrak{C}$  tale che per ogni  $Y \in \mathfrak{C}$   $\mathfrak{C}(X, Y)$  ha un solo elemento; un *oggetto terminale* è un  $X \in \mathfrak{C}$  tale che per ogni  $Y \in \mathfrak{C}$   $\mathfrak{C}(Y, X)$  ha un solo elemento.


*Esempio 10.* Un oggetto iniziale di una categoria  $\mathfrak{C}$  è un coprodotto su di un insieme vuoto di indici; un oggetto finale è un prodotto su di un insieme vuoto di indici.

### 2.2.2 Pull back e push out

**Definizione 24.** In una categoria  $\mathfrak{C}$  dato uno schema

$$\begin{array}{ccc}
 & B & \\
 & \downarrow \varphi & \\
 C & \xrightarrow{\psi} & D
 \end{array}$$


il *pull back* di  $(\varphi, \psi)$  è dato da un oggetto  $Y \in \mathfrak{C}$  e dai morfismi  $\alpha : Y \rightarrow B$  e  $\beta : Y \rightarrow C$  tali che  $\varphi \circ \alpha = \psi \circ \beta$  e




cioè tale che  $\forall Z \in \mathfrak{C}, \gamma : Z \rightarrow B, \delta : Z \rightarrow C$  che fanno commutare il diagramma esiste un unico  $\xi : Z \rightarrow Y$  che fa commutare il diagramma.

Come sempre se il pull back esiste è unico.

- Mettiamoci in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$  e consideriamo



Perché il diagramma commuti bisogna che  $\varphi \circ \pi_B = \psi \circ \pi_C$ . Perciò definiamo  $\langle \varphi, -\psi \rangle : B \times C \rightarrow D$  ( $B \times C$  indica il prodotto diretto) come  $\langle \varphi, -\psi \rangle(b, c) = \varphi(b) - \psi(c)$  e consideriamo  $A = \text{Ker } \langle \varphi, -\psi \rangle$ . Adesso il diagramma commuta per definizione;  $A$  è il pullback di  $(\varphi, \psi)$ , infatti consideriamo il diagramma



Definiamo  $\tilde{\xi} : Z \rightarrow B \times C$  come  $\tilde{\xi}(z) = (\gamma(z), \delta(z))$ , osserviamo che  $\langle \varphi, -\psi \rangle \circ \tilde{\xi}(z) = \varphi \circ \gamma(z) - \psi \circ \delta(z) = 0$ . Quindi  $\text{Im } \tilde{\xi} \subseteq A$  e  $\tilde{\xi}$  fattorizza tramite l'inclusione definendo  $\xi : Z \rightarrow A$  che fa commutare il diagramma. Questa  $\xi$  è l'unica scelta possibile, infatti se  $\eta : Z \rightarrow A$  è un altro omomorfismo che fa commutare il diagramma allora scrivendo  $\eta(z) = (\eta_1(z), \eta_2(z))$  si ha che  $\eta_1(z) = \pi_B \circ \eta(z) = \gamma(z)$  ed  $\eta_2(z) = \pi_C \circ \eta(z) = \delta(z)$ .

Categorie e Funtori

- In  $\mathfrak{S}$  se  $B, C \subseteq D$  ed  $i_B : B \rightarrow D$  e  $i_C : C \rightarrow D$  sono le inclusioni il pullback di  $(i_B, i_C)$  è  $B \cap C$  con le inclusioni ovvie.
- In  $\mathfrak{S}$  il pullback di  $(\varphi, \psi)$  è

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\pi_B} & B \\ \pi_C \downarrow & & \downarrow \varphi \\ C & \xrightarrow{\psi} & D \end{array}$$

dove  $A = \{(c, d) \in C \times D : \varphi(c) = \psi(d)\}$ .

Spesso il pull back si chiama *prodotto fibrato* (termine che viene dalla topologia).

Il push out è il pull back in  $\mathfrak{C}^{opp}$  però è meglio darne una definizione esplicita

**Definizione 25.** Sia  $\mathfrak{C}$  una categoria,  $Y, B, C \in \mathfrak{C}$  oggetti e  $\alpha : Y \rightarrow B$ ,  $\beta : Y \rightarrow C$  morfismi; allora il *push out* di  $(\alpha, \beta)$  è dato da un oggetto  $D \in \mathfrak{C}$  e due morfismi  $\varphi : B \rightarrow D$  e  $\psi : C \rightarrow D$  tali che  $\varphi \circ \alpha = \psi \circ \beta$  e

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\ C & \xrightarrow{\psi} & D \end{array} \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \exists! \\ \downarrow \\ Z \end{array}$$

Ad esempio in  $\mathfrak{S}$  il pushout di

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\alpha} & G \\ \beta \downarrow & & \\ & & H \end{array}$$

è il prodotto amalgamato  $G * H / \langle \alpha(f)\beta(f)^{-1} = id : f \in F \rangle$ .

*Esercizio 6.* Esprimere il push out in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \beta \downarrow & & \\ & & C \end{array}$$

e l'omomorfismo  $\langle \alpha, -\beta \rangle : Y \rightarrow B \oplus C, y \mapsto (\alpha(y), -\beta(y))$ . Sia  $D = \text{coKer } \langle \alpha, -\beta \rangle$ , chiamiamo  $i_B : B \rightarrow B \oplus C$ ,  $i_C : C \rightarrow B \oplus C$  le inclusioni e  $\pi : B \oplus C \rightarrow D$  la proiezione al quoziente. Definiamo  $\varphi = \pi \circ i_B$  e  $\psi = \pi \circ i_C$ ; per ogni  $y \in Y$  si ha  $\varphi \circ \alpha(y) = [(\alpha(y), 0)] = [(0, \beta(y))] = \psi \circ \beta(y)$ . Verifichiamo che  $D$  è il pushout del diagramma; consideriamo

$$\begin{array}{ccc}
 Y & \xrightarrow{\alpha} & B \\
 \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 C & \xrightarrow{\psi} & D \\
 & \searrow \delta & \downarrow \gamma \\
 & & Z
 \end{array}$$

Definiamo  $\tilde{\xi} : B \oplus C \rightarrow Z$  come  $\tilde{\xi}(b, c) = \gamma(b) + \delta(c)$ , osserviamo che  $\tilde{\xi} \circ \langle \alpha, -\beta \rangle(y) = \gamma \circ \alpha(y) - \delta \circ \beta(y) = 0$  e quindi  $\text{Im } \langle \alpha, -\beta \rangle \subseteq \text{Ker } \tilde{\xi}$  e  $\tilde{\xi}$  passa al quoziente e definisce  $\xi : D \rightarrow Z$  che fa commutare il diagramma.

Vediamo che  $\xi$  è l'unica scelta possibile, infatti se  $\eta$  è un altro omomorfismo che fa commutare il diagramma, allora  $\eta([b, c]) = \eta \circ \pi(b, 0) + \eta \circ \pi(0, c) = \eta \circ \varphi(b) + \eta \circ \psi(c) = \gamma(b) + \delta(c)$ .  $\square$

## 2.3 Funtori aggiunti

La costruzione che segue serve, tra le altre cose, a definire cos'è un oggetto libero in una categoria. Partiamo con un esempio; sia  $F : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{M}_\Lambda^l$  con  $FS = \bigoplus_{s \in S} \Lambda_s$  (il modulo libero su  $S$ ) e  $G : \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$  funtore dimenticante.

Sia  $A \in \mathfrak{M}_\Lambda^l$  ed  $S \in \mathfrak{S}$ ; posso considerare  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A)$  e  $\mathfrak{S}(S, GA)$  e definire una corrispondenza biunivoca

$$\begin{array}{ccc}
 \eta_{SA} : \mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A) & \leftrightarrow & \mathfrak{S}(S, GA) \\
 \varphi : FS \rightarrow A & \rightarrow & \varphi|_S : S \rightarrow GA \\
 \tilde{f} : FS \rightarrow A & \leftarrow & f : S \rightarrow GA
 \end{array}$$

Vogliamo interpretare  $\eta_{SA}$  come equivalenza di funtori; per farlo dobbiamo dare un senso al seguente diagramma

$$\begin{array}{ccc}
 \mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A) & \xrightarrow{\eta_{SA}} & \mathfrak{S}(S, GA) \\
 \mathfrak{M}_\Lambda^l(\Gamma) \downarrow & & \downarrow \mathfrak{S}(\Gamma) \\
 \mathfrak{M}_\Lambda^l(FS_1, A_1) & \xrightarrow{\eta_{S_1 A_1}} & \mathfrak{S}(S_1, GA_1)
 \end{array}$$

La prima cosa da capire è di che tipo di funtori vogliamo esibire un'equivalenza.  $\eta_{SA}$  manda morfismi in morfismi; perciò dobbiamo associare ad

un insieme  $S$  e ad un modulo  $A$  l'insieme dei morfismi  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A)$ . Inoltre di  $\eta_{SA}$  sappiamo solo che è corrispondenza biunivoca, perciò di  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A)$  consideriamo solo la struttura di insieme.

Vediamo di formalizzare a modo la cosa. Siano  $\mathfrak{C}$  ed  $\mathfrak{D}$  categorie; definiamo la categoria  $\mathfrak{C} \times \mathfrak{D}$  che ha per oggetti coppie di oggetti  $(C, D)$  e per morfismi coppie di morfismi  $(\varphi, \psi)$ . Dunque i nostri funtori vorrebbero essere del tipo  $\mathfrak{S} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$ ; ad una coppia  $(S, A)$  sappiamo associare l'insieme  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A)$  ma come associamo alla coppia di morfismi  $(\varphi : S \rightarrow S_1, \psi : A \rightarrow A_1)$  un morfismo (di insiemi, quindi una funzione)  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A) \rightarrow \mathfrak{M}_\Lambda^l(FS_1, A_1)$ ? Se invece di avere  $\varphi : S \rightarrow S_1$  avessimo  $\varphi : S_1 \rightarrow S$  potremmo associare ad  $\alpha \in \mathfrak{M}_\Lambda^l(FS, A)$  la composizione

$$FS_1 \xrightarrow{\tilde{\varphi}} FS \xrightarrow{\alpha} A \xrightarrow{\psi} A_1$$

Non c'è problema! Definiamo il nostro funtore del tipo  $\mathfrak{S}^{opp} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$ . In questo modo un morfismo  $\varphi \in \mathfrak{S}^{opp}(S, S_1)$  è una funzione  $\varphi : S_1 \rightarrow S$ .

A questo punto possiamo dire (in modo sensato) che  $\eta$  è un'equivalenza naturale tra i funtori  $\mathfrak{M}_\Lambda^l(F \cdot, \cdot) : \mathfrak{S}^{opp} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$  e  $\mathfrak{S}(\cdot, G \cdot) : \mathfrak{S}^{opp} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$ .

Si dirà che  $F$  è l'aggiunto sinistro di  $G$  e si scriverà  $F \dashv G$ . L'aggiunto sinistro del funtore dimenticante (quando esiste) costruirà gli oggetti liberi.

**Definizione 26.** Dati  $F : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  e  $G : \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{C}$  funtori ed  $\eta = \eta_{XY} : \mathfrak{D}(FX, Y) \rightarrow \mathfrak{C}(X, GY)$  equivalenza naturale tra i funtori  $\mathfrak{D}(F \cdot, \cdot) : \mathfrak{C}^{opp} \times \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{S}$  e  $\mathfrak{C}(\cdot, G \cdot) : \mathfrak{C}^{opp} \times \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{S}$ ; si dice che  $F$  è *aggiunto sinistro* di  $G$  e  $G$  è *aggiunto destro* di  $F$  e si scrive  $F \dashv G$ .

In concetti di gruppo libero (nella categoria  $\mathfrak{G}$ ) e di algebra polinomiale  $K[x_1, \dots, x_n]$  sono esprimibili in termini di funtori aggiunti sinistri del funtore dimenticante.

Consideriamo il funtore dimenticante dalla categoria delle  $K$ -algebre alla categoria  $\mathfrak{V}_K$  degli spazi vettoriali su  $K$ ; il suo aggiunto sinistro è il funtore che associa ad uno spazio vettoriale  $V$  l'algebra tensoriale  $\mathcal{T}(V)$ .

*Esempio 11.* In  $\mathfrak{V}_K$  il funtore duale è l'aggiunto di se stesso.

*Dimostrazione.* Il funtore duale è controvariante, cioè è un funtore  $\mathfrak{V}_K^{opp} \rightarrow \mathfrak{V}_K$ , quindi è un po' delicato definire l'aggiunzione. Consideriamo i due funtori  $F : \mathfrak{V}_K^{opp} \rightarrow \mathfrak{V}_K$  e  $G : \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K^{opp}$ , dove  $F(V) = V^*$  e se  $\varphi : W \rightarrow V \in \mathfrak{V}_K^{opp}(V, W)$  allora  $F(\varphi) = \varphi^* : V^* \rightarrow W^* \in \mathfrak{V}_K(V^*, W^*)$ ; mentre  $G(V) = V^*$  e se  $\psi : V \rightarrow W \in \mathfrak{V}_K(V, W)$  allora  $G(\psi) : W^* \rightarrow V^* \in \mathfrak{V}_K^{opp}(V^*, W^*)$ .

Dunque  $\mathfrak{V}_K(F \cdot, \cdot)$  è un funtore  $\mathfrak{V}_K \times \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{S}$  tale che  $\mathfrak{V}_K(F \cdot, \cdot)(V, W) = \text{Hom}(V^*, W)$  e se  $f : V_1 \rightarrow V_2$  e  $g : W_1 \rightarrow W_2$  sono morfismi, allora

$\mathfrak{V}_K(F\cdot, \cdot)(f, g) : \text{Hom}(V_1^*, W_1) \rightarrow \text{Hom}(V_2^*, W_2)$  è definito da  $\mathfrak{V}_K(F\cdot, \cdot)(f, g)(\varphi) = g \circ \varphi \circ f^*$ .

Mentre  $\mathfrak{V}_K^{opp}(\cdot, G\cdot) : \mathfrak{V}_K \times \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{S}$  è tale che  $\mathfrak{V}_K^{opp}(\cdot, G\cdot)(V, W) = \text{Hom}(W^*, V)$  e  $\mathfrak{V}_K^{opp}(\cdot, G\cdot)(f, g) = f \circ \varphi \circ g^*$ .

Se chiamiamo  $\xi : \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$  l'equivalenza naturale tra il funtore biduale e quello identico (è l'inversa di quella vista in precedenza) possiamo definire la nostra aggiunta come

$$\begin{aligned} \eta_{VW} : \mathfrak{V}_K(FV, W) &\rightarrow \mathfrak{V}_K^{opp}(V, GW) \\ (\varphi : V^* \rightarrow W) &\mapsto (\xi_V \circ \varphi^* : W^* \rightarrow V). \end{aligned}$$

È facile vedere che tutte le componenti  $\eta_{VW}$  sono isomorfismi. Perché  $\eta$  sia un'aggiunzione bisogna che il seguente diagramma commuti (dove  $f : V_1 \rightarrow V_2$  e  $g : W_1 \rightarrow W_2$ )

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(V_1^*, W_1) & \xrightarrow{\eta_{V_1W_1}} & \text{Hom}(W_1^*, V_1) \\ (f,g) \downarrow & & \downarrow (f,g) \\ \text{Hom}(V_2^*, W_2) & \xrightarrow{\eta_{V_2W_2}} & \text{Hom}(W_2^*, V_2) \end{array}$$

Ora se  $\varphi \in \text{Hom}(V_1^*, W_1)$  percorrendo il diagramma in un verso otteniamo  $\eta_{V_2W_2}(g \circ \varphi \circ f^*) = \xi_{V_2} \circ f^{**} \circ \varphi^* \circ g^* = f \circ \xi_{V_1} \circ \varphi^* \circ g^*$  (dove abbiamo usato la naturalità di  $\xi$ ), mentre percorrendolo nell'altro verso otteniamo proprio  $f \circ \xi_{V_1} \circ \varphi^* \circ g^*$ . Perciò  $F \dashv G$ .  $\square$

*Esercizio 7.* Rileggere il teorema 21 come aggiunta tra i funtori  $\Phi : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$  dimenticante e  $\Gamma : \mathfrak{Ab} \rightarrow \mathfrak{M}_\Lambda$ , con  $\Gamma G = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)$ .


*Dimostrazione.* Il teorema 21 fornisce un'equivalenza naturale  $\xi = \eta^{-1}$  tra i funtori  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\cdot, G)$  e  $\text{Hom}_\Lambda(\cdot, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G))$  definita da  $(\psi : A \rightarrow G) \mapsto (a \mapsto \psi(\cdot a))$ . Per interpretarla come aggiunta bisogna che l'equivalenza sia naturale anche nella seconda variabile. Possiamo verificarlo per  $\eta$ , siano dunque  $\alpha : B \rightarrow A$  e  $\beta : G \rightarrow H$  morfismi nelle rispettive categorie; consideriamo il seguente diagramma

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_\Lambda(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)) & \xrightarrow{\eta_{AG}} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G) \\ (\alpha, \beta) \downarrow & & \downarrow (\alpha, \beta) \\ \text{Hom}_\Lambda(B, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, H)) & \xrightarrow{\eta_{BH}} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(B, H) \end{array}$$


Sia  $\varphi : A \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Lambda, G)$ , allora per ogni  $b \in B$   $(\alpha, \beta)(\eta_{AG}(\varphi))(b) = \beta(\eta_{AG}(\varphi)(\alpha(b))) = \beta(\varphi(\alpha(b))(1))$ . Mentre  $\eta_{BH}((\alpha, \beta)(\varphi))(b) = (\alpha, \beta)(\varphi)(b)(1) = \beta(\varphi(\alpha(b))(1))$  e il diagramma commuta.  $\square$

17/03/08

**Definizione 27.** Sia  $\mathfrak{C}$  una categoria con zero,  $A, B \in \mathfrak{C}$  ed  $\sigma : A \rightarrow B$  morfismo; il *nucleo* di  $\sigma$  è dato da un oggetto  $K \in \mathfrak{C}$  ed un morfismo  $\tau : K \rightarrow A$  tale che  $\sigma \circ \tau = 0$  e per ogni  $L \in \mathfrak{C}$  e  $\gamma : L \rightarrow A$  tale che  $\sigma \circ \gamma = 0$  esiste un unico morfismo  $\tau_0 : L \rightarrow K$  tale che  $\tau \circ \tau_0 = \gamma$ . Oppure, con un diagramma:




Dualmente il *conucleo* di  $\sigma$  è dato da un oggetto  $C \in \mathfrak{C}$  ed un morfismo  $\tau : B \rightarrow C$  tale che  $\tau \circ \sigma = 0$  e per ogni  $L \in \mathfrak{C}$  e  $\gamma : B \rightarrow L$  tale che  $\gamma \circ \sigma = 0$  esiste un unico morfismo  $\tau_0 : C \rightarrow L$  tale che  $\tau_0 \circ \tau = \gamma$ . Oppure, con un diagramma:



**Teorema 26.** Se  $G : \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{C}$  ha un aggiunto sinistro (cioè se  $G$  è un aggiunto destro) allora  $G$  preserva prodotti, pull-back e nuclei.

*Dimostrazione.* Vediamo i prodotti. Sia  $\{Y_i\}_{i \in I}$  una famiglia in  $\mathfrak{D}$  ed  $Y = \prod_{i \in I} Y_i$  con le proiezioni  $\pi_i : Y \rightarrow Y_i$  prodotto in  $\mathfrak{D}$ ; vogliamo dimostrare che  $GY$  con le proiezioni  $G\pi_i : GY \rightarrow GY_i$  è il prodotto dei  $\{GY_i\}_{i \in I}$  in  $\mathfrak{C}$ .

Sia  $X \in \mathfrak{C}$  e consideriamo i morfismi  $f_i : X \rightarrow GY_i$ . Allora applicando  $\eta_{XY}^{-1}$  otteniamo



Ma possiamo considerare il seguente *naturality square*:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathfrak{D}(FX, Y) & \xrightarrow{\eta_{XY}} & \mathfrak{C}(X, GY) \\
 \mathfrak{D}(F \cdot, \cdot)((id, \pi_i)) \downarrow & & \downarrow \mathfrak{C}(\cdot, G \cdot)((id, G\pi_i)) \\
 \mathfrak{D}(FX, Y_i) & \xrightarrow{\eta_{XY_i}} & \mathfrak{C}(X, GY_i)
 \end{array}$$

Adesso  $g \in \mathfrak{D}(FX, Y)$  e seguendo un percorso sul quadrato otteniamo  $g \mapsto \pi_i \circ g \mapsto \eta_{XY_i}(\pi_i \circ g) = \eta_{XY_i}(\eta_{XY_i}^{-1}(f_i)) = f_i$  e seguendo l'altro  $g \mapsto \eta_{XY}(g) \mapsto G\pi_i \circ \eta_{XY}(g)$  e per la naturalità dell'aggiunzione (cioè la commutatività del quadrato)  $G\pi_i \circ \eta_{XY}(g) = f_i$ ; cioè

$$\begin{array}{ccc} & & GY_i \\ & \nearrow f_i & \uparrow G\pi_i \\ X & \xrightarrow[\eta_{XY}(g)]{} & GY \end{array}$$

Per avere che  $GY$  è il prodotto dei  $\{GY_i\}$  manca l'unicità. Sia  $f' : X \rightarrow GY$  che fa commutare il diagramma e  $g' = \eta_{XY}^{-1}(f') : FX \rightarrow Y$ . Ora  $G\pi_i \circ f' = f_i \Rightarrow \eta_{XY_i}^{-1}(f_i) = \eta_{XY_i}^{-1}(G\pi_i \circ f') = \pi_i \circ \eta_{XY}^{-1}(f') = \pi_i \circ g'$  (dove abbiamo usato la naturalità di  $\eta^{-1}$ ) e dal fatto che  $Y$  è un prodotto abbiamo  $g' = g$  e quindi  $f' = \eta_{XY}(g)$ .

Vediamo anche i pull-back, consideriamo i seguenti diagrammi

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\ C & \xrightarrow{\psi} & D \end{array} \quad \begin{array}{ccc} GY & \xrightarrow{G\alpha} & GB \\ G\beta \downarrow & & \downarrow G\varphi \\ GC & \xrightarrow{G\psi} & GD \end{array}$$

vogliamo dimostrare che se il quadrato a sinistra è un pullback anche quello a destra lo è. Siano  $Z \in \mathfrak{C}$  e  $\gamma : Z \rightarrow GB$ ,  $\delta : Z \rightarrow GC$  morfismi che lasciano il diagramma a destra commutativo; possiamo costruire i seguenti:

$$\begin{array}{ccc} FZ & \xrightarrow{\eta_{ZB}^{-1}(\gamma)} & B \\ \xi \searrow & & \downarrow \varphi \\ Y & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\ C & \xrightarrow{\psi} & D \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\gamma} & GB \\ \eta_{ZY}(\xi) \searrow & & \downarrow G\varphi \\ GY & \xrightarrow{G\alpha} & GB \\ G\beta \downarrow & & \downarrow G\varphi \\ GC & \xrightarrow{G\psi} & GD \end{array}$$

Dobbiamo dimostrare che il diagramma a destra commuta. Consideriamo il *naturality square*

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{D}(FZ, Y) & \xrightarrow{\eta_{ZY}} & \mathfrak{C}(Z, GY) \\ \mathfrak{D}(F, \cdot)((id, \alpha)) \downarrow & & \downarrow \mathfrak{C}(\cdot, G)((id, G\alpha)) \\ \mathfrak{D}(FZ, B) & \xrightarrow{\eta_{ZB}} & \mathfrak{C}(X, GB) \end{array}$$

Seguendo il quadrato lungo un percorso si ottiene  $\xi \mapsto \eta_{ZY}(\xi) \mapsto G\alpha \circ \eta_{ZY}(\xi)$  mentre lungo l'altro si ottiene  $\xi \mapsto \alpha \circ \xi \mapsto \eta_{ZB}(\alpha \circ \xi) = \eta_{ZB}(\eta_{ZB}^{-1}(\gamma)) = \gamma$  e per

naturalità  $G\alpha \circ \eta_{ZY}(\xi) = \gamma$ . Allo stesso modo si dimostra che  $G\beta \circ \eta_{ZY}(\xi) = \delta$ . Vediamo l'unicità; se  $\omega : Z \rightarrow GY$  è tale che  $G\alpha \circ \omega = \gamma$  e  $G\beta \circ \omega = \delta$  allora applicando  $\eta^{-1}$  si ha  $\eta_{ZB}^{-1}(\gamma) = \eta_{ZB}^{-1}(G\alpha \circ \omega) = \alpha \circ \eta_{ZY}^{-1}(\omega)$  e  $\eta_{ZC}^{-1}(\delta) = \eta_{ZV}^{-1}(G\beta \circ \omega) = \beta \circ \eta_{ZY}^{-1}(\omega)$  e dal fatto che il quadrato a sinistra è un pull-back abbiamo  $\eta_{ZY}^{-1}(\omega) = \xi \Rightarrow \omega = \eta_{ZY}(\xi)$ .

Per i nuclei si dimostra allo stesso modo. □

*Osservazione 10.* Vale anche il teorema duale; vale a dire se  $F : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$  ha un aggiunto destro (cioè è un aggiunto sinistro) allora  $F$  preserva coprodotti, push-out e conuclei.

# Capitolo 3

## Estensioni di moduli

**Definizione 28.** Siano  $A$  e  $B$   $\Lambda$ -moduli; un'estensione di  $A$  tramite  $B$  è una successione esatta corta

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow E \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

Un esempio di estensione che si può costruire per ogni coppia di moduli è

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow A \oplus B \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

questa si chiama *estensione banale*.

**Definizione 29.** Siano  $A$  e  $B$   $\Lambda$ -moduli; due estensioni di  $A$  tramite  $B$  si dicono *equivalenti* se esiste  $\psi : E \rightarrow E'$  che fa commutare

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & E & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \psi & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

*Osservazione 11.* Se tale  $\psi$  esiste è un isomorfismo, per il teorema 1.

Quella appena definita è una relazione d'equivalenza.

Chiamiamo  $E(A, B)$  l'insieme delle classi di equivalenza di estensioni. Mostriamo che su  $E(A, B)$  si può mettere una struttura di gruppo e lo faremo nel seguente modo; dimostreremo che  $E(\cdot, \cdot) : \mathfrak{M}_\Lambda^{l\text{ opp}} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$  è un funtore e costruiremo un altro funtore  $\text{Ext}(\cdot, \cdot) : \mathfrak{M}_\Lambda^{l\text{ opp}} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$ . Infine mostriamo che componendo  $\text{Ext}$  con il funtore dimenticante si ottiene un funtore equivalente ad  $E(\cdot, \cdot)$ ; in questo modo  $E(A, B)$  eredita la struttura di gruppo di  $\text{Ext}(A, B)$ .

*Estensioni di moduli*

*Esempio 12.* Esibiamo due estensioni che *non* sono equivalenti.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{3 \cdot} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{1 \mapsto [1]} & \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{3 \cdot} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{1 \mapsto [2]} & \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

se esistesse  $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  che fa commutare il diagramma avremmo dalla commutatività del primo quadrato che per  $n \in \mathbb{Z}$   $3n = \varphi(3n) = 3\varphi(n)$  e quindi  $\varphi(n) = n$ . Mentre dalla commutatività del secondo avremmo  $[2n] = [n]$  che è assurdo.

Osserviamo che nessuna delle due estensioni è banale infatti se così fosse avremmo che  $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  che è assurdo perché il secondo ha torsione.

**Lemma 27.** Il quadrato

$$\begin{array}{ccc}
 Y & \xrightarrow{\alpha} & A \\
 \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 B & \xrightarrow{\psi} & X
 \end{array}$$

è un pull-back se e solo se la successione

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{(\alpha, \beta)} A \oplus B \xrightarrow{\langle \varphi, -\psi \rangle} X$$

è esatta.

*Dimostrazione.* La successione è esatta se e solo se  $(Y, (\alpha, \beta))$  è il nucleo di  $\langle \varphi, -\psi \rangle$ . Cioè se e solo per  $(\gamma, \delta) : Z \rightarrow A \oplus B$  tale che  $\langle \varphi, -\psi \rangle \circ (\gamma, \delta) = 0$  esiste un unico omomorfismo  $\tau : Z \rightarrow Y$  tale che  $(\alpha, \beta) \circ \tau = (\gamma, \delta)$ . Se e solo se per ogni  $\gamma : Z \rightarrow A$ ,  $\delta : Z \rightarrow B$  tale che  $\varphi \circ \gamma = \psi \circ \delta$  esiste un unico  $\tau : Z \rightarrow Y$  tale che

$$\begin{array}{ccc}
 Z & \xrightarrow{\gamma} & A \\
 \exists! \tau \swarrow & & \downarrow \varphi \\
 Y & \xrightarrow{\alpha} & A \\
 \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 B & \xrightarrow{\psi} & X \\
 \delta \searrow & & \\
 & & 
 \end{array}$$

se e solo se il quadrato è un pull-back. □

**Lemma 28.** Se il quadrato

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\alpha} & A \\ \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\ B & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

è un pull-back allora

- (1)  $\beta$  induce un isomorfismo  $\text{Ker } \alpha \rightarrow \text{Ker } \psi$ .
- (2) Se  $\psi$  è surgettiva allora  $\alpha$  è surgettiva.

*Dimostrazione.* (1) Usiamo il fatto che conosciamo già una costruzione esplicita del pull-back ed il pull-back è unico a meno di isomorfismo; perciò possiamo costruire il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccc} Z & & & & \\ & \searrow \vartheta & & \searrow \pi_A & \\ & & Y & \xrightarrow{\alpha} & A \\ & & \beta \downarrow & & \downarrow \varphi \\ & & B & \xrightarrow{\psi} & X \\ & \swarrow \pi_B & & & \end{array}$$

Dove  $Z = \text{Ker } \langle \varphi, -\psi \rangle \subseteq A \oplus B$  e  $\vartheta$  è isomorfismo. In particolare  $\vartheta$  induce un isomorfismo  $\text{Ker } \pi_A \rightarrow \text{Ker } \alpha$  (per il fatto che è isomorfismo e che il diagramma commuta). Ora  $\text{Ker } \pi_A = \{(0, b) : b \in B\}$  e  $\pi_B(0, b) = b$  e  $0 = \langle \varphi, -\psi \rangle(0, b) = \varphi(0) - \psi(b) \Rightarrow \psi(b) = 0$  cioè  $\pi_B(\text{Ker } \pi_A) \subseteq \text{Ker } \psi$ .

Ora ovvio che  $\pi_B|_{\text{Ker } \pi_A}$  è iniettiva; infatti se  $\pi_B(0, b) = 0$  allora  $b = 0$ . Ma se  $b \in \text{Ker } \psi$  allora  $(0, b) \in \text{Ker } \langle \varphi, -\psi \rangle$  e quindi  $\pi_B(\text{Ker } \pi_A) = \text{Ker } \psi$ .

In sostanza  $\pi_B|_{\text{Ker } \pi_A} : \text{Ker } \pi_A \rightarrow \text{Ker } \psi$  è isomorfismo e  $\vartheta(\text{Ker } \pi_A) = \text{Ker } \alpha$ ; quindi  $\beta = \pi_B \circ \vartheta^{-1} : \text{Ker } \alpha \rightarrow \text{Ker } \psi$  è isomorfismo.

- (2) Sia  $a \in A$ ; allora per surgettività esiste  $b \in B$  tale che  $\varphi(a) = \psi(b)$  e  $(a, b) \in \text{Ker } \langle \varphi, -\psi \rangle = \text{Im } (\alpha, \beta)$  (dove l'uguaglianza viene dal lemma precedente) e in particolare  $a = \alpha(a')$ .

□

**Lemma 29.** Consideriamo il diagramma commutativo con righe esatte

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa'} & E' & \xrightarrow{\nu'} & A' & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \xi \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

allora il quadrato a destra è un pull-back.

*Dimostrazione.* Sia  $P$  un pull-back e consideriamo:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \psi & \swarrow \vartheta & \downarrow \alpha & & \\
 & & B & \xrightarrow{\kappa'} & E' & \xrightarrow{\nu'} & A' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \xi & \swarrow & \downarrow \alpha & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Per la proposizione precedente  $\psi$  induce un isomorfismo tra  $\text{Ker } \varepsilon$  e  $\text{Ker } \nu \cong B$  e quindi possiamo definire  $\mu : B \rightarrow P$  in modo che il diagramma commuti e le righe siano esatte. Per la proprietà universale del pull-back possiamo definire  $\vartheta : E' \rightarrow P$  tale che  $\psi \circ \vartheta = \xi$  e  $\varepsilon \circ \vartheta = \nu'$ .  $\vartheta$  mantiene il diagramma commutativo, infatti  $\varepsilon \circ \vartheta \circ \kappa' = \nu' \circ \kappa' = 0 \Rightarrow \text{Im } \vartheta \circ \kappa' \subseteq \text{Ker } \varepsilon$  e  $\psi|_{\text{Ker } \varepsilon} \circ \vartheta \circ \kappa' = \xi \circ \kappa' = k = \psi|_{\text{Ker } \varepsilon} \circ \mu$  e  $\psi|_{\text{Ker } \varepsilon}$  si cancella perché è isomorfismo (lemma 28).

Allora per il teorema 1  $\vartheta$  è un isomorfismo.  $\square$

Come al solito vale anche la proposizione duale.

Abbiamo detto che interpretiamo  $E(\cdot, \cdot)$  come un bifuntore;  $\mathfrak{M}_\Lambda^{l, opp} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$ . Intanto vediamo come possiamo definire il funtore (controvariante)  $E(\cdot, B)$ . Sia  $\alpha : A' \rightarrow A$ ; dobbiamo definire una corrispondenza tra estensioni in  $E(A, B)$  ed estensioni in  $E(A', B)$ . Consideriamo

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\kappa} E \xrightarrow{\nu} A \longrightarrow 0$$

Possiamo costruire il pull-back di  $(\nu, \alpha)$ :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & E^\alpha & \xrightarrow{\nu'} & A' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \xi \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

osserviamo che  $\nu'$  è surgettiva per il lemma 28. Inoltre per esattezza  $\text{Ker } \nu = \text{Im } \kappa \cong B$  e per il solito lemma  $\xi|_{\text{Ker } \nu'} : \text{Ker } \nu' \rightarrow \text{Ker } \nu$  è isomorfismo. Quindi possiamo definire  $\kappa' = \xi|_{\text{Ker } \nu'}^{-1} \circ \kappa : B \rightarrow E^\alpha$  che solleva  $\kappa$  ottenendo il diagramma con righe esatte.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa'} & E^\alpha & \xrightarrow{\nu'} & A' \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \xi \downarrow & & \downarrow \alpha \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

e così associamo all'estensione data l'estensione

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\kappa'} E^\alpha \xrightarrow{\nu'} A' \longrightarrow 0$$

*Osservazione 12.* Consideriamo due estensioni equivalenti:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \psi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa_1} & E_1 & \xrightarrow{\nu_1} & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

e sia  $\alpha : A' \rightarrow A$  omomorfismo; allora se il quadrato

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\eta} & A' \\ \xi \downarrow & & \downarrow \alpha \\ E & \xrightarrow{\nu} & A \end{array}$$

è un pull-back allora lo è anche

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\eta} & A' \\ \psi \circ \xi \downarrow & & \downarrow \alpha \\ E' & \xrightarrow{\nu_1} & A \end{array}$$

Questo segue facilmente dal fatto che  $\psi$  è isomorfismo e fa commutare il diagramma.

**Proposizione 30.** La definizione data di  $\alpha^* : E(A, B) \rightarrow E(A', B)$  non dipende dal rappresentante scelto nella classe di equivalenza.

*Dimostrazione.*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa'} & E' & \xrightarrow{\nu'} & A' \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \xi & & \downarrow \alpha \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \psi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa_1} & E_1 & \xrightarrow{\nu_1} & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

Dove  $(\nu', \psi \circ \xi)$  è un pull-back per il lemma 29. □

**Proposizione 31.**  $E(\cdot, B)$  è un funtore, cioè:

(1)  $(1_A)^* = id$

*Estensioni di moduli*

(2) Se  $\alpha : A'' \rightarrow A'$  ed  $\alpha' : A' \rightarrow A$  sono morfismi, allora  $(\alpha \circ \alpha')^* = \alpha'^* \circ \alpha^*$ .

*Dimostrazione.* Il primo è ovvio, per il secondo consideriamo la costruzione

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa''} & E'' & \xrightarrow{\nu''} & A'' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \xi' & & \downarrow \alpha' & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa'} & E' & \xrightarrow{\nu'} & A' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \xi & & \downarrow \alpha & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

allora  $(\nu'', \xi \circ \xi')$  è il pullback di  $(\alpha \circ \alpha', \nu)$  (sempre lemma 29) da cui la tesi.  $\square$

Allo stesso modo possiamo costruire il funtore  $E(A, \cdot)$  usando la proposizione duale del lemma 28. Sia  $\beta : B \rightarrow B'$  e consideriamo l'estensione  $0 \longrightarrow B \xrightarrow{\kappa} E \xrightarrow{\nu} A \longrightarrow 0$ . Costruiamo il pushout di  $(\kappa, \beta)$  e sappiamo che  $\kappa'$  è iniettiva e che  $\xi$  induce un isomorfismo  $\tilde{\xi} : \text{coKer } \kappa \rightarrow \text{coKer } \kappa'$ ; sia  $\tilde{\nu} : \text{coKer } \kappa \rightarrow A$  isomorfismo con  $\tilde{\nu} \circ \pi = \nu$  (che esiste per esattezza) e consideriamo

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\pi} & \text{coKer } \kappa & \xrightarrow{\tilde{\nu}} & A & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow \beta & & \downarrow \xi & & \downarrow \tilde{\xi} & & \parallel & & \\
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\kappa'} & E_\beta & \xrightarrow{\pi} & \text{coKer } \kappa' & \xrightarrow{\tilde{\nu}'} & A & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

definiamo  $\tilde{\nu}' = \tilde{\nu} \circ \tilde{\xi}^{-1}$  e  $\nu' = \tilde{\nu}' \circ \pi : E_\beta \rightarrow A$  fa commutare il seguente diagramma

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow \beta & & \downarrow \xi & & \parallel & & \\
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\kappa'} & E_\beta & \xrightarrow{\nu'} & A & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Ma noi vogliamo far vedere che  $E(\cdot, \cdot)$  è un bifuntore. Osserviamo che dati i morfismi  $\alpha : A' \rightarrow A$  e  $\beta : B \rightarrow B'$ , possiamo associare all'estensione  $0 \longrightarrow B \xrightarrow{\kappa} E \xrightarrow{\nu} A \longrightarrow 0$  un'estensione in  $E(A', B')$  in due modi:

applicando prima  $E(\cdot, B)$  e poi  $E(A', \cdot)$  o viceversa. Nel primo caso si ottiene:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\kappa_2} & E_2 & \xrightarrow{\nu_2} & A' \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \beta & & \uparrow \psi & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa_1} & E_1 & \xrightarrow{\nu_1} & A' \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \xi & & \downarrow \alpha \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Mentre nel secondo

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{k_4} & E_4 & \xrightarrow{\nu_4} & A' \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \vartheta & & \downarrow \alpha \\
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{\kappa_3} & E_3 & \xrightarrow{\nu_3} & A \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \beta & & \uparrow \varphi & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Ma le due estensioni ottenute sono equivalenti; infatti consideriamo il seguente diagramma dove  $E_1$  ed  $E_4$  sono pull-back mentre  $E_2$  ed  $E_3$  sono pushout.

Per la commutatività del diagramma  $E_1 \rightarrow E \rightarrow E_3 \rightarrow A$  coincide con  $E_1 \rightarrow A' \rightarrow A$  e quindi per la proprietà universale del pull-back (applicata ad  $E_4$ ) esiste un unico morfismo  $\vartheta : E_1 \rightarrow E_4$  tale che  $E_1 \rightarrow E_4 \rightarrow E_3$  coincide con  $E_1 \rightarrow E \rightarrow E_3$  e  $E_1 \rightarrow E_4 \rightarrow A'$  coincide con  $E_1 \rightarrow A'$ .

Perché il diagramma rimanga commutativo bisogna dire che  $B \rightarrow E_1 \rightarrow E_4$  coincide con  $B \rightarrow B' \rightarrow E_4$ . Chiamiamo  $\xi$  la mappa  $B \rightarrow E_1 \rightarrow E \rightarrow E_3$

## Estensioni di moduli

e  $\psi$  la mappa  $B \rightarrow B' \rightarrow E_2 \rightarrow A'$ ; abbiamo il diagramma

$$\begin{array}{ccc}
 B & & \\
 \downarrow \xi & \searrow \psi & \\
 & E_4 & \longrightarrow A' \\
 & \downarrow & \downarrow \\
 & E_3 & \longrightarrow A
 \end{array}$$

e dunque esiste un'unica  $\vartheta : B \rightarrow E_4$  tale che  $\xi = \varphi \circ \vartheta$  (dove  $\varphi : E_4 \rightarrow E_3$ ) e  $\psi = \eta \circ \vartheta$  (dove  $\eta : E_4 \rightarrow A'$ ). Ma dalla commutatività del diagramma sopra è facile vedere che sia  $B \rightarrow E_1 \rightarrow E_4$  che  $B \rightarrow B' \rightarrow E_4$  soddisfano la condizione e quindi coincidono.

Infine  $E_2$  è un push-out e quindi esiste un morfismo  $E_2 \rightarrow E_4$  tale che a  $B' \rightarrow E_2 \rightarrow E_4$  coincide con  $B' \rightarrow E_4$  e  $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_4$  coincide con  $E_1 \rightarrow E_4$  e in modo simile a prima si verifica che il diagramma commuta.

In particolare le estensioni  $E_2$  ed  $E_4$  sono equivalenti. Questo basta per dire che

**Proposizione 32.**  $E(\cdot, \cdot)$  è un bifuntore  $\mathfrak{M}_\Lambda^{l\text{ opp}} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{S}$ .

*Dimostrazione.* È chiaro che  $E(\cdot, \cdot)(id, id) = id$ ; l'unica cosa da verificare è che  $E(\cdot, \cdot)$  si comporta bene con le composizioni.

Siano  $\alpha_1 : A' \rightarrow A$ ,  $\alpha_2 : A'' \rightarrow A'$ ,  $\beta_1 : B \rightarrow B'$  e  $\beta_2 : B' \rightarrow B''$ . Se chiamiamo  $\alpha_j^*$  e  $\beta_{j*}$  gli omomorfismi indotti dai funtori  $E(\cdot, B)$  ed  $E(A, \cdot)$  (rispettivamente) allora  $E(\cdot, \cdot)((\alpha_2, \beta_2)(\alpha_1, \beta_1)) = \beta_{2*}\beta_{1*}\alpha_2^*\alpha_1^* = \beta_{2*}\alpha_2^*\beta_{1*}\alpha_1^* = E(\cdot, \cdot)(\alpha_2, \beta_2) \circ E(\cdot, \cdot)(\alpha_1, \beta_1)$ .  $\square$

*Osservazione 13.* Se  $P$  è proiettivo un'estensione

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow E \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

spezza e quindi è equivalente all'estensione banale; cioè per ogni modulo  $B$   $E(P, B)$  contiene soltanto la classe di equivalenza dell'estensione banale.

Analogamente se  $I$  è iniettivo  $E(A, I)$  contiene soltanto la classe di equivalenza dell'estensione banale.

## 3.1 Il funtore Ext

Definiamo adesso il funtore  $\text{Ext} : \mathfrak{M}_\Lambda^{l\text{ opp}} \times \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$ . Questo sarà il primo esempio di *funtore derivato*.

**Definizione 30.** Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo; una *presentazione proiettiva* di  $A$  è una successione esatta corta

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\mu} P \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

con  $P$  proiettivo.

Osserviamo che ogni  $\Lambda$ -modulo ha almeno una presentazione proiettiva perché è quoziente di un modulo libero.

Fissato un  $\Lambda$ -modulo  $B$  possiamo considerare la successione esatta (detta *successione derivata* rispetto al funtore  $\text{Hom}(\cdot, B)$ )

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}(P, B) \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}(R, B)$$

e definire  $\text{Ext}^\varepsilon(A, B) = \text{coKer } \mu^* \cong \text{Hom}(R, B) / \mu^* \text{Hom}(P, B)$ . Abbiamo scritto  $\text{Ext}^\varepsilon(A, \cdot)$  per indicare che  $\text{Ext}$  dipende dalla presentazione proiettiva scelta, nel seguito facciamo cadere la  $\varepsilon$  anticipando il fatto che presentazioni proiettive diverse danno funtori  $\text{Ext}(A, \cdot)$  equivalenti.

18/03/08

Sia  $\alpha : A' \rightarrow A$  un omomorfismo e consideriamo due presentazioni proiettive di  $A$  ed  $A'$ :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R' & \xrightarrow{\mu'} & P' & \xrightarrow{\varepsilon'} & A' & \longrightarrow & 0 \\ & & \sigma \downarrow \text{dotted} & & \pi \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Poiché  $P'$  è proiettivo esiste  $\pi : P' \rightarrow P$  che fa commutare il diagramma.  $\pi$  è detto *sollevamento* di  $\alpha$ . Ma  $\pi$  induce  $\sigma : R' \rightarrow R$  che preserva la commutatività. Infatti  $\varepsilon \circ \pi \circ \mu' = \alpha \circ \varepsilon' \circ \mu' = 0$  e quindi  $\text{Im } \pi \circ \mu' \subseteq \text{Ker } \varepsilon = \text{Im } \mu$  e possiamo definire  $\sigma = \mu^{-1} \circ \pi \circ \mu'$ .

Sia  $\psi \in \text{Hom}(R, B)$ , possiamo associare a  $\psi$   $\psi' = \psi \circ \sigma \in \text{Hom}(R', B)$  e in questo modo definire l'applicazione  $\pi^* : \text{Ext}(A, B) \rightarrow \text{Ext}(A', B)$  come  $[\psi] \mapsto [\psi']$ . La chiamiamo  $\pi^*$  perché, dal momento che  $\sigma$  è univocamente determinata da  $\pi$ , non dipende da  $\sigma$ . Osserviamo che  $\pi^*$  è ben definita; infatti sia  $\psi \in \mu^* \text{Hom}(P, B)$ , cioè  $\psi = \varphi \circ \mu$ , allora  $\pi^* \psi = \psi \circ \sigma = \varphi \circ \mu \circ \sigma = \varphi \circ \pi \circ \mu' \in \mu'^* \text{Hom}(P', B)$ .

**Lemma 33.** La mappa  $\pi^*$  non dipende da  $\pi$  ma solo da  $\alpha$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R' & \xrightarrow{\mu'} & P' & \xrightarrow{\varepsilon'} & A' & \longrightarrow & 0 \\ & & \sigma_1 \downarrow \left( \right) \sigma_2 & & \pi_1 \downarrow \left( \right) \pi_2 & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

*Estensioni di moduli*

Osserviamo che  $\varepsilon \circ \pi_1 = \alpha \circ \varepsilon' = \varepsilon \circ \pi_2$  e quindi  $\text{Im}(\pi_1 - \pi_2) \subseteq \text{Ker } \varepsilon$  ed esiste  $\tau : P' \rightarrow R$  tale che  $\pi_1 - \pi_2 = \mu \circ \tau$  e quindi  $\mu \circ (\sigma_1 - \sigma_2) = (\pi_1 - \pi_2) \circ \mu' = \mu \circ \tau \circ \mu' \Rightarrow$  (per iniettività)  $\sigma_1 - \sigma_2 = \tau \circ \mu'$ .

Quindi se  $\varphi \in \text{Hom}(R, B)$   $\pi_1^*([\varphi]) = [\varphi \circ \sigma_1] = [\varphi \circ \sigma_2] + [\varphi \circ \tau \circ \mu'] = [\varphi \circ \sigma_2] = \pi_2^*([\varphi])$ .  $\square$

Per enfatizzare l'indipendenza da  $\pi$  scriviamo  $\alpha^* = (\alpha; P', P) = \pi^*$ .

**Proposizione 34.**  $\text{Ext}(A, \cdot)$  è un funtore covariante  $\mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\beta : B \rightarrow B'$  omomorfismo e

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\mu} P \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

presentazione proiettiva di  $A$ .  $\beta$  induce un omomorfismo  $\beta_* : \text{Hom}(R, B) \rightarrow \text{Hom}(R, B')$ , inoltre se  $\varphi \circ \mu = \mu^*(\varphi) \in \mu^*(\text{Hom}(P, B))$  allora  $\beta_*(\varphi \circ \mu) = \beta \circ \varphi \circ \mu = \mu^*(\beta \circ \varphi)$  e quindi  $\beta_*(\mu^*(\text{Hom}(P, B))) \subseteq \mu^*(\text{Hom}(P, B'))$ . Quindi  $\beta_*$  passa al quoziente ed induce un omomorfismo

$$\beta_* : \underbrace{\text{Hom}(R, B)/\mu^*\text{Hom}(P, B)}_{=\text{Ext}(A, B)} \rightarrow \underbrace{\text{Hom}(R, B')/\mu^*\text{Hom}(P, B')}_{=\text{Ext}(A, B')}.$$

Se abbiamo i morfismi  $\beta_1 : B \rightarrow B'$  e  $\beta_2 : B' \rightarrow B''$  è chiaro che  $(\beta_2 \circ \beta_1)_* = \beta_{2*} \circ \beta_{1*}$  (perché è vero per  $\text{Hom}(R, \cdot)$ ) ed è anche chiaro che  $id_* = id$ .  $\square$

**Proposizione 35.**  $(\alpha; P', P)$  è una trasformazione naturale tra i funtori  $\text{Ext}(A, \cdot)$  ed  $\text{Ext}(A', \cdot)$ .

*Dimostrazione.* Non c'è niente di complicato; sia  $\beta : B \rightarrow B'$  omomorfismo, consideriamo il seguente *naturality square*

$$\begin{array}{ccc} \text{Ext}(A, B) & \xrightarrow{\alpha_B^*} & \text{Ext}(A', B) \\ \beta_* \downarrow & & \downarrow \beta_* \\ \text{Ext}(A, B') & \xrightarrow{\alpha_{B'}^*} & \text{Ext}(A', B') \end{array}$$

Sia  $[\psi] \in \text{Ext}(A, B)$ , seguendo il quadrato da un lato si ottiene  $\beta_* \alpha_B^*([\psi]) = \beta_*([\psi \circ \sigma]) = [\beta \circ \psi \circ \sigma]$  mentre seguendolo dall'altro lato si ottiene  $\alpha_{B'}^* \beta_*([\psi]) = \alpha_{B'}^*([\beta \circ \psi]) = [\beta \circ \psi \circ \sigma]$ .  $\square$

Siano  $\alpha_1 : A' \rightarrow A$  ed  $\alpha_2 : A'' \rightarrow A'$  morfismi e siano date le presentazioni proiettive  $P'', P'$  e  $P$  rispettivamente di  $A'', A'$  ed  $A$ ; è chiaro che  $(\alpha_1 \circ \alpha_2, P'', P') = \pi_1^* \circ \pi_2^*$  da cui

$$(\alpha_2; P'', P')(\alpha_1; P', P) = (\alpha_1 \circ \alpha_2; P'', P)$$

ed è anche chiaro che

$$(1_A; P, P) = 1_{\text{Ext}(A, \cdot)}$$

Perciò anche  $\text{Ext}(\cdot, B)$  è un funtore (controvariante).

Se invece abbiamo due presentazioni proiettive diverse di  $A$ ,  $P$  e  $P'$ , possiamo considerare la trasformazione naturale  $(1_A, P', P)$ .

**Proposizione 36.** Siano

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow P \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

e

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow P' \xrightarrow{\varepsilon'} A \longrightarrow 0$$

presentazioni proiettive di  $A$ . Allora

$$(1_A; P', P) : \text{Ext}^\varepsilon(A, \cdot) \rightarrow \text{Ext}^{\varepsilon'}(A, \cdot)$$

è un'equivalenza naturale.

*Dimostrazione.* Sappiamo già che è una trasformazione naturale; l'unica cosa che c'è da dire è che ogni componente è un isomorfismo. Ma per quanto osservato prima abbiamo che per ogni  $\Lambda$ -modulo  $B$   $(1_A, P, P')(1_A, P', P) = 1_{\text{Ext}^\varepsilon(A, B)}$  e  $(1_A, P', P)(1_A, P, P') = 1_{\text{Ext}^{\varepsilon'}(A, B)}$  da cui la tesi.  $\square$

Diremo che  $\text{Ext}(A, \cdot)$  *non* dipende dalla presentazione proiettiva scelta nel senso di questa proposizione.

**Teorema 37.**  $\text{Ext}(\cdot, \cdot)$  è un bifuntore controvariante nella prima variabile e covariante nella seconda.

*Dimostrazione.* Siano ora  $\alpha : A' \rightarrow A$  e  $\beta : B \rightarrow B'$  omomorfismi. Possiamo costruire un morfismo  $\text{Ext}(A, B) \rightarrow \text{Ext}(A', B')$  in due modi:

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Ext}(A, B') & \\
 \beta_* \nearrow & & \searrow \alpha^* \\
 \text{Ext}(A, B) & & \text{Ext}(A', B') \\
 \alpha^* \searrow & & \nearrow \beta_* \\
 & \text{Ext}(A', B) & 
 \end{array}$$

ma questo è esattamente il *naturality square* visto prima (un po' storto) e quindi i due lati del quadrato inducono lo stesso morfismo che chiamiamo  $(\alpha, \beta)_*$ .

Se abbiamo i morfismi  $\alpha_1 : A' \rightarrow A$ ,  $\alpha_2 : A'' \rightarrow A'$ ,  $\beta_1 : B \rightarrow B'$ ,  $\beta_2 : B' \rightarrow B''$  allora  $(\alpha_2, \beta_2)_* \circ (\alpha_1, \beta_1)_* = \alpha_2^* \circ \beta_2^* \circ \alpha_1^* \circ \beta_1^* = \alpha_2^* \circ \alpha_1^* \circ \beta_2^* \circ \beta_1^* = (\alpha_1 \circ \alpha_2, \beta_2 \circ \beta_1)_*$ .  $\square$

*Estensioni di moduli*

Nel teorema seguente componiamo il funtore  $\text{Ext}$  con il funtore dimenticante e, con un abuso di notazione, chiamiamo il funtore ottenuto  $\text{Ext}$ .

**Teorema 38.** C'è un'equivalenza naturale  $\eta$  tra i funtori  $E(\cdot, \cdot)$  ed  $\text{Ext}(\cdot, \cdot)$ .

*Dimostrazione.* Dobbiamo definire  $\eta$  in componenti; perciò fissiamo  $A$  e  $B$   $\Lambda$ -moduli,  $P$  una presentazione proiettiva di  $A$ ; fissiamo un'estensione in  $E(A, B)$  e consideriamo il diagramma:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \psi & & \downarrow \pi & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & E & \xrightarrow{\nu} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Come al solito esiste  $\pi$  che solleva l'identità e  $\pi$  induce una  $\psi$  che mantiene il diagramma commutativo. Definiamo  $\eta_{AB}(E) = [\psi]$ . Dobbiamo verificare che

- (1) la definizione non dipende da  $\pi$  e che
- (2) non dipende dal rappresentante scelto nella classe di equivalenza in  $E(A, B)$ .

Per il primo punto osserviamo che se  $\pi'$  è un'altro omomorfismo che solleva l'identità allora, come abbiamo fatto in precedenza, costruiamo  $\tau : P \rightarrow B$  tale che  $\pi - \pi' = \kappa\tau$  e quindi  $\psi - \psi' = \tau\mu$  e  $[\psi] = [\psi']$ . Forti di questo fatto è ovvio che  $[\psi]$  non dipende dal rappresentante scelto nella classe di equivalenza in  $E(A, B)$ .

Mostriamo che  $\eta$  è naturale in  $B$ ; sia  $\beta : B \rightarrow B'$  morfismo, sia  $E$  un'estensione in  $E(A, B)$  e consideriamo il seguente diagramma dove abbiamo fissato una presentazione proiettiva di  $A$ .

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \varphi & & \downarrow \pi & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & E & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \beta & & \downarrow \xi & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow \psi & & \uparrow \pi' & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

applicando prima  $E(A, \cdot)(\beta)$  e poi  $\eta_{AB'}$  si ottiene  $[\psi]$ , mentre applicando prima  $\eta_{AB}$  e poi  $\text{Ext}(A, \cdot)(\beta)$  si ottiene  $[\beta \circ \varphi]$ . Ma sappiamo che  $[\psi]$  non



## Estensioni di moduli

In questo modo associamo a  $\psi$  una estensione in  $E(A, B)$  ma dobbiamo verificare che questa costruzione è indipendente dal rappresentante scelto in  $[\psi]$ . Sia  $\psi' = \psi + \tau \circ \mu$  un altro rappresentante in  $[\psi]$  allora  $\beta\psi' = \beta\psi + \beta\tau\mu = \alpha\mu + \beta\tau\mu = (\alpha + \beta\tau)\mu$  e quindi il seguente diagramma commuta (dove  $\alpha' = \alpha + \beta\tau$ ).

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A \longrightarrow 0 \\ & & \psi' \downarrow & & \downarrow \alpha' & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\beta} & Y & \xrightarrow{\gamma} & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

e per il duale del lemma 29 il quadrato a sinistra è un push-out ed otteniamo la stessa estensione.

$\xi_{AB}$  è l'inversa di  $\eta_{AB}$  infatti dal fatto che il diagramma precedente è commutativo abbiamo che  $\eta_{AB}$  associa all'estensione  $Y$  l'elemento  $[\psi] \in \text{Ext}(A, B)$ ; mentre se abbiamo un'estensione in  $E(A, B)$  per il duale del lemma 29 il seguente diagramma è un push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A \longrightarrow 0 \\ & & \psi \downarrow & & \downarrow \alpha & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & E & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

e quindi  $\xi_{AB}(\eta_{AB}(E)) = \xi_{AB}(\psi) = E$ . □

*Esempio 13.* Verifichiamo che lo zero in  $E(A, B)$  è la successione che spezza. Lo 0 in  $\text{Ext}(A, B)$  viene indotto da un morfismo  $\psi : R \rightarrow B$  tale che  $\psi = \tau \circ \mu$  con  $\tau : P \rightarrow B$ :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mu} & P & \xrightarrow{\varepsilon} & A \longrightarrow 0 \\ & & \psi \downarrow & \swarrow \tau & \downarrow \varphi & \searrow \sigma & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\kappa} & Y & \xrightarrow{\nu} & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

Costruiamo un push-out  $(\varphi, \kappa)$  e la mappa  $\nu$  come al solito. Possiamo definire un'inversa destra  $\sigma : A \rightarrow Y$ ;  $(\varphi - \kappa\tau)\mu = 0 \Rightarrow \text{Ker } \varepsilon = \text{Im } \mu \subseteq \text{Ker } (\varphi - \kappa\tau)$  e quindi possiamo definire  $\sigma$  tale che  $\sigma\varepsilon = \varphi - \kappa\tau$ . Ora  $\nu\sigma\varepsilon = \nu\varphi - \nu\kappa\tau = \nu\varphi = \varepsilon$  e quindi  $(\nu\sigma - id_A)\varepsilon = 0$  e  $A = \text{Im } \varepsilon \subseteq \text{Ker } (\nu\sigma - id_A) \Rightarrow \nu\sigma = id_A$  cioè  $\sigma$  è un'inversa destra di  $\nu$  e la successione spezza.

## Calcolo di alcuni Ext

*Esempio 14.* Calcoliamo  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ . Una presentazione proiettiva di  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  è  $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0$ . Applicando Hom otteniamo

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{(4)^*} \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

Sia  $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$  con  $\varphi(1) = [a]$  allora  $(4\cdot)^*(\varphi)(1) = [4a] = 0$  e quindi  $(4\cdot)^*$  è l'applicazione nulla ed  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

Sappiamo allora che ci devono essere quattro (classi di equivalenza di) estensioni; elenchiamole

(0) L'estensione nulla è quella che spezza:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

(1) Un'altra estensione immediata è

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{[a] \mapsto [4a]} \mathbb{Z}/16\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

ci chiediamo quale elemento sia in  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ , vediamo la sua immagine attraverso  $\eta_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}$ .

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{4\cdot} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \psi & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/16\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\varphi$  deve sollevare l'identità, quindi possiamo prendere la proiezione al quoziente  $\varphi(m) = [m]_{16}$ .  $\psi$  quindi deve far commutare il diagramma, cioè deve essere  $[4\psi(n)]_{16} = \varphi(4n) = [4n]_{16}$ . e quindi  $\psi(n) = [n]_4$  va bene e l'estensione data corrisponde ad 1 nell'isomorfismo  $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

(2) Vogliamo costruire l'estensione che corrisponde a 2, cioè all'omomorfismo  $\psi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  definito da  $\psi(n) = [2n]_4$ ; vediamo la sua immagine tramite  $\xi_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}$ .

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{(4\cdot)} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \psi & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \xrightarrow{\kappa} & Y & \xrightarrow{\nu} & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Costruiamo il pushout di  $(4\cdot, \psi)$  e la mappa  $\nu$  come al solito. Ma noi conosciamo una costruzione esplicita del pushout in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ :  $Y = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\text{Im}(4\cdot, -\psi) = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\langle (4, [2]) \rangle \cong (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})/\langle (4, 2), (0, 4) \rangle$ . Ora  $\langle (4, 2), (0, 4) \rangle = \langle (8, 0), (4, 2) \rangle = \langle 8(1, 0), 2(2, 1) \rangle$  ed  $\{(1, 0), (2, 1)\}$  è base di  $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ . Quindi  $Y \cong (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})/\langle (8, 0), (0, 2) \rangle \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  e l'estensione 2 è

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

*Estensioni di moduli*

- (3) Calcoliamo l'estensione 3; come nel punto precedente si costruisce il push-out della mappa  $\psi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, 1 \mapsto 3$  e l'estensione corrispondente è

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow Y \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

dove  $Y = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) / \langle (4, -[3]) \rangle = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) / \langle (4, [1]) \rangle \cong (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \langle (0, 4), (4, 1) \rangle$  e  $\langle (0, 4), (4, 1) \rangle = \langle (16, 0), (4, 1) \rangle$  e come prima  $Y \cong (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \langle 16(1, 0), (4, 1) \rangle \cong \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ .

Ovviamente l'estensione ottenuta non potrà essere equivalente a quella corrispondente ad 1.

*Esempio 15.* Calcoliamo  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ ; la presentazione proiettiva di  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  è la solita  $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{8\cdot} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \longrightarrow 0$ .

$$\text{Ext}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) = \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) / \text{Im}(8\cdot)^* \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Le estensioni sono  $E = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) / Y$  dove

- (0)  $Y = \langle (8, 0) \rangle \Rightarrow E \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ,
- (1)  $Y = \langle (8, [1]) \rangle \Rightarrow E \cong \mathbb{Z}/96\mathbb{Z}$ ,
- (2)  $Y = \langle (8, [2]) \rangle \Rightarrow E \cong \mathbb{Z}/48\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ,
- (3)  $Y = \langle (8, [3]) \rangle \Rightarrow E \cong \mathbb{Z}/32\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/96\mathbb{Z}$ .

**Lemma 39.** (1)  $\text{Ext}(\bigoplus_{i \in I} A_i, B) \cong \prod_{i \in I} \text{Ext}(A_i, B)$ ;

(2)  $\text{Ext}\left(A, \prod_{j \in J} B_j\right) \cong \prod_{j \in J} \text{Ext}(A, B_j)$ .

*Dimostrazione.* (1) Per ogni  $A_i$  scegliamo una presentazione proiettiva

$$0 \longrightarrow R_i \xrightarrow{\mu_i} P_i \xrightarrow{\varepsilon_i} A_i \longrightarrow 0.$$

Passando alle somme otteniamo una presentazione proiettiva

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} R_i \xrightarrow{\mu} \bigoplus_{i \in I} P_i \xrightarrow{\varepsilon} \bigoplus_{i \in I} A_i \longrightarrow 0.$$

Consideriamo il seguente diagramma commutativo in cui le frecce verticali sono isomorfismi:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}\left(\bigoplus_{i \in I} P_i, B\right) & \xrightarrow{\mu^*} & \text{Hom}\left(\bigoplus_{i \in I} R_i, B\right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{i \in I} \text{Hom}(P_i, B) & \xrightarrow{\nu} & \prod_{i \in I} \text{Hom}(R_i, B) \end{array}$$

Allora  $\text{Ext}(\oplus_{i \in I} A_i, B) = (\text{Hom}(\oplus_{i \in I} R_i, B)) / (\mu^* \text{Hom}(\oplus_{i \in I} P_i, B)) \cong$   
 $(\prod_{i \in I} \text{Hom}(R_i, B)) / (\nu \prod_{i \in I} \text{Hom}(P_i, B)) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}(R_i, B) / \mu_i^* \text{Hom}(P_i, B) =$   
 $\prod_{i \in I} \text{Ext}(A_i, B).$

(2) Prendiamo una presentazione proiettiva di  $A$

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\mu} P \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

allora  $\text{Ext}(A, \prod_{j \in J} B_j) = \text{Hom}(R, \prod_{j \in J} B_j) / \mu^* \text{Hom}(P, \prod_{j \in J} B_j) \cong$   
 $(\prod_{j \in J} \text{Hom}(R, B_j)) / (\prod_{j \in J} \mu^* \text{Hom}(P, B_j)) \cong \prod_{j \in J} \text{Hom}(R, B_j) / \text{Hom}(P, B_j) =$   
 $\prod_{j \in J} \text{Ext}(A, B_j).$

□

Parlando di gruppi abeliani quindi abbiamo

- (1)  $\text{Ext}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = (0)$  ed  $\text{Ext}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = (0)$  perché  $\mathbb{Z}$  è libero e le estensioni spezzano.
- (2)  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$
- (3)  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(n, m)\mathbb{Z}.$

Questi fatti insieme al lemma precedente (ed al teorema di struttura) danno il seguente

**Corollario 40.** Se  $A$  è un gruppo abeliano finitamente generato allora  $A$  è libero se e solo se  $\text{Ext}(A, \mathbb{Z}) = 0.$

In generale  $A$  libero  $\Leftrightarrow$  ( $\mathbb{Z}$  è PID)  $A$  proiettivo  $\Leftrightarrow$  ogni successione

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow L \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

spezza. Ma per il corollario precedente se  $A$  è finitamente generato basta controllare le successioni con  $K = \mathbb{Z}.$

In generale  $A$  libero  $\Rightarrow \text{Ext}(A, \mathbb{Z}) = (0)$  ma il viceversa è argomento di ricerca. Comunque esiste il seguente

**Teorema 41** (Stein-Serre). Se  $A$  è un gruppo abeliano di rango numerabile allora  $\text{Ext}(A, \mathbb{Z}) = (0) \Rightarrow A$  libero.

Se invece  $A$  è un gruppo abeliano finito (sempre per il teorema di struttura)  $\text{Ext}(A, \mathbb{Z}) = A.$

*Osservazione 14.* Sia  $0 \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow E \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$  è esatta ed  $(m, n) = 1$  allora  $\text{Ext}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = (0)$  e quindi la successione spezza.

**Ext con gli iniettivi** Possiamo costruire il funtore Ext anche usando le presentazioni iniettive. Una presentazione iniettiva di un modulo  $B$  è una sequenza esatta

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\vartheta} I \xrightarrow{\eta} S \longrightarrow 0$$

Con  $I$  iniettivo (esiste sempre perché sappiamo che ogni modulo si immerge in un modulo iniettivo). Questa induce una successione esatta:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B) \xrightarrow{\vartheta_*} \text{Hom}(A, I) \xrightarrow{\eta_*} \text{Hom}(A, S)$$

e definiamo  $\overline{\text{Ext}}_{\Lambda}^{\vartheta}(A, B) = \text{coKer } \eta_*$ . Si dimostra che  $\overline{\text{Ext}}(\cdot, \cdot)$  è un bifuntore ed è equivalente ad  $\text{Ext}(\cdot, \cdot)$ .

**Proposizione 42.** Se un gruppo abeliano  $A$  ha torsione allora  $\overline{\text{Ext}}(A, \mathbb{Z}) \neq 0$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo una presentazione iniettiva di  $\mathbb{Z}$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Q} & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & & & \nearrow \tilde{\varphi} & & \uparrow \varphi \neq 0 \\ & & & & A & \xleftarrow{i} & \langle a \rangle \end{array}$$

e sia  $a \in A$  di ordine finito ed  $i : \langle a \rangle \rightarrow A$  immersione. Esiste  $\varphi : \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  omomorfismo non nullo (ad esempio  $\varphi(a) = \frac{1}{o(A)}$ ) e per iniettività  $\varphi$  si estende a  $\tilde{\varphi} : A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ .

Ora un omomorfismo  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{Q}$  è necessariamente nullo perché  $A$  ha torsione e quindi  $[\tilde{\varphi}] \neq 0$ .  $\square$

Quindi se  $A$  è un gruppo abeliano ed  $\text{Ext}(A, \mathbb{Z}) = (0)$  allora  $A$  non ha torsione.

### 3.2 Prodotto tensore e funtore Tor

31/03/08

**Definizione 31.** Siano  $A$  un  $\Lambda$ -modulo destro e  $B$  un  $\Lambda$ -modulo sinistro; il prodotto tensore  $A \otimes_{\Lambda} B$  è definito come il quoziente del gruppo abeliano libero sui simboli  $a \otimes b$  con  $a \in A$  e  $b \in B$  con le relazioni:

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2) \otimes b &= (a_1 \otimes b) + (a_2 \otimes b) \\ a \otimes (b_1 + b_2) &= a \otimes b_1 + a \otimes b_2 \\ a\lambda \otimes b &= a \otimes \lambda b. \end{aligned}$$

*Osservazione 15.* Se consideriamo  $\Lambda$  rispettivamente come  $\Lambda$ -modulo destro e sinistro possiamo definire le applicazioni

$$\Lambda \otimes_{\Lambda} B \rightarrow B, \quad A \otimes_{\Lambda} \Lambda \rightarrow A$$

date da  $\lambda \otimes b \mapsto \lambda b$  e  $a \otimes \lambda \mapsto a\lambda$  che risultano essere isomorfismi; infatti le loro inverse sono rispettivamente  $b \mapsto 1 \otimes b$  e  $a \mapsto a \otimes 1$ .

*Osservazione 16.* Un omomorfismo  $\alpha : A \rightarrow A'$  induce un omomorfismo  $\alpha_* : A \otimes_{\Lambda} B \rightarrow A' \otimes_{\Lambda} B$  definito da  $\alpha_*(a \otimes b) = \alpha(a) \otimes b$  e analogamente un omomorfismo  $\beta : B \rightarrow B'$  induce un omomorfismo  $\beta_* : A \otimes_{\Lambda} B \rightarrow A \otimes_{\Lambda} B'$  definito da  $\beta_*(a \otimes b) = a \otimes \beta(b)$ . In questo modo  $\cdot \otimes_{\Lambda} B : \mathfrak{M}_{\Lambda}^r \rightarrow \mathfrak{Ab}$  e  $A \otimes_{\Lambda} \cdot : \mathfrak{M}_{\Lambda}^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$  sono funtori covarianti, inoltre  $\cdot \otimes_{\Lambda} \cdot$  è un bifuntore.

**Teorema 43.** Per ogni  $\Lambda$ -modulo destro  $A$  il funtore  $A \otimes_{\Lambda} \cdot : \mathfrak{M}_{\Lambda}^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$  è aggiunto sinistro del funtore  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \cdot) : \mathfrak{Ab} \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda}^l$ .

*Dimostrazione.* Dobbiamo definire l'equivalenza naturale  $\eta$  tra i due funtori in modo che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A \otimes B, G) & \xrightarrow{\eta_{BG}} & \text{Hom}_{\Lambda}(B, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G)) \\ \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A \otimes \cdot, \cdot)(\vartheta) \downarrow & & \downarrow \text{Hom}_{\Lambda}(\cdot, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \cdot))(\vartheta) \\ \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A \otimes B', G') & \xrightarrow{\eta_{B'G'}} & \text{Hom}_{\Lambda}(B', \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G')) \end{array}$$

dove  $\vartheta = (\vartheta_B : B' \rightarrow B, \vartheta_G : G \rightarrow G')$ . Sia  $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A \otimes B, G)$ , definiamo  $(\eta_{BG}(\psi)(b))(a) = \psi(a \otimes b)$ . Per dimostrare che  $\eta$  è un'equivalenza costruiamo un'inversa  $\xi$ . Sia  $\varphi \in \text{Hom}_{\Lambda}(B, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, G))$ , definiamo  $\xi_{BG}(\varphi)(a \otimes b) = \varphi(b)(a)$ . Ora  $\xi_{BG}(\eta_{BG}(\psi))(a \otimes b) = \eta_{BG}(\psi)(b)(a) = \psi(a \otimes b) \Rightarrow \xi_{BG} \circ \eta_{BG} = id$  e anche  $\eta_{BG}(\xi_{BG}(\varphi))(b)(a) = \xi_{BG}(\varphi)(a \otimes b) = \varphi(b)(a) \Rightarrow \eta_{BG} \circ \xi_{BG} = id$ .

Verifichiamo la naturalità di  $\eta$ . Siano  $\beta : B' \rightarrow B, \gamma : G \rightarrow G'$  e  $\psi : A \otimes B \rightarrow G$  allora  $(\beta, \gamma)_*(\eta_{BG}(\psi))(b')(a) = \gamma \circ \eta_{BG}(\psi)(\beta(b'))(a) = \gamma(\psi(a \otimes \beta(b')))$  mentre  $\eta_{B'G'}((\beta, \gamma)_*(\psi))(b')(a) = (\beta, \gamma)_*(\psi)(a \otimes b') = \gamma(\psi(a \otimes \beta(b')))$ .  $\square$

**Corollario 44.** Siano  $\{B_j\}_{j \in J} \subseteq \mathfrak{M}_{\Lambda}^l$  ed  $A$  un  $\Lambda$ -modulo destro; allora

(1)  $A \otimes_{\Lambda} (\oplus_{j \in J} B_j) = \oplus_{j \in J} (A \otimes_{\Lambda} B_j)$  (perché il funtore  $A \otimes_{\Lambda} \cdot$  preserva i coprodotti).

(2) Se  $B' \longrightarrow B \longrightarrow B'' \longrightarrow 0$  è una successione esatta di  $\Lambda$ -moduli sinistri allora

$$A \otimes_{\Lambda} B' \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} B \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} B'' \longrightarrow 0$$

è esatta (perché  $A \otimes_{\Lambda} \cdot$  preserva i conuclei).

*Estensioni di moduli*

*Osservazione 17.* L'esattezza a sinistra non vale; infatti consideriamo

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

e sia  $A = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ . Allora possiamo costruire il seguente diagramma in cui le frecce verticali sono gli isomorfismi già introdotti e  $[m] \otimes [n] \mapsto [mn]$  è un isomorfismo  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ :

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} & \xrightarrow{p} & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \xrightarrow{\mu} & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Ma  $\mu([n]) = [pn] = 0$  non è iniettiva.

**Definizione 32.**  $B \in \mathfrak{M}_\Lambda^l$  si dice *piatto* se per ogni successione esatta corta di  $\Lambda$ -moduli destri  $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$  la successione

$$0 \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow A'' \otimes B \longrightarrow 0$$

è esatta.

C'è una definizione analoga per i  $\Lambda$ -moduli destri. Osserviamo che  $B \in \mathfrak{M}_\Lambda^l$  è piatto se e solo se per ogni morfismo iniettivo  $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A$  il morfismo indotto  $0 \longrightarrow A' \otimes B \longrightarrow A \otimes B$  è iniettivo.

**Teorema 45.** Ogni modulo proiettivo è piatto.

*Dimostrazione.* Sia  $P$  un  $\Lambda$ -modulo proiettivo, allora  $P$  è addendo diretto di un modulo libero, cioè  $P \oplus P_1 = F$  con  $F$  libero. Siccome il prodotto tensore conserva le somme la successione

$$A' \otimes F \longrightarrow A \otimes F \longrightarrow A'' \otimes F \longrightarrow 0$$

equivale a

$$(A' \otimes P) \oplus (A' \otimes P_1) \longrightarrow (A \otimes P) \oplus (A \otimes P_1) \longrightarrow (A'' \otimes P) \oplus (A'' \otimes P_1) \longrightarrow 0$$

e dunque basta dimostrare la tesi per i moduli liberi. Ma  $F \cong \bigoplus_{i \in I} \Lambda$  ed ancora basta dimostrare la tesi per  $F = \Lambda$ . Infine possiamo considerare il diagramma dove le frecce verticali sono gli isomorfismi noti

$$\begin{array}{ccccccc} A' \otimes \Lambda & \longrightarrow & A \otimes \Lambda & \longrightarrow & A'' \otimes \Lambda & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

e quindi  $A' \otimes \Lambda \longrightarrow A \otimes \Lambda$  è iniettiva. □

**Proposizione 46.** Se  $\Lambda$  è un dominio ad ideali principali, un  $\Lambda$ -modulo  $M$  è piatto se e solo se è libero da torsione.

*Dimostrazione.* ( $\Rightarrow$ ) Qui basta che  $\Lambda$  sia un dominio d'integrità. Sia  $M$  un  $\Lambda$ -modulo sinistro con un elemento di torsione; cioè supponiamo che esistano  $m \in M$  ed  $a \in \Lambda$  tali che  $a \neq 0$ ,  $m \neq 0$  e  $am = 0$ . Allora consideriamo la successione (dove consideriamo  $\Lambda$  come  $\Lambda$  modulo destro)

$$0 \longrightarrow \Lambda \xrightarrow{a\cdot} \Lambda \longrightarrow \Lambda/\langle a \rangle \longrightarrow 0$$

Osserviamo che  $a\cdot$  è iniettiva perché  $\Lambda$  è un dominio. Applicando  $\cdot \otimes M$  otteniamo la successione

$$0 \longrightarrow \Lambda \otimes M \xrightarrow{(a\cdot) \otimes id} \Lambda \otimes M \longrightarrow \Lambda/\langle a \rangle \otimes M \longrightarrow 0$$

Ma  $(a\cdot) \otimes id : 1 \otimes m \mapsto a \otimes m = 1 \otimes am = 1 \otimes 0 = 0$  e quindi non è iniettiva.

( $\Leftarrow$ ) Sia  $M$   $\Lambda$ -modulo sinistro libero da torsione e consideriamo la solita successione esatta

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

e sia  $A' \otimes M \ni \sum(a'_i \otimes b_i) \mapsto \sum(\varphi(a'_i) \otimes b_i) = 0$  con  $\sum(a'_i \otimes b_i) \neq 0$  (attenzione! non vanno considerati solo i tensori semplici  $a \otimes b$ ).

Visto come elemento del gruppo libero abeliano sui simboli  $a \otimes b$  allora  $\sum(\varphi(a'_i) \otimes b_i)$  è somma finita di relazioni e dunque esistono i moduli finitamente generati  $A_0 \subseteq A$ ,  $A'_0 \subseteq A'$  e  $B_0 \subseteq B$  tali che  $\langle a'_i \rangle \subseteq A'_0$ ,  $\langle \varphi(a'_i) \rangle \subseteq A_0$ ,  $\langle b_i \rangle \subseteq B_0$  e  $\sum(\varphi(a'_i) \otimes b_i) = 0$  anche in  $A_0 \otimes B_0$ .

Allora la successione

$$0 \longrightarrow A'_0 \xrightarrow{\varphi} A_0 \longrightarrow A_0/\varphi(A'_0) \longrightarrow 0$$

è esatta ma  $A'_0 \otimes B_0 \xrightarrow{\varphi \otimes id} A_0 \otimes B_0$  non è iniettiva. Però, se  $\Lambda$  è un dominio ad ideali principali, un  $\Lambda$ -modulo finitamente generato e libero da torsione è libero (vedi esercizio seguente) e quindi piatto; da cui l'assurdo. □

*Esempio 16.* Se  $A$  è un anello commutativo e  $S \subseteq A$  è moltiplicativamente chiuso, allora  $S^{-1}A$  è un  $A$ -modulo piatto; infatti per ogni  $A$ -modulo  $M$   $S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M$  e sappiamo che il funtore  $S^{-1}\cdot : \mathfrak{M}_A \rightarrow \mathfrak{M}_A$  è esatto.

### Estensioni di moduli

*Osservazione 18.*  $\mathbb{Q}$  è piatto (perché è uno  $\mathbb{Z}$ -modulo libero da torsione, oppure perché è una localizzazione di  $\mathbb{Z}$ ) ma non è libero.

*Esercizio 8.* Sia  $\Lambda$  un dominio ad ideali principali ed  $M \in \mathfrak{M}_\Lambda^l$  libero da torsione e finitamente generato, allora  $M$  è libero.

*Dimostrazione.* Sia  $\{y_1, \dots, y_m\}$  un insieme di generatori e sia  $\{v_1, \dots, v_n\}$  un suo sottoinsieme linearmente indipendente massimale. Allora esistono  $a_1 \neq 0, b_{11}, \dots, b_{n1}$  tali che

$$a_1 y_1 + b_{11} v_1 + b_{21} v_2 + \dots + b_{n1} v_n = 0,$$

ed analogamente per ogni  $i = 1, \dots, m$  esistono  $a_i \neq 0, b_{1i}, \dots, b_{ni}$  tali che

$$a_i y_i + b_{1i} v_1 + b_{2i} v_2 + \dots + b_{ni} v_n = 0.$$

Sia  $a = a_1 a_2 \dots a_m$ ; allora  $0 \longrightarrow M \xrightarrow{a} M$  è iniettiva perché  $M$  è libero da torsione inoltre  $aM \subseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle \cong \Lambda^n$  dove l'ultimo isomorfismo viene dal fatto che  $v_1, \dots, v_n$  sono linearmente indipendenti. Allora  $M \cong aM$  è sottomodulo di modulo libero e dal fatto che  $\Lambda$  è ad ideali principali abbiamo che  $M$  è libero.  $\square$

### 3.2.1 Il funtore Tor

Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo destro e  $B$  un  $\Lambda$ -modulo sinistro,

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\mu} P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

una presentazione proiettiva di  $A$ ; allora

$$R \otimes B \xrightarrow{\mu_*} P \otimes B \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow 0$$

è esatta. Definiamo  $\text{Tor}(A, B) = \text{Ker } \mu_*$ .

$\text{Tor}(A, \cdot) : \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$  è un funtore covariante; sia  $\varphi : B \rightarrow B'$  omomorfismo, consideriamo

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}(A, B) & \longrightarrow & R \otimes B \\ \varphi_* \downarrow & & \downarrow id \otimes \varphi \\ \text{Tor}(A, B') & \longrightarrow & R \otimes B' \end{array}$$

Osserviamo che  $(\mu \otimes id_{B'}) \circ (id_R \otimes \varphi) = (id_P \otimes \varphi) \circ (\mu \otimes id_B)$  (perché l'uguaglianza vale sui generatori di  $R \otimes B$ ) e quindi  $(id_R \otimes \varphi)(\text{Ker } \mu_*) \subseteq \text{Ker } \mu_*$  e  $id_R \otimes \varphi$  induce una mappa  $\varphi_* : \text{Tor}(A, B) \rightarrow \text{Tor}(A, B')$ .

Se invece consideriamo una presentazione proiettiva di  $B$

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{\nu} Q \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

abbiamo ancora che la successione

$$A \otimes S \xrightarrow{\nu_*} A \otimes Q \longrightarrow A \otimes B \longrightarrow 0$$

è esatta e possiamo definire  $\overline{\text{Tor}}(A, B) = \text{Ker } \nu^*$ . Anche qui  $\overline{\text{Tor}}(\cdot, B)$  è un funtore covariante.

**Definizione 33.** Sia

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \psi \downarrow & \Sigma & \downarrow \varphi \\ A' & \xrightarrow{\beta} & B' \end{array}$$

un quadrato commutativo. Definiamo  $\text{Ker } \Sigma = \text{Ker } \varphi \circ \alpha / (\text{Ker } \alpha + \text{Ker } \psi)$  e  $\text{Im } \Sigma = (\text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta) / \text{Im } (\varphi \circ \alpha)$ .

**Lemma 47.** Siano

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma' & \xrightarrow{\alpha_1} & \Gamma & \xrightarrow{\alpha_2} & \Gamma'' \\ \varphi' \downarrow & \Sigma_1 & \varphi \downarrow & \Sigma_2 & \downarrow \varphi'' \\ A' & \xrightarrow{\beta_1} & A & \xrightarrow{\beta_2} & A'' \end{array}$$

dove le righe sono esatte. Allora  $\text{Im } \Sigma_1 \cong \text{Ker } \Sigma_2$ .

*Dimostrazione.* Dobbiamo dire che  $\text{Ker } \varphi'' \circ \alpha_2 / (\text{Ker } \alpha_2 + \text{Ker } \varphi) \cong (\text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta_1) / \text{Im } \varphi \circ \alpha_1$ .

Osserviamo che se  $\gamma \in \text{Ker } \varphi'' \circ \alpha_2$  allora  $\beta_2 \circ \varphi(\gamma) = \varphi'' \circ \alpha_2(\gamma) = 0 \Rightarrow \varphi(\text{Ker } \varphi'' \circ \alpha_2) \subseteq \text{Ker } \beta_2 = \text{Im } \beta_1 \Rightarrow \varphi(\text{Ker } \varphi'' \circ \alpha_2) \subseteq \text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta_1$ . Ma se  $a = \varphi(\gamma) = \beta_1(a')$  allora  $\varphi'' \circ \alpha_2(\gamma) = \beta_2 \circ \varphi(\gamma) = \beta_2 \circ \beta_1(a') = 0$  e quindi  $\varphi(\text{Ker } \varphi'' \circ \alpha_2) = \text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta_1$ .

Sia  $\pi : \text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta_1 \rightarrow (\text{Im } \varphi \cap \text{Im } \beta_1) / \text{Im } \varphi \circ \alpha_1$  proiezione al quoziente. È chiaro che  $\text{Ker } \alpha_2 + \text{Ker } \varphi = \text{Im } \alpha_1 + \text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \pi \circ \varphi$ ; sia invece  $\gamma \in \Gamma$  tale che  $\varphi(\gamma) = \varphi \circ \alpha_1(\gamma')$ , allora  $\gamma_1 = \gamma - \alpha_1(\gamma') \in \text{Ker } \varphi$  e  $\gamma = \gamma_1 + \alpha_1(\gamma') \in \text{Ker } \alpha_2 + \text{Ker } \varphi$ , da cui  $\text{Ker } \alpha_2 + \text{Ker } \varphi = \text{Ker } \pi \circ \varphi$ .

Perciò  $\varphi$  induce un isomorfismo  $\tilde{\varphi} : \text{Ker } \Sigma_2 \rightarrow \text{Im } \Sigma_1$ .  $\square$

**Proposizione 48.**  $\overline{\text{Tor}}(A, B) \cong \text{Tor}(A, B)$ .

Estensioni di moduli

Dimostrazione. Consideriamo

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & 0 \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & \text{Tor}(A, B) \\
 & & & & & \downarrow \Sigma_5 & \downarrow \\
 & & & 0 & \longrightarrow & \text{Tor}(A, B) & \longrightarrow 0 \\
 & & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & & R \otimes S & \longrightarrow & R \otimes Q & \longrightarrow & R \otimes B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \Sigma_3 & & \downarrow \Sigma_4 & & \downarrow \\
 & & P \otimes S & \longrightarrow & P \otimes Q & \longrightarrow & P \otimes B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \Sigma_2 & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \overline{\text{Tor}}(A, B) & \longrightarrow & A \otimes S & \longrightarrow & A \otimes Q \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \Sigma_1 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

Dove la colonna centrale è esatta perché  $Q$  è proiettivo e la riga centrale è esatta perché  $P$  è proiettivo e i quadrati commutano perché  $\cdot \otimes \cdot$  è un bifunctor. Allora  $\text{Im } \Sigma_1 \cong \text{Ker } \Sigma_2 \cong \text{Im } \Sigma_3 \cong \text{Ker } \Sigma_4 \cong \text{Im } \Sigma_5$ . Ma  $\text{Im } \Sigma_5 \cong \text{Tor}(A, B)$  e  $\text{Im } \Sigma_1 \cong \overline{\text{Tor}}(A, B)$ .  $\square$

01/04/08

Esercizio 9. Sia  $B$  un gruppo abeliano; allora

$$\text{Tor}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, B) = \text{Tor}_m(B) = \{b \in B : mb = 0\}.$$

$\text{Tor}_m(B)$  è la parte di  $m$ -torsione.

Dimostrazione. Sia  $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m \cdot} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0$  la solita presentazione proiettiva di  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . Allora

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{Tor}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, B) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \otimes B & \xrightarrow{m \otimes id} & \mathbb{Z} \otimes B \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes B \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_m(B) & \longrightarrow & B & \xrightarrow{m \cdot} & B \longrightarrow B/mB \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow
 \end{array}$$

dove le righe verticali sono isomorfismi.  $\square$

Esercizio 10. Sia  $R$  un anello commutativo ed  $r \in R$  un elemento non divisore di zero,  $B$  un  $R$ -modulo sinistro, allora  $\text{Tor}(R/(r), B) = \{b \in B : rb = 0\}$  la parte di  $r$ -torsione.

Si dimostra come l'esercizio precedente considerando la successione (dove  $r \cdot$  è iniettiva perché  $r$  non è zero divisore):

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{r \cdot} R \longrightarrow R/(r) \longrightarrow 0$$

*Osservazione 19* (Importante). Possiamo calcolare Tor anche con le presentazioni piatte. Si definisce il funtore  $\text{Tor}^{Fl}$  e si dimostra equivalente al funtore Tor con lo stesso diagramma della proposizione 48, dove la colonna centrale rimane esatta perché la presentazione è piatta.

*Esercizio 11.* Sia  $B$  un gruppo abeliano allora  $\text{Tor}(B, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = T(B)$  è il sottogruppo di torsione.

*Dimostrazione.* Consideriamo la presentazione piatta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Q} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

e quindi la successione esatta

$$0 \longrightarrow \text{Tor}(B, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \longrightarrow B \otimes \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} B \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\pi_*} B \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Se  $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  allora  $B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong S^{-1}B$  tramite  $b \otimes \frac{p}{q} \mapsto \frac{pb}{q}$  ed abbiamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Tor}(B, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) & \longrightarrow & B \otimes \mathbb{Z} & \xrightarrow{i_*} & B \otimes \mathbb{Q} \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \\ & & & & B & \xrightarrow{j} & S^{-1}B \end{array}$$

dove  $j(b) = \frac{b}{1}$ . Se  $b \in T(B)$  ed  $n \in \text{Ann}(b)$  allora  $\frac{b}{1} = \frac{nb}{n} = \frac{0}{1}$ ; viceversa se  $b \in \text{Ker } j$  allora  $\frac{b}{1} = \frac{0}{1}$  ed esiste  $n \in \mathbb{Z}$  tale che  $n(b - 0) = nb = 0$ .  $\square$

# Capitolo 4

## Funtori derivati

### 4.1 Complessi

**Definizione 34.** Sia  $\Lambda$  un anello con unità. Un  $\Lambda$ -modulo graduato è una famiglia  $A = \{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  di  $\Lambda$ -moduli.

Chiamiamo  $\mathfrak{M}_\Lambda^{\mathbb{Z}}$  la categoria dei  $\Lambda$ -moduli graduati. Un *morfismo* di  $\Lambda$ -moduli graduati di *grado*  $k$  tra  $A = \{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  e  $B = \{B_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  è una famiglia  $\varphi = \{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{Z}}$  di omomorfismi  $\varphi_i : A_i \rightarrow B_{k+i}$ .

**Definizione 35.** Un *complesso di catene* è dato da un  $\Lambda$ -modulo graduato  $C = \{C_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  ed un morfismo  $\partial = \{\partial_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathfrak{M}_\Lambda^{\mathbb{Z}}(C, C)$  di grado  $-1$  tale che  $\partial \circ \partial = 0$ .

Un *morfismo di complessi* tra  $(C = \{C_n\}_{n \in \mathbb{Z}}, \partial = \{\partial_n\}_{n \in \mathbb{Z}})$  e  $(D = \{D_n\}_{n \in \mathbb{Z}}, \tilde{\partial} = \{\tilde{\partial}_n\}_{n \in \mathbb{Z}})$  è un morfismo di  $\Lambda$ -moduli graduati  $\varphi \in \mathfrak{M}_\Lambda^{\mathbb{Z}}(C, D)$  di grado  $0$  tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{\partial_n} & C_{n-1} \\ \varphi_n \downarrow & & \downarrow \varphi_{n-1} \\ D_n & \xrightarrow{\tilde{\partial}_n} & D_{n-1} \end{array}$$

Possiamo quindi definire la categoria  $\text{Comp}_\Lambda$  dei complessi su  $\Lambda$ .

#### 4.1.1 Categorie additive

**Definizione 36.** Una categoria  $\mathcal{U}$  si dice *additiva* se

(0) Ha l'elemento  $0$ ,

- (1) ogni coppia di oggetti ha un prodotto,
- (2)  $\forall A, B \in \mathfrak{U}$   $\mathfrak{U}(A, B)$  è un gruppo abeliano,
- (3) la composizione  $\mathfrak{U}(A, B) \times \mathfrak{U}(B, C) \rightarrow \mathfrak{U}(A, C)$  è bilineare.

$\mathfrak{M}_\Lambda^l$  ed  $\mathfrak{M}_\Lambda^r$  sono categorie additive. Anche  $\text{Comp}_\Lambda$  è additiva ma  $\mathfrak{M}_\Lambda^Z$  non è additiva, anche restringendosi ai soli morfismi di grado  $k$ . Comunque  $\mathfrak{M}_\Lambda^Z$  è additiva se ci si restringe ai morfismi di grado 0.

Nelle categorie additive prodotti e somme si comportano come in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ . Introduciamo la seguente notazione se  $A \times B$  è un prodotto ed  $\alpha : Z \rightarrow A, \beta : Z \rightarrow B$  sono morfismi indichiamo con  $\{\alpha, \beta\} : Z \rightarrow A \times B$  il morfismo indotto da  $\alpha$  e  $\beta$ . Analogamente se  $A \oplus B$  è una somma diretta e  $\gamma : A \rightarrow Z, \delta : B \rightarrow Z$  sono morfismi indichiamo il morfismo indotto come  $\langle \gamma, \delta \rangle : A \oplus B \rightarrow Z$ .

Sia  $\mathfrak{U}$  una categoria additiva ed  $A, B \in \mathfrak{U}$ . Chiamiamo  $i_A = \{id_A, 0_{AB}\} : A \rightarrow A \times B$  ed  $i_B = \{0_{BA}, id_B\} : B \rightarrow A \times B$ .

*Osservazione 20.* Se  $\pi_A : A \times B \rightarrow A$  e  $\pi_B : A \times B \rightarrow B$  sono proiezioni, allora  $i_A \circ \pi_A + i_B \circ \pi_B = id_{A \times B}$ .


Infatti, usando il fatto che la composizione è bilineare si ha:  $\pi_A \circ (i_A \circ \pi_A + i_B \circ \pi_B) = \pi_A \circ i_A \circ \pi_A + \pi_A \circ i_B \circ \pi_B = id_A \circ \pi_A + 0_{BA} \circ \pi_B = \pi_A$  e allo stesso modo  $\pi_B \circ (i_A \circ \pi_A + i_B \circ \pi_B) = \pi_B$  e poi si usa la proprietà universale del prodotto (unicità).

*Osservazione 21.* Per ogni  $A, B \in \mathfrak{U}$  il morfismo  $0_{AB}$  è lo 0 del gruppo abeliano  $\mathfrak{U}(A, B)$ .

*Dimostrazione.* Osserviamo che  $\text{Hom}(A, 0) = \{0_A\} = (0)$  e  $\text{Hom}(0, B) = \{0^B\} = (0)$  sono gruppi banali e per bilinearità  $0_{AB} = 0^B \circ 0_A$  è lo zero del gruppo  $\mathfrak{U}(A, B)$ .  $\square$

**Proposizione 49.** Se  $\mathfrak{U}$  è una categoria additiva e  $A, B \in \mathfrak{U}$  allora  $A \times B$  è il coprodotto di  $A$  e  $B$  con le inclusioni  $i_A = \{id_A, 0_{AB}\} : A \rightarrow A \times B$  ed  $i_B = \{0_{BA}, id_B\} : B \rightarrow A \times B$

*Dimostrazione.* Consideriamo



*Funtori derivati*

Definiamo  $\langle \gamma, \delta \rangle : A \times B \rightarrow Z$  come  $\langle \gamma, \delta \rangle = \gamma \circ \pi_A + \delta \circ \pi_B$ . Questo morfismo mantiene il diagramma commutativo, infatti  $\langle \gamma, \delta \rangle \circ i_A = \gamma \circ \pi_A \circ i_A + \delta \circ \pi_B \circ i_A = \gamma \circ id_A + \delta \circ 0_{AB} = \gamma$  ed allo stesso modo  $\langle \gamma, \delta \rangle \circ i_B = \delta$ .

Resta da vedere l'unicità. Se  $\vartheta : A \times B \rightarrow Z$  è un altro morfismo che mantiene il diagramma commutativo, allora (usando l'osservazione precedente)  $\vartheta = \vartheta \circ (i_A \circ \pi_A + i_B \circ \pi_B) = \vartheta \circ i_A \circ \pi_A + \vartheta \circ i_B \circ \pi_B = \gamma \circ \pi_A + \delta \circ \pi_B = \langle \gamma, \delta \rangle$ .  $\square$

Osserviamo che, dal fatto che  $\pi_A \circ i_B = 0_{BA}$  e  $\pi_A \circ i_A = id_A$  abbiamo  $\pi_A = \langle id_A, 0_{BA} \rangle$  e analogamente  $\pi_B = \langle 0_{AB}, id_B \rangle$ .

*Osservazione 22.* Se  $\{\varphi, \psi\} : A \rightarrow B \times C$  e  $\langle \gamma, \delta \rangle : B \times C \rightarrow D$ , allora  $\langle \gamma, \delta \rangle \circ \{\varphi, \psi\} = \gamma \circ \varphi + \delta \circ \psi$ .

*Dimostrazione.*  $\langle \gamma, \delta \rangle \circ \{\varphi, \psi\} = (\gamma \circ \pi_B + \delta \circ \pi_C) \circ \{\varphi, \psi\} = \gamma \circ \pi_B \circ \{\varphi, \psi\} + \delta \circ \pi_C \circ \{\varphi, \psi\} = \gamma \circ \varphi + \delta \circ \psi$ .  $\square$


**Definizione 37.** Un *funtore additivo* è un funtore  $F : \mathfrak{U}_1 \rightarrow \mathfrak{U}_2$  tra categorie additive tale che per ogni  $A, B \in \mathfrak{U}_1$   $F : \mathfrak{U}_1(A, B) \rightarrow \mathfrak{U}_2(FA, FB)$  è un omomorfismo di gruppi abeliani.

**Proposizione 50.** Un funtore  $F : \mathfrak{U}_1 \rightarrow \mathfrak{U}_2$  tra categorie additive è additivo se e solo se preserva le somme di due oggetti se e solo se preserva i prodotti di due oggetti.

*Dimostrazione.* Dimostriamo che se  $F$  preserva i prodotti allora preserva le somme. Siano  $A, B \in \mathfrak{U}_1$ , per ipotesi  $F(A \times B)$  è un prodotto con le proiezioni  $F\pi_A, F\pi_B$ ; inoltre sappiamo che  $F(A \times B)$  è una somma con le inclusioni  $i_{FA} = \{id_{FA}, 0_{FAFB}\}$  e  $i_{FB} = \{id_{FB}, 0_{FBFA}\}$ . Perciò basta dire che  $F0_{AB} = 0_{FAFB}$  e per questo è sufficiente che sia  $F0_{\mathfrak{U}_1} = 0_{\mathfrak{U}_2}$ .

Osserviamo che se  $\varphi : C \rightarrow A$  e  $\psi : B \rightarrow C$  sono morfismi, allora per bilinearità della composizione vale  $0_{AB} \circ \varphi = 0_{CB}$  e  $\psi \circ 0_{AB} = 0_{AC}$  (questo è vero in ogni categoria con 0).

Ogni  $A \in \mathfrak{U}_1$  può essere considerato come il prodotto  $A \times 0$  con le proiezioni  $\pi_A = id_A$  e  $\pi_0 = 0_A$ . Infatti per ogni morfismo  $\varphi : B \rightarrow A$  e  $\psi : A \rightarrow B$  i seguenti diagrammi commutano



Allora  $FA$  è il prodotto  $FA \times F0$  e possiamo costruire il seguente (dove  $\psi$  è l'unico morfismo  $A \rightarrow 0$ )

$$\begin{array}{ccc}
 & & FA \\
 & \nearrow^{0_{F0FA}} & \\
 F0 & \xrightarrow{\vartheta} & FA \\
 & \searrow_{id} & \\
 & & F0
 \end{array}$$

e  $id_{F0} = F\psi \circ \vartheta = F\psi \circ 0_{F0FA} = 0_{F0F0}$ . Perciò per ogni morfismo  $\varphi : B \rightarrow F0$  si ha  $\varphi = id_{F0} \circ \varphi = 0_{F0F0} \circ \varphi = 0_{BF0}$  ed  $F0$  è terminale e per ogni  $\varphi : F0 \rightarrow B$  si ha  $\varphi = \varphi \circ id_{F0} = \varphi \circ 0_{F0F0} = 0_{F0B}$  ed  $F0$  è iniziale.

Adesso dimostriamo che se  $F$  preserva le somme allora  $F : \mathfrak{U}_1(A, B) \rightarrow \mathfrak{U}_1(FA, FB)$  è omomorfismo. Siano  $\varphi, \psi : A \rightarrow B$ , allora  $\varphi + \psi = \langle \varphi, \psi \rangle \circ \{id_A, id_A\}$  e quindi  $F(\varphi + \psi) = \langle F\varphi, F\psi \rangle \circ \{id_{FA}, id_{FA}\} = F\varphi + F\psi$ .

Infine per mostrare che se  $F$  è additivo allora preserva i prodotti basta vedere che

$$\{F\pi_A, F\pi_B\} : F(A \times B) \rightarrow FA \times FB$$

è un isomorfismo e lo facciamo mostrando che  $F i_A \circ \pi_{FA} + F i_B \circ \pi_{FB} : FA \times FB \rightarrow F(A \times B)$  è la sua inversa. Infatti

$$\begin{aligned}
 & \{F\pi_A, F\pi_B\} \circ (F i_A \circ \pi_{FA} + F i_B \circ \pi_{FB}) = \\
 & \{F\pi_A, F\pi_B\} \circ F i_A \circ \pi_{FA} + \{F\pi_A, F\pi_B\} \circ F i_B \circ \pi_{FB} = \\
 & \{F(\pi_A \circ i_A), F(\pi_B \circ i_B)\} \circ \pi_{FA} + \{F(\pi_A \circ i_B), F(\pi_B \circ i_B)\} \circ \pi_{FB} = \\
 & \{id_{FA}, 0\} \circ \pi_{FA} + \{0, id_{FB}\} \circ \pi_{FB} = i_{FA} \circ \pi_{FA} + i_{FB} \circ \pi_{FB} = id_{FA \times FB}.
 \end{aligned}$$

ed anche

$$\begin{aligned}
 & (F i_A \circ \pi_A + F i_B \circ \pi_B) \circ \{F\pi_A, F\pi_B\} = \\
 & F i_A \circ \pi_A \circ \{F\pi_A, F\pi_B\} + F i_B \circ \pi_B \circ \{F\pi_A, F\pi_B\} = \\
 & F i_A \circ F\pi_A + F i_B \circ F\pi_B = F(i_A \circ \pi_A + i_B \circ \pi_B) = F(id_{A \times B}) = id_{F(A \times B)}.
 \end{aligned}$$

□

*Osservazione 23.* Se  $F : \mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'}^l$  è un funtore additivo covariante allora  $C \in \text{Comp}_\Lambda \Rightarrow FC \in \text{Comp}_{\Lambda'}$ ; inoltre associando ad un morfismo  $\varphi : C \rightarrow D$  un morfismo  $F\varphi : FC \rightarrow FD$  nel modo ovvio si ottiene un funtore additivo  $F : \text{Comp}_\Lambda \rightarrow \text{Comp}_{\Lambda'}$ .

Esempi di funtori additivi sono  $A \otimes \cdot$  e  $\text{Hom}(A, \cdot)$ .

**Definizione 38.** Sia  $\dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \dots$  un complesso su  $\Lambda$ ;  $H_*(C)$  è il  $\Lambda$ -modulo graduato  $H_*(C) = \{H_n(C)\}_{n \in \mathbb{Z}}$  con  $H_n(C) = \text{Ker } \partial_n / \text{Im } \partial_{n+1}$ .  $H_n(C)$  è detto *n-esimo modulo di omologia*.

Un morfismo di complessi  $\varphi : C \rightarrow D$  induce un morfismo  $\varphi_* : H_*(C) \rightarrow H_*(D)$  e  $H_* : \text{Comp}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{M}_\Lambda^{\mathbb{Z}}$  risulta un funtore covariante.

$c \in C_n$  si dice *catena*; se  $\partial_n(c) = 0$   $c$  si dice *ciclo* e se  $c = \partial_{n+1}(d)$   $c$  si dice *bordo* (terminologia che viene dalla topologia algebrica).

*Esempio 17.* Sia  $B$  un  $\Lambda$ -modulo sinistro e  $0 \longrightarrow S \longrightarrow Q \longrightarrow B \longrightarrow 0$  una sua presentazione proiettiva; possiamo considerare il *complesso*  $C$ :

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow S \xrightarrow{\partial_1} Q \xrightarrow{\partial_0} 0 \longrightarrow 0$$

e il suo *complesso derivato*  $D$ :

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow A \otimes S \xrightarrow{\tilde{\partial}_1} A \otimes Q \xrightarrow{\tilde{\partial}_0} 0 \longrightarrow 0$$

Allora  $H_1(D) = \text{Ker } \tilde{\partial}_1 / \text{Im } \tilde{\partial}_2 = \text{Tor}(A, B)$  e  $H_0(D) = \text{Ker } \tilde{\partial}_0 / \text{Im } \tilde{\partial}_1 = (A \otimes Q) / (A \otimes S) \cong A \otimes B$ .

### 4.1.2 Caratteristica di Eulero

Sia  $C \in \text{Comp}_{\mathbb{Z}}$  (complesso di catene in cui tutti i  $C_n$  sono gruppi abeliani. Supponiamo che i  $C_n$  siano finitamente generati e che  $C_n = (0)$  per  $n < 0$  e  $n > N$ . Possiamo quindi definire la *caratteristica di Eulero* di  $C$  come

$$\chi(C) = \sum_{u=0}^N (-1)^u \text{rk } H_u(C).$$

Ricordiamo che il rango di un gruppo abeliano  $A$  finitamente generato è definito come  $\text{rk } A/T(A)$  dove  $A/T(A)$  è libero perché finitamente generato e libero da torsione.

Osserviamo che  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A$  ha una struttura di  $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale dove l'azione di  $\mathbb{Q}$  è definita (sui generatori) da  $\lambda_1(\lambda \otimes b) = (\lambda_1 \lambda) \otimes b$  (con  $\lambda, \lambda_1 \in \mathbb{Q}$ ).

**Lemma 51.** Se  $A$  è un gruppo abeliano finitamente generato vale

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A = \text{rk } A.$$

*Dimostrazione.* Dalla seguente successione esatta

$$0 \longrightarrow T(A) \longrightarrow A \longrightarrow A/T(A) \longrightarrow 0$$

ed usando il fatto che  $A/T(A)$  è libero, si ha  $A \cong A/T(A) \oplus T(A)$ . Perciò  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A/T(A) \oplus \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} T(A) \cong \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A/T(A)$ . Dove  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} T(A) = (0)$  perché  $T(A)$  è un gruppo di torsione.

Possiamo quindi supporre che  $A$  sia libero. Sia  $\{a_1, \dots, a_n\}$  una base di  $A$ . Mostriamo che  $\{1 \otimes a_1, \dots, 1 \otimes a_n\}$  è una base di  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A$  come  $\mathbb{Q}$ -spazio.  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A$  è generato come gruppo abeliano dagli elementi

$$\frac{p}{q} \otimes a = \frac{p}{q} 1 \otimes a = \frac{p}{q} 1 \otimes \left( \sum_{i=1}^n n_i a_i \right) = \frac{p}{q} \sum_{i=1}^n n_i (1 \otimes a_i),$$

e quindi  $\{1 \otimes a_1, \dots, 1 \otimes a_n\}$  generano  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A$  come  $\mathbb{Q}$ -spazio. Supponiamo di avere una relazione

$$\sum_{i=1}^n \frac{p_i}{q_i} (1 \otimes a_i) = 0$$

allora detto  $q = q_1 \cdots q_n$  abbiamo

$$\sum_{i=1}^n \frac{p'_i}{q} (1 \otimes a_i) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n p'_i (1 \otimes a_i) = 0$$

e siccome la mappa  $i : \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} A \rightarrow \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A, n \otimes a \mapsto n \otimes a$  è iniettiva ( $\text{Ker } i = \text{Tor}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = T(A) = 0$ ) e  $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A$  è libero su  $\{1 \otimes a_i\}$ , abbiamo  $p'_i = 0 \forall i \Rightarrow p_i = 0 \forall i$ .  $\square$

**Lemma 52.** Se  $0 \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow C \longrightarrow 0$  è successione esatta corta di gruppi abeliani finitamente generati, allora  $\text{rk } A = \text{rk } B + \text{rk } C$

*Dimostrazione.* Ovvio usando il lemma precedente, il fatto che  $\mathbb{Q}$  è piatto e l'analogo risultato per gli spazi vettoriali.  $\square$

**Proposizione 53.** Sia  $C \in \text{Comp}_{\mathbb{Z}}$  un complesso in cui i  $C_n$  sono finitamente generati e  $C_n = 0$  per  $n < 0$  ed  $n > N$ , allora

$$\chi(C) = \sum_{i=0}^N (-1)^i \text{rk } C_i$$

*Dimostrazione.* Consideriamo le successioni esatte (dove  $Z_n = \text{Ker } \partial_n$  e  $B_{n-1} = \text{Im } \partial_n$ )

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow Z_n \longrightarrow C_n \longrightarrow B_{n-1} \longrightarrow 0 \\ 0 &\longrightarrow B_n \longrightarrow Z_n \longrightarrow H_n(C) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

allora  $\text{rk } C_n = \text{rk } Z_n + \text{rk } B_{n-1} = \text{rk } H_n(C) + \text{rk } B_n + \text{rk } B_{n-1}$ , da cui  $\sum_{i=0}^N (-1)^i \text{rk } C_i = \sum_{i=0}^N (-1)^i (\text{rk } H_i(C) + \text{rk } B_i + \text{rk } B_{i-1}) = \sum_{i=0}^N (-1)^i \text{rk } H_i(C) = \chi(C)$ .  $\square$

### 4.1.3 Successione esatta lunga in omologia

**Teorema 54.** Siano  $A, B, C \in \text{Comp}_\Lambda$  e

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

successione esatta corta di complessi. Allora esiste un omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli graduati di grado  $-1$   $\omega : H_*(C) \rightarrow H_*(A)$  (detto *omomorfismo di connessione*) tale che la successione

$$\dots \xrightarrow{\omega_{n+1}} H_n(A) \xrightarrow{\varphi_*} H_n(B) \xrightarrow{\psi_*} H_n(C) \xrightarrow{\omega_n} \dots$$

sia esatta.

*Dimostrazione.* Vediamo inanzitutto come costruire  $\omega$ ; consideriamo il seguente diagramma commutativo con righe esatte

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{\varphi_n} & B_n & \xrightarrow{\psi_n} & C_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n & & \\ 0 & \longrightarrow & A_{n-1} & \xrightarrow{\varphi_{n-1}} & B_{n-1} & \xrightarrow{\psi_{n-1}} & C_{n-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Sia  $[c] \in H_n(C)$  e  $c = \psi_n(b)$ ;  $0 = \partial_n \circ \psi_n(b) = \psi_{n-1} \circ \partial_n(b) \Rightarrow \partial_n(b) = \varphi_{n-1}(a)$  e definiamo  $\omega_n([c]) = [a]$ . È facile vedere che  $\omega_n$  è omomorfismo. Per verificare che  $\omega$  è ben definita dobbiamo dire che

- (1)  $\omega$  non dipende dalla preimmagine  $b$  di  $c$ ,
- (2)  $\omega$  non dipende dal rappresentante  $c \in [c]$ .

Osserviamo che, scelti  $c$  e  $b$ ,  $a$  è univocamente determinato perché  $\varphi_{n-1}$  è iniettiva.

- (1) Sia  $b' \in B_n$  tale che  $\psi(b') = c$ , allora  $b' - b \in \text{Ker } \psi_n = \text{Im } \varphi_n$  e  $b' = b + \varphi_n(a') \Rightarrow \partial_n b' = \partial_n b + \partial_n \circ \varphi_n(a') = \varphi_{n-1}(a) + \varphi_{n-1}(\partial_n a') = \varphi_{n-1}(a + \partial_n a')$  e  $[a + \partial_n a'] = [a]$ .
- (2) Sia  $c' = c + \partial_{n+1} c''$ , allora  $b' = b + \partial_{n+1} b''$  (dove  $\psi_{n+1}(b'') = c''$ ) e  $\partial_n b' = \partial_n b + \partial_{n+1} \circ \partial_n b = \partial_n b$ .

Mostriamo che  $\text{Ker } \psi_* = \text{Im } \varphi_*$ ,  $\psi \circ \varphi = 0 \Rightarrow \psi_* \circ \varphi_* = 0 \Rightarrow \text{Im } \varphi_* \subseteq \text{Ker } \psi_*$ . Sia  $[b] \in \text{Ker } \psi_*$ , allora  $\psi_n(b) = \partial_{n+1} c' = \partial_{n+1} \psi_{n+1}(b') = \psi_n(\partial_{n+1} b')$  e  $b = \varphi_n(a) + \partial_{n+1} b'$  da cui  $[b] = [\varphi_n(a)] = \varphi_*([a])$ .

Adesso vediamo che  $\text{Ker } \omega_n = \text{Im } \psi_*$ . Se  $[c] = \psi([b])$  allora  $\partial_n(b) = 0 \Rightarrow \omega_n([c]) = 0$ . Sia invece  $[c] \in \text{Ker } \omega_n$ , allora  $a = \partial_n a'$  e  $\partial_n b = \varphi_{n-1}(\partial_n a') =$

$\partial_n \varphi(a') \Rightarrow b - \varphi(a') \in \text{Ker } \partial_n$  e  $\psi(b - \varphi(a')) = \psi(b) = c$ , cioè  $[c] = \psi_*([b - \varphi(a')])$ .

Rimane da vedere che  $\text{Im } \omega_n = \text{Ker } \varphi_*$ . Se  $[c] \in H_n(C)$ ,  $\varphi_* \circ \omega_n([c]) = \varphi_*([a]) = [\varphi_{n-1}(a)] = [\partial_n b] = 0$  e quindi  $\text{Im } \omega_n \subseteq \text{Ker } \varphi_*$ . D'altra parte se  $\varphi_*([a]) = 0$  allora  $\varphi_{n-1}(a) = \partial_n b$  e  $[a] = \omega_n([\varphi_n(b)])$ .  $\square$

#### 4.1.4 Successione Hom-Ext

Sia  $\Lambda$  un dominio ad ideali principali ed  $A$ ,  $\Lambda$ -modulo sinistro e

$$0 \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow B'' \longrightarrow 0$$

una successione esatta di  $\Lambda$ -moduli.

Prendiamo una presentazione proiettiva di  $A$  (che, dato che  $\Lambda$  è un PID è una risoluzione libera)  $0 \longrightarrow R \longrightarrow F \longrightarrow A \longrightarrow 0$  applicando i funtori  $\text{Hom}(\cdot, B')$ ,  $\text{Hom}(\cdot, B)$  e  $\text{Hom}(\cdot, B'')$  al complesso

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

otteniamo il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \text{grado 0} & & \text{grado 1} & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C' & 0 \longrightarrow & \text{Hom}(F, B') & \longrightarrow & \text{Hom}(R, B') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C & 0 \longrightarrow & \text{Hom}(F, B) & \longrightarrow & \text{Hom}(R, B) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C'' & 0 \longrightarrow & \text{Hom}(F, B'') & \longrightarrow & \text{Hom}(R, B'') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 
 \end{array}$$

dove le colonne sono esatte perché  $R$  ed  $F$  sono liberi ( $R$  è sottomodulo di libero e  $\Lambda$  è PID).

Abbiamo quindi costruito una successione esatta corta di complessi

$$0 \longrightarrow C' \longrightarrow C \longrightarrow C'' \longrightarrow 0$$

*Funtori derivati*

da cui possiamo ottenere una successione esatta lunga in coomologia

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow H^0(C') \longrightarrow H^0(C) \longrightarrow H^0(C'') \xrightarrow{\omega_0} H^1(C') \longrightarrow H^1(C) \longrightarrow H^1(C'') \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

Ora  $H^0(C') = \text{Hom}(A, B')$ ,  $H^0(C) = \text{Hom}(A, B)$ ,  $H^0(C'') = \text{Hom}(A, B'')$  ed  $H^1(C') = \text{Ext}(A, B')$ ,  $H^1(C) = \text{Ext}(A, B)$ ,  $H^1(C'') = \text{Ext}(A, B'')$  perciò possiamo riscrivere la successione come:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, B') \longrightarrow \text{Hom}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}(A, B'') \xrightarrow{\omega_0} \text{Ext}(A, B') \longrightarrow \text{Ext}(A, B) \longrightarrow \text{Ext}(A, B'') \longrightarrow 0$$

Questa successione è detta *successione Hom-Ext*. Se  $\Lambda$  non è ad ideali principali la successione continuerà con gli  $H^2$  e così via.

*Esercizio 12.* Sia  $\Lambda$  dominio ad ideali principali

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

successione esatta di  $\Lambda$ -moduli,

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

presentazione proiettiva di  $A$ . Ricavare la successione

$$0 \longrightarrow \text{Tor}(A, G') \longrightarrow \text{Tor}(A, G) \longrightarrow \text{Tor}(A, G'') \longrightarrow A \otimes G' \longrightarrow A \otimes G \longrightarrow A \otimes G'' \longrightarrow 0$$

*Dimostrazione.* Applichiamo i funtori  $\cdot \otimes_{\Lambda} G'$ ,  $\cdot \otimes_{\Lambda} G$  e  $\cdot \otimes_{\Lambda} G''$  al complesso di catene

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

ottenendo il seguente diagramma commutativo con colonne esatte (come

prima  $R$  e  $P$  sono liberi):

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \text{grado 1} & & \text{grado 0} & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C' & 0 \longrightarrow & G' \otimes_{\Lambda} R & \longrightarrow & G' \otimes_{\Lambda} P & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C & 0 \longrightarrow & G \otimes_{\Lambda} R & \longrightarrow & G \otimes_{\Lambda} P & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 C'' & 0 \longrightarrow & G'' \otimes_{\Lambda} R & \longrightarrow & G'' \otimes_{\Lambda} P & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 
 \end{array}$$

che è una successione esatta esatta di complessi. Questa fornisce una successione esatta lunga in omologia:

$$0 \longrightarrow H_1(C') \longrightarrow H_1(C) \longrightarrow H_1(C'') \longrightarrow H_0(C') \longrightarrow H_0(C) \longrightarrow H_0(C'') \longrightarrow 0$$

e adesso basta osservare che  $H_1(C') = \text{Tor}_{\Lambda}(A, G')$ ,  $H_1(C) = \text{Tor}_{\Lambda}(A, G)$ ,  $H_1(C'') = \text{Tor}_{\Lambda}(A, G'')$ ,  $H_0(C') = G' \otimes_{\Lambda} A$ ,  $H_0(C) = G \otimes_{\Lambda} A$  e  $H_0(C'') = G'' \otimes_{\Lambda} A$ .  $\square$

*Esercizio 13.* Sia  $\Lambda$  dominio ad ideali principali, allora  $\text{Tor}(A, B) = \text{Tor}(T(A), T(B))$ .

*Dimostrazione.* Applichiamo la successione precedente alla successione esatta

$$0 \longrightarrow T(A) \longrightarrow A \longrightarrow A/T(A) \longrightarrow 0$$

ma  $A/T(A)$  è libero da torsione e quindi ( $\Lambda$  è PID) è piatto. Perciò otteniamo

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_{\Lambda}(T(A), B) \longrightarrow \text{Tor}_{\Lambda}(A, B) \longrightarrow \text{Tor}_{\Lambda}(A/T(A), B) = 0$$

e  $\text{Tor}_{\Lambda}(A, B) \cong \text{Tor}_{\Lambda}(T(A), B)$  ed analogamente abbiamo  $\text{Tor}_{\Lambda}(T(A), B) \cong \text{Tor}_{\Lambda}(T(A), T(B))$ .  $\square$

## 4.2 Omotopia

07/04/08

Siano  $C$  e  $D$  due complessi di catene e  $\varphi, \psi : C \rightarrow D$  morfismi di complessi. Vogliamo trovare delle condizioni sufficienti affinché sia  $\varphi_* = \psi_* : H(C) \rightarrow H(D)$ .

**Definizione 39.** Siano  $C$  e  $D$  due complessi di catene e  $\varphi, \psi : C \rightarrow D$  morfismi di complessi. Un'omotopia tra  $\varphi$  e  $\psi$  è un morfismo di  $\Lambda$ -moduli graduati  $\Sigma : C \rightarrow D$  di grado 1 tale che

$$\psi - \varphi = \partial \circ \Sigma + \Sigma \circ \partial.$$

Cioè per ogni  $n \in \mathbb{Z}$   $\psi_n - \varphi_n = \partial_{n+1} \circ \Sigma_n + \Sigma_{n-1} \circ \partial_n$ .

Un possibile modo di presentare l'omotopia è il seguente; consideriamo lo  $\mathbb{Z}$ -modulo graduato  $\{\text{Hom}(C, D)_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  dove  $\text{Hom}(C, D)_n$  è il gruppo dei morfismi di  $\Lambda$ -moduli graduati di grado  $n$ ; vogliamo definire un operatore di bordo. Sia  $f_\nu : C_n \rightarrow D_{n+\nu}$  un morfismo di grado  $\nu$ . Definiamo  $\partial f_\nu = \partial \circ f_\nu + (-1)^{n+1} f_\nu \circ \partial$  (il  $(-1)^{n+1}$  serve per garantire che  $\partial \circ \partial = 0$ ). Vediamo cos'è  $Z_0(\text{Hom}(C, D), \partial)$  (cioè chi sono i cicli in  $\text{Hom}(C, D)_0$ ). Sia  $f_0 \in \text{Hom}(C, D)_0$  allora  $\partial f_0 = \partial f_0 - f_0 \partial$  perciò i cicli sono i morfismi di grado 0 che commutano con l'operatore di bordo, cioè i morfismi di complessi  $C \rightarrow D$ . Ora ci chiediamo quand'è che due morfismi di complessi  $\varphi$  e  $\psi$  coincidono in  $H_0(\text{Hom}(C, D))$ ?  $[\varphi] = [\psi] \Leftrightarrow \exists s : C \rightarrow D$  morfismo di grado 1 con  $\varphi - \psi = \partial s = \partial \circ s + (-1)^2 s \circ \partial = \partial \circ s + s \circ \partial \Leftrightarrow \varphi \cong \psi$  (cioè  $\varphi$  e  $\psi$  sono omotopi).

**Proposizione 55.** Se  $\varphi$  e  $\psi$  sono omotope allora  $H(\varphi) = H(\psi) : H(C) \rightarrow H(D)$ .

*Dimostrazione.*  $[z] \in H_n(C) \Rightarrow z \in \text{Ker } \partial_n$ ;  $\varphi_n - \psi_n = \Sigma \circ \partial(z) + \partial \circ \Sigma(z) = \partial \circ \Sigma(z) \in B_n(C)$ .  $\square$

In topologia algebrica spesso per dimostrare che un certo complesso ha omologia nulla si dimostra che l'identità è omotopa all'omomorfismo nullo. L'essere omotopi è una relazione d'equivalenza.

*Osservazione 24.* Sia  $F : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'}$  un funtore additivo,  $C, D \in \text{Comp}_\Lambda$  e  $\varphi \cong \psi : C \rightarrow D$ . Allora  $F(\varphi), F(\psi) : F(C) \rightarrow F(D)$  sono omotope e se  $\Sigma$  è omotopia tra  $\varphi$  e  $\psi$   $F(\Sigma)$  è omotopia tra  $F(\varphi)$  e  $F(\psi)$ .

*Dimostrazione.*  $\varphi - \psi = \partial \circ \Sigma + \Sigma \circ \partial \Rightarrow F(\varphi) - F(\psi) = F(\partial) \circ F(\Sigma) + F(\Sigma) \circ F(\partial)$ . In particolare vale  $H(F(\varphi)) = H(F(\psi))$ .  $\square$

**Definizione 40.** Due complessi  $C, D$  hanno lo stesso tipo di omotopia se esistono due morfismi di complessi  $\varphi : C \rightarrow D$  e  $\vartheta : D \rightarrow C$  tali che  $\vartheta \circ \varphi \cong id_C$  e  $\varphi \circ \vartheta \cong id_D$ .

In tal caso  $H(C) \cong H(D)$  e  $H(\varphi)$  e  $H(\vartheta)$  sono isomorfismi.

*Esempio 18.* Esibiamo due morfismi di complessi che inducono la stessa mappa in omologia ma che non sono omotopi. Consideriamo i complessi

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & C_1 & & C_0 & & \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot p} & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \\
 & & & & \varphi \downarrow \psi & & \varphi \downarrow \psi \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \\
 & & D_1 & & D_0 & & 
 \end{array}$$

Dove  $\varphi_1 = id$  e  $\psi_1 = 0$ .  $\varphi$  e  $\psi$  inducono la stessa mappa in omologia. Appliciamo il funtore additivo  $\cdot \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ , se  $\varphi$  e  $\psi$  fossero omotopi lo sarebbero anche  $\cdot \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(\varphi)$  e  $\cdot \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(\psi)$  ma

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \xrightarrow{0} & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \\
 & & & & \cdot \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(\varphi) \downarrow 0 & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

e le due mappe non possono essere omotopi perché i complessi ottenuti applicando  $\cdot \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(\cdot)$  non hanno omologia nulla.

### 4.3 Funtori derivati

Sia  $T : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$  un funtore additivo. Vogliamo costruire una famiglia di funtori  $L_n T$ .

**Definizione 41.** Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo; una *risoluzione proiettiva* di  $A$  è un complesso

$$P = \dots \longrightarrow P_n \longrightarrow \dots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \xrightarrow{\vartheta} P_0 \longrightarrow 0$$

tale che

*Funtori derivati*

- (1) I  $P_j$  sono proiettivi.
- (2)  $\text{coKer } \vartheta = H_0(P) \cong A$ .
- (3) Per ogni  $n \geq 1$  la successione è esatta in  $P_n$ .

Si dice che  $P$  è un *complesso aciclico*. Se applichiamo  $T$  alla risoluzione proiettiva otteniamo il complesso

$$TP = \dots \longrightarrow TP_n \longrightarrow \dots \quad TP_2 \longrightarrow TP_1 \xrightarrow{\vartheta} TP_0 \longrightarrow 0$$

che non è più aciclico e possiamo considerarne l'omologia. Definiamo  $L_n T(A) = H_n(TP)$ .  $L_n T$  sarà un funtore e si chiamerà  $n$ -esimo funtore derivato sinistro di  $T$ . Analogamente si definiscono i funtori derivati destri (dove  $T$  è controvariante e invece dell'omologia si prende la coomologia, oppure  $T$  è covariante ma invece delle risoluzioni proiettive si usano le risoluzioni iniettive).

*Esempio 19.* Sia  $\Lambda$  un PID ed  $A$  un  $\Lambda$ -modulo. Allora se

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

è una presentazione proiettiva di  $A$

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow 0$$

è una risoluzione proiettiva di  $A$  a cui possiamo applicare il funtore additivo (controvariante)  $T = \text{Hom}(\cdot, B)$  ottenendo il complesso

$$D = 0 \longrightarrow \text{Hom}(P_0, B) \longrightarrow \text{Hom}(P_1, B) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

e considerare il funtore derivato destro  $R^n T(A) = H^n(D)$ . Abbiamo quindi che  $\text{Ext}(A, B) = R^1 T(A)$  e in generale  $\text{Ext}(\cdot, B) = R^1 T$ .

### 4.3.1 Risoluzioni

**Definizione 42.** Un complesso  $C = \{C_n\}$  si dice *complesso positivo* se  $C_n = 0$  per ogni  $n < 0$ ; si dice *complesso aciclico* se  $H_n(A) = 0$  per ogni  $n \geq 1$  e si dice *complesso proiettivo* se tutti i  $C_n$  sono proiettivi.

Quindi una risoluzione proiettiva di un  $\Lambda$ -modulo  $A$  è un complesso  $P$  positivo aciclico e proiettivo con  $H_0(P) \cong A$ .

**Teorema 56.** Sia  $C$  un complesso positivo, aciclico e proiettivo e  $D$  un complesso positivo e aciclico. Allora per ogni  $\varphi : H_0(C) \rightarrow H_0(D)$  esiste una mappa di complessi  $\bar{\varphi} : C \rightarrow D$  che solleva  $\varphi$ . Inoltre due tali mappe sono omotope.

*Dimostrazione.* Mostriamo la tesi per induzione su  $n$ ;  $\varphi$  si solleva a  $\varphi_0 : C_0 \rightarrow D_0$  perché  $C_0$  è proiettivo. Supponiamo di avere  $\varphi_0, \dots, \varphi_{n-1}$  dove  $\varphi_k$  solleva  $\varphi_{k-1}$ .

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & C_{n-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & C_0 & \xrightarrow{\pi} & H_0(C) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \varphi_n & & \downarrow \varphi_{n-1} & & & & \downarrow \varphi_1 & & \downarrow \varphi_0 & & \downarrow \varphi & & \\ \cdots & \longrightarrow & D_n & \longrightarrow & D_{n-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & D_1 & \longrightarrow & D_0 & \xrightarrow{\tilde{\pi}} & H_0(D) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Ora  $\tilde{\partial}_{n-1} \circ \varphi_{n-1} \circ \partial_n = \varphi_{n-2} \circ \partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$  e quindi  $\text{Im } \varphi_{n-1} \circ \partial_n \subseteq \text{Ker } \tilde{\partial}_{n-1} = \text{Im } \tilde{\partial}_n$  (dove l'ultima uguaglianza viene dal fatto che il complesso è aciclico). Perciò possiamo costruire il seguente diagramma

$$\begin{array}{ccc} & C_n & \\ \swarrow \varphi_n & \downarrow \varphi_{n-1} \circ \partial_n & \\ D_n & \xrightarrow{\tilde{\partial}_n} & \text{Im } \tilde{\partial}_n \longrightarrow 0 \end{array}$$

e sollevare a  $\varphi_n$  per proiettività.

Siano  $\psi, \xi : C \rightarrow D$  che sollevano  $\varphi$ ; mostriamo, sempre per induzione, che esiste un'omotopia  $\Sigma : C \rightarrow D$  tale che  $\tilde{\partial}_{n+1} \circ \Sigma_n + \Sigma_{n-1} \circ \partial_n = \psi_n - \xi_n$ . Definiamo  $\Sigma_{-1} = 0$ , sappiamo che  $\tilde{\pi} \circ (\psi_0 - \xi_0) = (\varphi - \varphi) \circ \pi = 0$  e quindi  $\text{Im } \psi_0 - \xi_0 \subseteq \text{Ker } \tilde{\pi} = \text{Im } \tilde{\partial}_1$  e possiamo considerare il diagramma

$$\begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\partial_1} & C_0 \\ \psi_1 - \xi_1 \downarrow & \swarrow \Sigma_0 & \downarrow \psi_0 - \xi_0 \\ D_1 & \xrightarrow{\tilde{\partial}_1} & \text{Im } \tilde{\partial}_1 \longrightarrow 0 \end{array}$$

dove  $\psi_0 - \xi_0$  si solleva a  $\Sigma_0$  per proiettività di  $C_0$ . Quindi  $\tilde{\partial}_1 \circ \Sigma_0 = \psi_0 - \xi_0$ .

Vediamo il passo induttivo;

$$\begin{array}{ccccccc} \Sigma_n \swarrow & C_n & \xrightarrow{\partial_n} & C_{n-1} & \longrightarrow & \cdots & \\ & \downarrow \psi_n - \xi_n & \swarrow \Sigma_{n-1} & \downarrow \psi_{n-1} - \xi_{n-1} & & & \\ D_{n+1} & \xrightarrow{\tilde{\partial}_{n+1}} & D_n & \xrightarrow{\tilde{\partial}_n} & D_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Ora  $\tilde{\partial}_n \circ ((\psi_n - \xi_n) - \Sigma_{n-1} \circ \partial_n) = \tilde{\partial}_n \circ (\psi_n - \xi_n) - (\tilde{\partial}_n \circ \Sigma_{n-1}) \circ \partial_n = (\psi_{n-1} - \xi_{n-1}) \circ \partial_n - (\psi_{n-1} - \xi_{n-1} - \Sigma_{n-2} \circ \partial_{n-1}) \circ \partial_n = 0$ . Perciò, detto  $\eta = (\psi_n - \xi_n) - \Sigma_{n-1} \circ \partial_n$   $\text{Im } \eta \subseteq \text{Ker } \tilde{\partial}_n = \text{Im } \tilde{\partial}_{n+1}$  e per proiettività si solleva a  $\Sigma_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$ .  $\square$

08/04/08

L'esistenza delle risoluzioni proiettive è equivalente all'esistenza delle presentazioni proiettive (questo è vero in generale per ogni categoria abeliana).

Infatti consideriamo le presentazioni proiettive

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & R_2 & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & R_1 \longrightarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & R_3 & \longrightarrow & P_2 & \longrightarrow & R_2 \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \vdots \end{array}$$

Possiamo costruire una risoluzione proiettiva nel seguente modo:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \dashrightarrow & P_2 & \xrightarrow{\partial_2} & P_1 & \xrightarrow{\partial_1} & P \longrightarrow A \longrightarrow 0 \\ & & \searrow & & \searrow & & \nearrow \\ & & & R_2 & & & R_1 \\ & & \nearrow & & \nearrow & & \searrow \\ 0 & & & & 0 & & 0 \end{array}$$

Se invece abbiamo una risoluzione proiettiva basta considerare

$$0 \longrightarrow \text{Im } \partial_1 \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

che è una presentazione proiettiva. Un discorso completamente analogo vale per le presentazioni e le risoluzioni iniettive.

**Proposizione 57.** Due risoluzioni proiettive di  $A$  hanno lo stesso tipo di omotopia.

*Dimostrazione.* Siano  $P$  e  $Q$  due risoluzioni proiettive di  $A$ ; allora per il teorema 56  $id : A \rightarrow A$  si solleva a  $\varphi : P \rightarrow Q$  ed a  $\psi : Q \rightarrow P$  e, sempre per lo stesso teorema,  $\psi \circ \varphi \sim id_P$  e  $\varphi \circ \psi \sim id_Q$ .  $\square$

**Definizione 43.** Sia  $A$  un  $\Lambda$ -modulo, una *risoluzione iniettiva* di  $A$  è un complesso di cocatene

$$0 \longrightarrow C_0 \longrightarrow C_1 \longrightarrow \cdots$$

aciclico, iniettivo tale che  $H^0(C) \cong A$ .

In modo del tutto analogo al teorema 56 si dimostra il seguente:

**Teorema 58.** Siano  $C$  e  $D$  complessi di cocatene positivi e aciclici e  $D$  iniettivo; allora per ogni morfismo  $\varphi : H^0(C) \rightarrow H^0(D)$  esiste un sollevamento  $\psi : C \rightarrow D$  unico a meno di omotopia.

Siano  $T : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$  funtore covariante additivo e

$$\cdots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

una risoluzione proiettiva di  $A$ ; allora possiamo costruire il complesso

$$\cdots \longrightarrow TP_2 \longrightarrow TP_1 \longrightarrow TP_0 \longrightarrow TA \longrightarrow 0$$

e definire  $L_n T(A) = H_n(TP)$ . Vogliamo mostrare che  $L_n T$  è un funtore  $\mathfrak{M}_\Lambda^l \rightarrow \mathfrak{Ab}$  e che la definizione data non dipende dalla risoluzione proiettiva scelta. Sia  $\alpha : A \rightarrow A'$  morfismo in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ , consideriamo due risoluzioni proiettive (di  $A$  ed  $A'$ ).

$$\begin{array}{ccccccccccc} P = & & \cdots & \longrightarrow & P_2 & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & P_0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\ P' = & & \cdots & \longrightarrow & P'_2 & \longrightarrow & P'_1 & \longrightarrow & P'_0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

per il teorema 56  $\alpha$  si solleva ad un morfismo di complessi  $\tilde{\alpha} : P \rightarrow P'$ . Ora  $T$  è un funtore additivo e quindi induce un funtore  $T : \text{Comp}_\Lambda \rightarrow \text{Comp}_\mathbb{Z}$  e possiamo considerare il morfismo  $T\tilde{\alpha} : TP \rightarrow TP'$ .  $L_n T \cdot$  associa ad  $\alpha$  il morfismo  $(T\tilde{\alpha}_n)_* : H_n(TP) \rightarrow H_n(TP')$ . Osserviamo che questo morfismo non dipende dal sollevamento  $\tilde{\alpha}$  scelto, infatti sappiamo che due tali sollevamenti sono omotopi e  $T$  preserva le relazioni di omotopia (per addittività). Quindi due sollevamenti di  $\alpha$  inducono lo stesso morfismo in omologia.

Se  $\alpha : A \rightarrow A'$  chiamiamo  $\alpha(P, P') : H(TP) \rightarrow H(TP')$  il morfismo associato e si verifica facilmente che, dato  $\alpha' : A' \rightarrow A''$   $(\alpha' \circ \alpha)(P, P'') = \alpha'(P', P'') \circ \alpha(P, P')$  e  $1_A(P, P) = 1_{L_n T(A)}$ .

**Proposizione 59.** Siano  $P$  e  $Q$  risoluzioni proiettive di  $A$ , allora c'è un isomorfismo  $\eta_{PQ} : L_n^P T(A) \rightarrow L_n^Q T(A)$  e l'isomorfismo è canonico.

*Dimostrazione.* Siano  $\eta : P \rightarrow Q$  e  $\xi : Q \rightarrow P$  che sollevano  $id : A \rightarrow A$ ;  $\eta$  è un'equivalenza omotopica tra i complessi  $P$  e  $Q$ , perciò  $T\eta$  è equivalenza omotopica tra  $TP$  e  $TQ$  (perché  $T$  è additivo).

Inoltre, se  $\Gamma$  è un'altra risoluzione proiettiva,  $\eta_{Q\Gamma} \circ \eta_{PQ} \sim \eta_{P\Gamma}$  ed  $\eta_{PP} \sim id$  (perciò diciamo che l'isomorfismo è canonico).  $\square$

Per quanto abbiamo visto possiamo dire che associando ad un morfismo  $\alpha : A \rightarrow A'$  il morfismo  $\alpha(P, P') : L_n T(A) \rightarrow L_n T(A')$  otteniamo un funtore  $L_n T : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$ .

### 4.3.2 Prima successione esatta lunga per i funtori derivati

**Lemma 60.** Siano

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

successione esatta corta,  $\varepsilon' : P' \rightarrow A' \rightarrow 0$  ed  $\varepsilon'' : P'' \rightarrow A'' \rightarrow 0$  con  $P'$  e  $P''$  proiettivi; allora detto  $P = P' \oplus P''$  esiste  $\varepsilon : P \rightarrow A$  tale che il seguente diagramma sia commutativo ed esatto:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & P' & \xrightarrow{i} & P & \xrightarrow{\pi} & P'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \varepsilon' & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow \varepsilon'' & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{\varphi} & A & \xrightarrow{\psi} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

*Dimostrazione.* Per proiettività esiste  $\gamma : P'' \rightarrow A$  tale che  $\psi \circ \gamma = \varepsilon''$ . Definiamo  $\varepsilon(a, b) = \varphi \circ \varepsilon'(a) + \gamma(b)$ ; ora il diagramma commuta ed  $\varepsilon$  è surgettiva per il teorema 1 (non è nell'enunciato ma si deduce dalla dimostrazione).  $\square$

**Lemma 61** (del serpente). Consideriamo il diagramma esatto e commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} & & A & \xrightarrow{\xi} & B & \xrightarrow{\eta} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{\varphi} & B' & \xrightarrow{\psi} & C' \end{array}$$

Allora esiste un morfismo  $\text{Ker } \gamma \rightarrow \text{coKer } \alpha$  tale che la successione

$$\text{Ker } \alpha \xrightarrow{\xi} \text{Ker } \beta \xrightarrow{\eta} \text{Ker } \gamma \xrightarrow{\omega} \text{coKer } \alpha \xrightarrow{\varphi} \text{coKer } \beta \xrightarrow{\psi} \text{coKer } \gamma$$

sia esatta.

*Dimostrazione.* Osserviamo che  $\beta \circ \xi = \varphi \circ \alpha \Rightarrow \xi(\text{Ker } \alpha) \subseteq \text{Ker } \beta$  e allo stesso modo  $\gamma \circ \eta = \psi \circ \beta \Rightarrow \eta(\text{Ker } \beta) \subseteq \text{Ker } \gamma$ .

Sia  $b \in \text{Ker } \eta|_{\text{Ker } \beta}$ ,  $b = \xi(a)$  e  $\varphi \circ \alpha(a) = \beta \circ \xi(a) = 0 \Rightarrow (\varphi$  iniettiva)  $a \in \text{Ker } \alpha$ ; e quindi la successione è esatta in  $\text{Ker } \beta$ .

Osserviamo che  $\varphi(\text{Im } \alpha) \subseteq \text{Im } \beta$  e  $\psi(\text{Im } \beta) \subseteq \text{Im } \gamma$  e quindi  $\varphi$  e  $\psi$  inducono i morfismi  $\varphi : \text{coKer } \alpha \rightarrow \text{coKer } \beta$  e  $\psi : \text{coKer } \beta \rightarrow \text{coKer } \gamma$ . Sia  $[b'] \in \text{Ker } \psi$ ,

allora  $\psi(b') = \gamma(c) = (\eta \text{ surgettiva}) \gamma \circ \eta(b) = \psi \circ \beta(b) \Rightarrow b' = \beta(b) + \varphi(a')$  e  $[b'] = [\varphi(a')] = \varphi([a'])$ ; cioè la successione è esatta in  $\text{coKer } \beta$ .

Vediamo come costruire  $\omega$ . Sia  $c \in \text{Ker } \gamma$ ,  $c = \eta(b) \Rightarrow \psi \circ \beta(b) = \gamma \circ \eta(b) = 0 \Rightarrow \beta(b) = \varphi(a')$  e definiamo  $\omega(c) = [a']$ . Osserviamo che  $\omega(c)$  non dipende da  $b$ , infatti se  $\eta(b_1) = \eta(b)$  allora  $b_1 - b \in \text{Ker } \eta \Rightarrow b_1 = b + \xi(a)$  e  $\beta(b_1) = \beta(b) + \beta \circ \xi(a) = \varphi(a') + \varphi \circ \alpha(a) = \varphi(a' + \alpha(a))$  e  $[a' + \alpha(a)] = [a']$ . Inoltre si vede facilmente che  $\omega$  è omomorfismo.

Sia  $c \in \text{Ker } \omega$ , allora  $a' = \alpha(a)$  e  $\beta \circ \xi(a) = \varphi \circ \alpha(a) = \varphi(a') = \beta(b) \Rightarrow b_1 = b - \xi(a) \in \text{Ker } \beta$  e  $\eta(b_1) = \eta(b) = c$ . Inoltre se  $c = \eta(b)$  con  $b \in \text{Ker } \beta$ , allora  $\beta(b) = 0 = \varphi(0) \Rightarrow \omega(c) = 0$  e la successione è esatta in  $\text{Ker } \gamma$ .

Sia  $[a] \in \text{coKer } \alpha$  con  $\varphi([a]) = 0$ , allora  $\varphi(a) = \beta(b)$  e  $[a] = \omega([\eta(b)])$ ; se invece  $[a] = \omega(c)$  allora  $\varphi([a]) = [\beta(b)] = 0$  e la successione è esatta in  $\text{coKer } \alpha$ .  $\square$

**Teorema 62.** Siano  $T : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$  funtore additivo e

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

successione esatta corta; allora esiste un omomorfismo di connessione  $\omega_n : L_n T A'' \rightarrow L_{n-1} T A'$  tale che la seguente successione sia esatta.

$$L_n T A' \longrightarrow L_n T A \longrightarrow L_n T A'' \xrightarrow{\omega_n} L_{n-1} T A' \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 T A'' \longrightarrow 0$$

*Dimostrazione.* Fissiamo  $P'$  e  $P''$  risoluzioni proiettive di  $A'$  ed  $A''$ , per il lemma 60 possiamo costruire il diagramma commutativo ed esatto

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & P'_1 & \longrightarrow & P'_1 \oplus P''_1 & \longrightarrow & P''_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & P'_0 & \longrightarrow & P'_0 \oplus P''_0 & \longrightarrow & P''_0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varepsilon' & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow \varepsilon'' \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

Per il lemma del serpente (osservando che le mappe sono surgettive e quindi i conuclei sono nulli) si ha la successione esatta

$$0 \longrightarrow \text{Ker } \varepsilon' \longrightarrow \text{Ker } \varepsilon \longrightarrow \text{Ker } \varepsilon'' \longrightarrow 0$$

*Funtori derivati*

e possiamo ripetere la costruzione ottenendo

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & P'_1 & \longrightarrow & P'_1 \oplus P''_1 & \longrightarrow & P''_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \text{Ker } \varepsilon' & \longrightarrow & \text{Ker } \varepsilon & \longrightarrow & \text{Ker } \varepsilon'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

e con un ragionamento induttivo si costruisce una risoluzione proiettiva di  $A$  e, più importante, una successione esatta corta di risoluzioni

$$0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0$$

Ora applicando  $T$  la successione rimane esatta perché  $P = P' \oplus P''$  (cioè la successione spezza) e  $T$  è funtore additivo e quindi preserva le somme dirette di due oggetti. Perciò non resta che estrarre una successione esatta lunga in omologia per ottenere la tesi.  $\square$

*Esempio 20.* Sia  $T = \text{Hom}(\cdot, B)$ ,  $P$  risoluzione proiettiva di  $A$ . Applicando  $T$  otteniamo il complesso

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(P_0, B) \longrightarrow \text{Hom}(P_1, B) \longrightarrow \text{Hom}(P_2, B) \longrightarrow \dots$$

ed in questo caso definiamo  $\text{Ext}_\Lambda^n(A, B) = R^n T(A) = R^n \text{Hom}(\cdot, B)(A)$ .

Se abbiamo una successione esatta corta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

dal teorema precedente ricaviamo una successione esatta lunga

$$\begin{array}{ccccccc}
 \dots & \xrightarrow{\omega_{n-1}} & \text{Ext}_\Lambda^n(A'', B) & \longrightarrow & \text{Ext}_\Lambda^n(A, B) & \longrightarrow & \text{Ext}_\Lambda^n(A', B) \\
 & & \xrightarrow{\omega_n} & & \text{Ext}_\Lambda^{n+1}(A'', B) & \longrightarrow & \dots
 \end{array}$$

Ma siccome il funtore  $\text{Hom}(\cdot, B)$  è esatto a sinistra  $\text{Ext}_\Lambda^0(A, B) = \text{Hom}_\Lambda(A, B)$  mentre  $\text{Ext}_\Lambda^1(A, B) = \text{Ext}_\Lambda(A, B)$  e da queste osservazioni si ricava la successione Hom-Ext per il caso in cui  $\Lambda$  non sia un dominio ad ideali principali.

**Proposizione 63.** Sia

$$0 \longrightarrow K_q \xrightarrow{\mu} P_{q-1} \longrightarrow P_{q-2} \longrightarrow \dots \longrightarrow P_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

successione esatta con i  $P_j$  proiettivi; sia  $T$  un funtore additivo covariante esatto a destra (ad esempio  $\cdot \otimes B$ ). Se  $q \geq 1$  la successione

$$0 \longrightarrow L_q T(A) \longrightarrow TK_q \xrightarrow{T\mu} TP_{q-1}$$

è esatta e in particolare  $L_q T(A) \cong \text{Ker } T\mu$ .

*Dimostrazione.* Possiamo costruire una risoluzione proiettiva in modo da avere il seguente diagramma esatto

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P_q & \xrightarrow{\partial_q} & P_{q-1} & \longrightarrow & P_{q-2} \longrightarrow \cdots \\ & & \searrow & & \nearrow & & \\ & & & & K_q & & \\ & & \nearrow & & \searrow & & \\ 0 & & & & & & 0 \end{array}$$

Poiché il funtore è esatto a destra possiamo costruire il seguente diagramma commutativo ed esatto

$$\begin{array}{ccccccc} TP_{q+1} & \xrightarrow{T\partial_{q+1}} & TP_q & \longrightarrow & TK_q & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow T\partial_q & & \downarrow T\mu & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & TP_{q-1} & \xlongequal{\quad} & TP_{q-1} \end{array}$$

Applicando il lemma del serpente otteniamo una successione esatta

$$TP_{q+1} \xrightarrow{T\partial_{q+1}} \text{Ker } T\partial_q \longrightarrow \text{Ker } T\mu \longrightarrow 0$$

E quindi  $\text{Ker } T\mu \cong H_q(T(A)) = L_q T(A)$ . □

*Osservazione 25.* Vale anche la proposizione duale. Cioè se  $T$  è un funtore additivo controvariante esatto a sinistra (come  $\text{Hom}_\Lambda(\cdot, B)$ ) e

$$0 \longrightarrow K_q \xrightarrow{\mu} P_{q-1} \longrightarrow P_{q-2} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

è esatta con i  $P_j$  proiettivi, allora

$$TP_{q-1} \xrightarrow{T\mu} TK_q \longrightarrow R^q TA \longrightarrow 0$$

è esatta e in particolare  $R^q TA \cong \text{coKer } T\mu$ .

*Funtori derivati*

*Esercizio 14.* Dimostrare che  $\text{Ext}_\Lambda^1(A, B) \cong \text{Ext}_\Lambda(A, B)$

*Dimostrazione.* Si considera una presentazione proiettiva

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\mu} P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

e utilizzando la duale della proposizione precedente (con  $T = \text{Hom}(\cdot, B)$ ) si ha che  $\text{Ext}_\Lambda^1(A, B) \cong \text{coKer } \mu^* = \text{Ext}_\Lambda(A, B)$ .  $\square$

### 4.3.3 Seconda successione esatta lunga per i funtori derivati

21/04/08

**Definizione 44.** Una successione  $T' \xrightarrow{\tau'} T \xrightarrow{\tau''} T''$  di funtori additivi  $T, T', T'' : \mathfrak{M}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{Ab}$  e trasformazioni naturali  $\tau', \tau''$  si dice *esatta sui proiettivi* se  $\forall P \in \mathfrak{M}_\Lambda$  proiettivo la successione

$$0 \longrightarrow T'P \xrightarrow{\tau'_P} TP \xrightarrow{\tau''_P} T''P \longrightarrow 0$$

è esatta.

**Teorema 64** (Seconda successione esatta lunga). Sia  $T' \xrightarrow{\tau'} T \xrightarrow{\tau''} T''$  successione esatta sui proiettivi. Allora per ogni  $A \in \mathfrak{M}_\Lambda$  esistono gli omomorfismi di connessione  $\omega_n : L_n T'' A \rightarrow L_{n-1} T' A$  tali che la successione

$$\begin{aligned} L_n T' A \longrightarrow L_n T A \longrightarrow L_n T'' A \xrightarrow{\omega_n} L_{n-1} T' A \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_1 T'' A \xrightarrow{\omega_1} L_0 T' A \\ \longrightarrow L_0 T A \longrightarrow L_0 T'' A \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

sia esatta.

*Dimostrazione.* Sia

$$\cdots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

una risoluzione proiettiva di  $A$ ; allora possiamo costruire il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & T'P_1 & \longrightarrow & T'P_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \tau'_{P_1} \downarrow & & \downarrow \tau'_{P_0} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & TP_1 & \longrightarrow & TP_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \tau''_{P_1} \downarrow & & \downarrow \tau''_{P_0} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & T''P_1 & \longrightarrow & T''P_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 
 \end{array}$$

che è una successione esatta di complessi e quindi basta prendere la successione esatta lunga in omologia.  $\square$

*Esercizio 15.* Ricavare, usando la seconda successione esatta lunga e data la successione esatta corta

$$0 \longrightarrow B' \xrightarrow{\nu} B \xrightarrow{\varepsilon} B'' \longrightarrow 0$$

la successione esatta

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \text{Ext}_{\Lambda}^n(A, B') & \longrightarrow & \text{Ext}_{\Lambda}^n(A, B) \longrightarrow \text{Ext}_{\Lambda}^n(A, B'') \longrightarrow \\
 & & & & \text{Ext}_{\Lambda}^{n+1}(A, B') & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

*Dimostrazione.* Le mappe  $\nu$  ed  $\varepsilon$  inducono delle trasformazioni naturali  $\nu_* : \text{Hom}(\cdot, B') \rightarrow \text{Hom}(\cdot, B)$ ,  $\varepsilon_* : \text{Hom}(\cdot, B) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, B'')$ . Dove  $\nu_*^A(\varphi) = \nu \circ \varphi \in \text{Hom}(A, B)$  e  $\varepsilon_*^A(\psi) = \varepsilon \circ \psi \in \text{Hom}(A, B'')$ . Inoltre sappiamo già che la successione

$$\text{Hom}(\cdot, B) \xrightarrow{\nu_*} \text{Hom}(\cdot, B') \xrightarrow{\varepsilon_*} \text{Hom}(\cdot, B'')$$

è esatta sui proiettivi (teorema 11). Perciò basta considerare la seconda successione esatta lunga sulla successione appena descritta.  $\square$

**Ancora su  $\text{Ext}_{\Lambda}^n$**  Fino ad ora abbiamo costruito  $\text{Ext}_{\Lambda}^n(A, B)$  con una risoluzione proiettiva  $P$  di  $A$ , applicando il funtore additivo  $\text{Hom}(\cdot, B)$  e considerando la coomologia del complesso  $\text{Hom}(\cdot, B)(P)$ .

Ma possiamo calcolare  $\text{Ext}_{\Lambda}$  anche con una risoluzione iniettiva di  $B$ ; sia

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow \cdots$$

*Funtori derivati*

risoluzione iniettiva, applicando  $\text{Hom}(A, \cdot)$  otteniamo il complesso  $\text{Hom}(A, \cdot)(I)$

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, I_0) \longrightarrow \text{Hom}(A, I_1) \longrightarrow \dots$$

e definiamo  $\overline{\text{Ext}}_{\Lambda}^n(A, B) = H^n(\text{Hom}(A, \cdot)(I))$ . I funtori  $\text{Ext}_{\Lambda}^n$  e  $\overline{\text{Ext}}_{\Lambda}^n$  risultano naturalmente equivalenti.

Si dice che il bifuntore  $\text{Ext}_{\Lambda}(\cdot, \cdot)$  è *bilanciato*, cioè

$$R^n(\text{Hom}(A, \cdot))(B) = R^n(\text{Hom}(\cdot, B))(A).$$

**Il funtore  $\text{Tor}_n^{\Lambda}$**  Siano  $A \in \mathfrak{M}_{\Lambda}^r, B \in \mathfrak{M}_{\Lambda}^l$ , definiamo  $\text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B) = L_n(A \otimes_{\Lambda} \cdot)(B)$ . Consideriamo una risoluzione proiettiva di  $B$

$$\dots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

e consideriamo il complesso ottenuto applicando  $A \otimes_{\Lambda} \cdot$ :

$$\dots \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} P_2 \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} P_1 \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} P_0 \longrightarrow 0$$

allora  $\text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B) = H_n((A \otimes_{\Lambda} \cdot)(P))$ . Se  $P$  è proiettivo una risoluzione proiettiva di  $P$  è il complesso  $0 \longrightarrow P \longrightarrow 0$  dove  $P$  è il modulo di grado 0. Quindi se  $n \geq 1$   $\text{Tor}_n^{\Lambda}(P, B) = 0$ .

Calcoliamo  $\text{Tor}_0^{\Lambda}(A, B)$ ;  $A \otimes_{\Lambda} \cdot$  è esatto a destra e quindi la successione

$$A \otimes_{\Lambda} P_1 \xrightarrow{\varepsilon} A \otimes_{\Lambda} P_0 \longrightarrow A \otimes_{\Lambda} B \longrightarrow 0$$

è esatta e  $\text{Tor}_0^{\Lambda} = H_0((A \otimes_{\Lambda} \cdot)(P)) = \text{coKer } \varepsilon = A \otimes_{\Lambda} B$ .

Il funtore  $\cdot \otimes_{\Lambda} B$  è esatto a destra, perciò usando la proposizione 63 si ha subito che  $\text{Tor}_1^{\Lambda}(A, B) \cong \text{Tor}_{\Lambda}(A, B)$ .

*Esercizio 16.* Scrivere le due successioni esatte lunghe per  $\text{Tor}_n^{\Lambda}$ .

*Dimostrazione.* Se  $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$  è esatta, la prima successione esatta lunga per i funtori derivati fornisce:

$$\begin{aligned} \dots \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}^{\Lambda}(A'', B) \longrightarrow \text{Tor}_n^{\Lambda}(A', B) \longrightarrow \text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B) \longrightarrow \\ \text{Tor}_n^{\Lambda}(A'', B) \longrightarrow \text{Tor}_{n-1}^{\Lambda}(A', B) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Mentre se  $0 \longrightarrow B' \xrightarrow{\nu} B \xrightarrow{\varepsilon} B'' \longrightarrow 0$  è esatta allora la successione

$$\cdot \otimes_{\Lambda} B' \xrightarrow{\nu_*} \cdot \otimes_{\Lambda} B \xrightarrow{\varepsilon_*} \cdot \otimes_{\Lambda} B''$$

è esatta sui proiettivi e la seconda successione esatta lunga per i funtori derivati fornisce

$$\begin{aligned} \dots \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}^{\Lambda}(A, B'') \longrightarrow \text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B') \longrightarrow \text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B) \longrightarrow \\ \text{Tor}_n^{\Lambda}(A, B'') \longrightarrow \text{Tor}_{n-1}^{\Lambda}(A, B') \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

□

## Capitolo 5

# Omologia e coomologia di gruppi

**Definizione 45.** Dato un gruppo  $G$  ed uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo  $A$ , definiamo la *coomologia di  $G$  a coefficienti in  $A$*  come

$$H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$$

dove  $\mathbb{Z}$  è lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale, cioè  $G$  agisce banalmente su  $\mathbb{Z}$ .

Osserviamo che un'azione  $G \rightarrow \text{Aut } A$  su di un gruppo abeliano  $A$  si estende in modo naturale ad un omomorfismo  $\mathbb{Z}[G] \rightarrow \text{End } A$  ed  $A$  ha una struttura di  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo; viceversa se  $A$  è uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo abbiamo un'azione  $G \rightarrow \text{Aut } A$ ; infatti sia per ogni  $g \in G$   $\varphi_g : a \mapsto ga$  allora  $\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g = \text{id}$  e quindi  $\varphi_g \in \text{Aut } A$ . Però anche se l'azione di  $G$  su  $A$  è banale non è detto che  $\mathbb{Z}[G]$  agisca su  $A$  come l'identità.

**Definizione 46.** Dato un gruppo  $G$  ed uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo destro  $B$ , definiamo l'*omologia di  $G$  a coefficienti in  $A$*  come

$$H_n(G, B) = \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z})$$

dove  $\mathbb{Z}$  è lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale.

Sia  $\sum_{g \in G} m_g g \in \mathbb{Z}[G]$  e sia  $\varepsilon : \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z}$  l'omomorfismo

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[G] &\rightarrow \text{End } \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \\ \sum_{g \in G} m_g g &\mapsto \left( n \mapsto \left( \sum_{g \in G} m_g g \right) n \right) \mapsto \sum_{g \in G} m_g \end{aligned}$$

Dove  $\left( \sum_{g \in G} m_g g \right) n = \left( \sum_{g \in G} m_g \right) n$  perché  $G$  agisce banalmente su  $\mathbb{Z}$ . La mappa  $\varepsilon$  si dice *augmentazione* e  $\text{Ker } \varepsilon = IG$  si chiama *ideale di augmentazione*. Osserviamo che per ogni  $g \in G$ ,  $g - e \in IG$ .

**Teorema 65.** (1)  $IG$  è il gruppo libero abeliano sull'insieme

$$W = \{g - 1 : g \in G, g \neq e\}.$$

(2)  $IG$  è generato, come  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo da

$$S = \{s - 1 : s \text{ è generatore di } G\}.$$

*Dimostrazione.* (1) È chiaro che  $\varepsilon\left(\sum_{g \in G} m_g(g - 1)\right) = 0$  e quindi  $\langle W \rangle \subseteq IG$ . Se  $\varepsilon\left(\sum_{g \in G} m_g g\right) = 0$  allora  $\sum_{g \in G} m_g = 0$ , perciò  $\sum_{g \in G} m_g g = \sum_{g \in G} m_g g - \sum_{g \in G} m_g 1 = \sum_{g \in G} m_g(g - 1)$  e quindi  $IG = \langle W \rangle$  e poi è chiaro che gli elementi di  $W$  sono indipendenti.

(2) Mostriamo che  $S$  genera gli elementi di  $W$  (come combinazioni di elementi di  $\mathbb{Z}[G]$ ). Se  $x, y \in G$ , allora  $xy - 1 = x(y - 1) + (x - 1) \in \langle x - 1, y - 1 \rangle_{\mathbb{Z}[G]}$  e  $x^{-1} - 1 = -x^{-1}(x - 1) \in \langle x - 1 \rangle_{\mathbb{Z}[G]}$ , da cui la tesi.  $\square$

*Osservazione 26.* Se  $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$  è una successione esatta corta di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli, applicando la seconda successione esatta lunga per i funtori derivati ricaviamo la successione

$$0 \longrightarrow H^0(G, A') \longrightarrow H^0(G, A) \longrightarrow H^0(G, A'') \longrightarrow H^1(G, A') \longrightarrow \dots$$

ed applicando la prima successione esatta lunga per i funtori derivati otteniamo

$$H_n(G, A') \longrightarrow H_n(G, A) \longrightarrow H_n(G, A'') \longrightarrow \dots \longrightarrow H_0(G, A'') \longrightarrow 0$$

*Osservazione 27.* Se  $A$  è iniettivo,  $H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$  e quindi per ogni  $n \geq 1$   $H^n(G, A) = (0)$ .

Analogamente se  $B$  è proiettivo (ma basta piatto perché sappiamo che  $\text{Tor}$  si può calcolare con le risoluzioni piatte)  $H_n(G; B) = \text{Tor}_{\mathbb{Z}[G]}^n(B, \mathbb{Z}) = (0)$  per ogni  $n \geq 1$ .

Calcoliamo  $H_0$  ed  $H^0$ . Sappiamo già che  $H^0(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^0(\mathbb{Z}, A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A)$ .

Sia  $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, A)$  (un omomorfismo di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli è comunque un omomorfismo di gruppi abeliani); deve valere  $\varphi(g) = \varphi(g \cdot 1) = g\varphi(1)$ . Ma  $\mathbb{Z}$  è lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale, perciò  $\varphi(1) = g\varphi(1) \forall g \in G$ ; da cui

$$H^0(G, A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) \cong A^G = \{x \in A : gx = x \forall g \in G\}.$$

Dove gli elementi di  $A^G$  sono detti *invarianti del modulo*.

$$H_0(G, B) = \text{Tor}_0^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z}) = B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z}$$

per definizione di tensore  $G$  deve agire a destra su  $B$  e a sinistra su  $\mathbb{Z}$  e deve valere

$$\forall b \in B, g \in G \quad bg \otimes_{\mathbb{Z}[G]} 1 = b \otimes_{\mathbb{Z}[G]} g \cdot 1 = b \otimes_{\mathbb{Z}[G]} 1.$$

e quindi

$$B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z} = B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} / \langle bg \otimes 1 - b \otimes 1 \rangle \cong B / \langle bg - b \rangle = B / \langle b(g-1) \rangle = B / (B \cdot IG).$$

Calcoliamo  $H_1(G, B)$  nel caso in cui  $G$  agisca banalmente su  $B$ .  $H_1(G, B) = \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z})$ , per calcolarlo ci basta una presentazione proiettiva di  $\mathbb{Z}$  come  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo (usando la proposizione 63).

$$0 \longrightarrow IG \xrightarrow{i} \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

è una presentazione proiettiva di  $\mathbb{Z}$  e per la proposizione 63  $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z}) = \text{Ker } 1 \otimes i : B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} IG \rightarrow B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z}[G]$ . Ora  $B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z}[G] \cong B$  e quindi

$$\begin{aligned} B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} IG &\xrightarrow{1 \otimes i} B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z}[G] \longrightarrow B \\ b \otimes (x-1) &\longmapsto b \otimes (x-1) \longmapsto bx - b \end{aligned}$$

ma  $G$  agisce banalmente su  $B$  e quindi  $bx - b = 0$  e  $1 \otimes i = 0$  e  $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z}) = B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} IG$ .

Ancora  $B \otimes_{\mathbb{Z}[G]} IG \cong B \otimes_{\mathbb{Z}} IG / \langle (b \otimes y(x-1)) - (by \otimes x-1) \rangle = B \otimes_{\mathbb{Z}} IG / \langle b \otimes (y-1)(x-1) \rangle = B \otimes_{\mathbb{Z}} (IG/IG^2)$ .

**Lemma 66.**  $IG/IG^2 \cong G_{Ab}$ .

*Dimostrazione.* Definiamo un omomorfismo di gruppi abeliani  $\psi : IG \rightarrow G_{Ab} = G/G'$ ,  $x-1 \mapsto xG'$ .  $IG^2 = \langle (x-1)(y-1) \rangle$ ; ora  $(x-1)(y-1) = (xy-1) - (x-1) - (y-1)$  e quindi  $\psi((x-1)(y-1)) = xyG'x^{-1}G'y^{-1}G' = [x, y]G' = G'$ . Perciò  $\psi$  passa al quoziente e definisce  $\tilde{\psi} : IG/IG^2 \rightarrow G_{Ab}$  che è isomorfismo perché ha un'inversa.

Sia  $\varphi : G \rightarrow IG/IG^2$ ,  $x \mapsto (x-1) + IG^2$ ,  $\varphi$  è omomorfismo infatti  $\varphi(xy) = (xy-1) + IG^2 = (x-1) + (y-1) + (x-1)(y-1) + IG^2 = (x-1) + (y-1) + IG^2$ .

$IG/IG^2$  è abeliano, quindi  $\varphi$  passa al quoziente e definisce  $\tilde{\varphi} : G_{Ab} \rightarrow IG/IG^2$  ed è ovvio che  $\tilde{\varphi} = \tilde{\psi}^{-1}$ .  $\square$

Quindi, se  $G$  agisce banalmente su  $B$ ,  $H_1(G, B) = \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z}) \cong B \otimes_{\mathbb{Z}} G_{Ab}$ . Osserviamo che il lemma 66 fornisce un isomorfismo di gruppi abeliani e non di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli; ma questo è sufficiente per dire che  $B \otimes_{\mathbb{Z}} IG/IG^2 \cong B \otimes_{\mathbb{Z}} G_{Ab}$ .

*Esercizio 17.* Sia  $G$  gruppo che agisce banalmente su  $A$ ; allora  $H^1(G, A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(G, \mathbb{Z}), A)$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo la solita presentazione  $\mathbb{Z}[G]$ -proiettiva di  $\mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow IG \xrightarrow{\mu} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Applicando  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\cdot, A)$  otteniamo

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) \xrightarrow{\varepsilon^*} \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], A) \xrightarrow{\mu^*} \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A)$$

Ora se  $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], A)$ , allora  $\mu^*(\varphi) = \varphi|_{IG}$  e per ogni  $x \in G$   $\varphi(x-1) = x\varphi(1) - \varphi(1) = \varphi(1) - \varphi(1) = 0$ . Perciò  $\mu^* = 0$  e  $H^1(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^1(\mathbb{Z}, A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A)$ .

Sia  $\varphi : IG \rightarrow A$  omomorfismo di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli, allora  $\varphi((x-1)(y-1)) = \varphi(x(y-1) - (y-1)) = x\varphi(y-1) - \varphi(y-1) = \varphi(y-1) - \varphi(y-1) = 0$ . Quindi  $IG^2 \subseteq \text{Ker } \varphi$  e  $\varphi$  induce un omomorfismo  $\tilde{\varphi} : IG/IG^2 \rightarrow A$ . Perciò possiamo definire un omomorfismo di gruppi abeliani

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(IG/IG^2, A) \\ \varphi &\mapsto \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

Costruiamone un'inversa

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(IG/IG^2, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A) \\ \psi &\mapsto \varphi = \psi \circ \pi \end{aligned}$$

Ora  $\varphi$  è un omomorfismo di gruppi abeliani ma  $x(y-1) - (y-1) = (x-1)(y-1) \in IG^2$  e  $\varphi(x(y-1)) = \psi([x(y-1)]) = \psi([y-1]) = \varphi(y-1) = x\varphi(y-1)$  e quindi  $\varphi$  è un omomorfismo di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli. Inoltre  $IG/IG^2 \cong \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} IG/IG^2 \cong \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}[G]} IG = H_1(G, \mathbb{Z})$  e quindi  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(IG/IG^2, A) \cong \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(G, \mathbb{Z}), A)$ .  $\square$

## 5.1 Digressione topologica

In questa sezione enunceremo qualche applicazione della teoria sviluppata alla topologia algebrica. In particolare vedremo come la coomologia di gruppi può essere utilizzata per calcolare l'omologia (singolare o equivalenti) di spazi topologici.

**Definizione 47.** Uno spazio topologico  $X$  connesso per archi si dice  $n$ -connesso se  $\pi_1(X, *) = \pi_2(X, *) = \dots = \pi_n(X, *)$ .

**Teorema 67** (Hopf). Sia  $(X, x_0)$  uno spazio topologico puntato connesso, localmente semplicemente connesso e tale che il suo rivestimento universale  $\tilde{X}$  sia  $n$ -connesso (con  $n \geq 1$ ). Allora per  $1 \leq i \leq n$

$$H_i(X, \mathbb{Z}) \cong H_i(\pi_1(X, x_0), \mathbb{Z})$$

con  $\pi_1(X, x_0)$  che agisce banalmente su  $\mathbb{Z}$ . Inoltre c'è una successione esatta

$$\pi_{n+1}(X, x_0) \longrightarrow H_{n+1}(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{n+1}(\pi_1(X, *), \mathbb{Z}) \longrightarrow 0$$

In realtà Hopf ha dimostrato soltanto il caso  $n = 1$ .

**Definizione 48.** Uno spazio topologico connesso per archi  $X$  si dice *asferico* se il suo rivestimento universale  $\tilde{X}$  verifica  $\pi_n(\tilde{X}, *) = (0) \forall n \geq 1$ .

Per il teorema di Hopf l'omologia di uno spazio asferico è completamente determinata dall'omologia di gruppi di  $\pi_1(X, *)$ .

**Definizione 49.** Uno spazio topologico “sufficientemente regolare”  $X$  si dice *di Eilenberg-MacLane di tipo  $K(G, n)$*  se

- (1) per  $n = 1$ ,  $\pi_1(X, *) = G$  e  $\pi_n(X, *) = (0) \forall n \geq 2$ ;
- (2) per  $n > 1$ ,  $G$  è abeliano,  $\pi_n(X, *) = G$  e  $\pi_j(X, *) = (0) \forall j \neq n$ .

Gli spazi  $K(G, 1)$  sono asferici. Un esempio di  $K(\mathbb{Z}, 1)$  è  $S^1$ ; infatti sappiamo che il rivestimento esponenziale  $e : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  induce un isomorfismo  $e_* : \pi_n(\mathbb{R}, *) \rightarrow \pi_n(S^1, *)$  se  $n \geq 2$  ed  $\mathbb{R}$  è contrattile.

**Teorema 68.** (1) Per ogni gruppo  $G$  esiste uno spazio  $K(G, 1)$ ,

(2) per ogni gruppo abeliano  $G$  esiste uno spazio  $K(G, n)$ ,

(3) due spazi  $K(G, n)$  hanno lo stesso tipo di omotopia.

**Teorema 69** (Kan-Thurston). Per ogni spazio topologico  $X$  connesso esiste un gruppo  $G_X$  ed una mappa  $\varphi : K(G_X, 1) \rightarrow X$  che induce isomorfismi  $\varphi_* : H_n(K(G_X, 1), \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(X, \mathbb{Z})$ .

Questo teorema è utile perché  $K(G_X, 1)$  è asferico e quindi la sua omologia intera è completamente determinata dall'omologia di gruppi di  $G_X$ .

*Esempio 21.* Consideriamo  $\mathcal{M} = \mathbb{C}^n \setminus (\cup_{i < j} \{x_i - x_j = 0\})$ .  $\mathcal{M}$  è un  $K(G, 1)$ . Un cammino in  $\mathcal{M}$  è un  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^n, t \mapsto (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$  con  $\gamma_i(t) \neq \gamma_j(t) \forall, i \neq j, t \in [0, 1]$ ;  $PB_n = \pi_1(\mathcal{M}, *)$  è il gruppo delle trecce pure.

$S_n$  agisce su  $\mathcal{M}$  permutando le coordinate  $B_n = \pi_1(\mathcal{M}/S_n, *)$  è il gruppo delle  $n$ -trecce. Possiamo considerare la mappa

$$\begin{aligned} \delta : \mathcal{M}/S_n &\rightarrow \mathbb{C}^* \\ [(x_1, \dots, x_n)] &\mapsto \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \end{aligned}$$

$\delta$  induce una fibrazione detta *fibrazione di Milnor*; la fibra  $F$  si dice *fibra di Milnor* e vale

$$H^i(B_n, \mathbb{Z}[[q, q^{-1}]]) \cong H^i(F, \mathbb{Z}), \quad H_i(B_n, \mathbb{Z}[q, q^{-1}]) \cong H_i(F, \mathbb{Z}).$$

dove  $B_n$  agisce su  $\mathbb{Z}[[q, q^{-1}]]$  e su  $\mathbb{Z}[q, q^{-1}]$  mandando ogni generatore nella moltiplicazione per  $q$ . In particolare questo è un esempio di (co)omologia con azione non banale.

## 5.2 Ancora su $H^1(G, A)$

**Definizione 50.** Sia  $G$  un gruppo ed  $A$  uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo; una derivazione è una funzione  $\varphi : G \rightarrow A$  tale che

$$\varphi(xy) = \varphi(x) + x\varphi(y).$$

L'insieme delle derivazioni  $\text{Der}(G, A)$  è un gruppo abeliano con la somma ovvia.

Osserviamo che se  $\varphi$  è una derivazione allora  $\varphi(1) = 0$ ; infatti  $\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = \varphi(1) + 1\varphi(1) = 2\varphi(1)$ .

$\text{Der}(G, \cdot)$  è un funtore  $\mathfrak{M}_{\mathbb{Z}[G]} \rightarrow \mathfrak{Ab}$ .

**Teorema 70.** Il funtore  $\text{Der}(G, \cdot)$  è rappresentato dallo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo  $IG$ , cioè esiste un'equivalenza naturale  $\eta : \text{Der}(G, \cdot) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, \cdot)$ . In particolare

$$\forall A \in \mathfrak{M}_{\mathbb{Z}[G]} \quad \text{Der}(G, A) \cong \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A).$$

*Dimostrazione.* Consideriamo gli omomorfismi di gruppi abeliani

$$\begin{aligned} \eta_A : \text{Der}(G, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A) \\ d &\mapsto (x - 1 \mapsto d(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi_A : \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A) &\rightarrow \text{Der}(G, A) \\ \varphi &\mapsto (x \mapsto \varphi(x - 1)) \end{aligned}$$

Inanzitutto osserviamo che  $\eta_A(d)$  è ben definito come omomorfismo di gruppi abeliani, ma ricordando che  $(xy - 1) = x(y - 1) + (x - 1)$  si ha

$$\begin{aligned} \eta_A(d)(x(y - 1)) &= \eta_A(d)((xy - 1) - (x - 1)) = \\ \eta_A(d)(xy - 1) - \eta_A(d)(x - 1) &= d(xy) - d(x) = xd(y) = x\eta_A(d)(y - 1) \end{aligned}$$

e quindi  $\eta_A(d)$  è un omomorfismo di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli. Ora è chiaro che  $\xi_A = \eta_A^{-1}$  perciò dobbiamo solo vedere che  $\eta$  è una trasformazione naturale. Sia  $\alpha : A \rightarrow A'$  morfismo e sia  $d \in \text{Der}(G, A)$ , allora  $\alpha_*(\eta_A(d))(x - 1) = \alpha(\eta_A(d)(x - 1)) = \alpha(d(x))$  mentre  $\eta_{A'}(\alpha_*(d))(x - 1) = \alpha_*(d)(x) = \alpha(d(x))$  e ci siamo.  $\square$

Definiamo il sottogruppo delle *derivazioni interne*

$$\text{IDer}(G, A) = \{d_a : a \in A\}$$

dove  $d_a(x) = (x - 1)a$ ;  $d_a$  è effettivamente una derivazione, infatti  $d_a(xy) = (xy - 1)a = (x(y - 1) + (x - 1))a = d_a(x) + xd_a(y)$ . Consideriamo la presentazione  $\mathbb{Z}[G]$ -proiettiva di  $\mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow IG \xrightarrow{i} \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

ed applichiamo il funtore  $\text{Hom}(\cdot, A)$

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], A) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A) \longrightarrow H^1(G, A) \longrightarrow 0$$

Ora, identificando  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IG, A)$  con  $\text{Der}(G, A)$  abbiamo che  $i^*\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], A) = \text{IDer}(G, A)$ ; infatti  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], A) \ni (\varphi : 1 \mapsto a) \mapsto \xi(\varphi \circ i) : x \mapsto \varphi(x - 1) = (x - 1)a \in \text{IDer}(G, A)$ . Abbiamo quindi dimostrato che:

**Teorema 71.**  $H^1(G, A) \cong \text{Der}(G, A)/\text{IDer}(G, A)$ .

*Esercizio 18.* Sia  $C_m = \langle x \rangle$  gruppo ciclico di ordine  $m$ .  $C_m$  agisce su  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m$  come  $x(a_1, a_2, \dots, a_m) = (a_m, a_1, \dots, a_{m-1})$ . Quindi  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m$  è uno  $\mathbb{Z}[C_m]$ -modulo e possiamo calcolare la coomologia  $H^1(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m)$ .

Sia  $d \in \text{Der}(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m)$ , allora  $d(e) = 0$  e (si prova per induzione)  $d(x^n) = d(x) + xd(x) + \dots + x^{n-1}d(x)$ . In particolare  $d(x) + xd(x) + \dots + x^{m-1}d(x) = d(x^m) = 0$ ; perciò  $d(x) = (a_1, \dots, a_m)$  tale che  $\sum_{i=1}^m a_i = 0$  e

$$\begin{aligned} \text{Der}(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m) &\cong \text{Ker}(1 + x + \dots + x^{m-1}) = \\ &\{(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m : \sum_{i=1}^m a_i = 0\}. \end{aligned}$$

Inoltre se  $b \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m$   $d_b(x) = (x - 1)b$  e quindi con la stessa identificazione (cioè  $d \mapsto d(x)$ ) abbiamo  $\text{IDer}(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m) \cong \text{Im}(x - 1)$  e  $H^1(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m) =$

*Omologia e coomologia di gruppi*

$\text{Ker}(1 + x + \dots + x^{m-1})/\text{Im}(x - 1)$ . Ma  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^m$  è uno spazio vettoriale (su  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ) e  $(x - 1)$  e  $(1 + x + \dots + x^{m-1})$  sono applicazioni lineari. Ad esempio se  $m = 4$   $x - 1$  è rappresentata dalla matrice

$$[x - 1] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

In generale l'applicazione  $x - 1$  ha rango  $m - 1$  e  $1 + x + \dots + x^{m-1}$  non è l'applicazione nulla (ad esempio non annulla mai l'elemento  $(1, 0, \dots, 0)$ ); quindi per questioni di dimensione abbiamo  $\text{Im } x - 1 = \text{Ker}(1 + x + \dots + x^{m-1})$  e  $H^1(C_m, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = (0)$ .

*Esercizio 19.* Se  $C_2 = \{e, x\}$  agisce su  $\mathbb{Z}$  con  $xn = -n$  calcolare  $H^1(C_2, \mathbb{Z})$ .

*Dimostrazione.* Sia  $n \in \mathbb{Z}$ , perché  $d : x \mapsto n$  sia una derivazione è sufficiente che  $d(x^2) = 0$ , ma  $d(x^2) = d(x) - d(x) = 0$ . Perciò con l'identificazione  $d \mapsto d(x)$  abbiamo  $\text{Der}(C_2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ . Se  $d = d_n : x \mapsto (x-1)n = xn - n = -2n$  e quindi con la stessa identificazione abbiamo  $\text{IDer}(C_2, \mathbb{Z}) \cong 2\mathbb{Z}$  e quindi  $H^1(C_2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .  $\square$

*Esercizio 20.* Calcolare  $H_n(C_m, \mathbb{Z})$  dove  $C_m$  agisce banalmente su  $\mathbb{Z}$ .

*Dimostrazione.* Una risoluzione  $\mathbb{Z}[C_m]$ -proiettiva di  $\mathbb{Z}$  è

$$\dots \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{T} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{T} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

dove  $\varepsilon$  è l'augmentazione,  $T(1) = x - 1$  e  $N(1) = (1 + x + \dots + x^{m-1})$ . Questo è un complesso perché  $T \circ N(1) = N \circ T(1) = (x - 1)(1 + x + \dots + x^{m-1}) = x^m - 1 = 0$ . È chiaro poi che il complesso è proiettivo, mostriamo che è anche aciclico. Sia  $y = \sum_{h=0}^{m-1} a_h x^h \in \mathbb{Z}[C_m]$  con  $y(x - 1) = 0$ . Allora  $y(x - 1) = (a_{m-1} - a_0) + (a_0 - a_1)x + \dots + (a_{m-2} - a_{m-1})x^{m-1}$  e quindi ( $\mathbb{Z}[C_m]$  come gruppo abeliano è libero sugli elementi di  $C_m$ )  $a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = a$  ed  $y = a(1 + x + \dots + x^{m-1})$ ; cioè  $\text{Ker } T = \text{Im } N$ . Invece se  $0 = y(1 + x + \dots + x^{m-1}) = (\sum_{h=0}^{m-1} a_h) + (\sum_{h=0}^{m-1} a_h)x + \dots + (\sum_{h=0}^{m-1} a_h)x^{m-1}$  allora  $\sum_{h=0}^{m-1} a_h = 0$  ed  $y = -(\sum_{h=1}^{m-1} a_h) + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1} = \sum_{h=1}^{m-1} a_h(x^h - 1) \in \langle x - 1 \rangle$  e quindi  $\text{Ker } N = \text{Im } T$ .

Questa è una *risoluzione ciclica di periodo 2*. In particolare se  $H_n$  è non nullo per qualche  $n$  allora ci sono infiniti  $H_i$  non nulli e *non possono esistere risoluzioni proiettive finite di  $\mathbb{Z}$  come  $\mathbb{Z}[C_m]$ -modulo banale*.

Ora  $H_n(C_m, \mathbb{Z}) = \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[C_m]}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ . Applicando il funtore  $\cdot \otimes_{\mathbb{Z}[C_m]} \mathbb{Z}$  ed identificando  $\mathbb{Z}[C_m] \otimes_{\mathbb{Z}[C_m]} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$  il complesso diventa

$$\dots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{m\cdot} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{m\cdot} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

perché  $(x-1) \otimes n = x \otimes n - 1 \otimes n = 1 \otimes xn - 1 \otimes n = 1 \otimes n - 1 \otimes n = 0$  e  $\sum_{h=0}^{m-1} x^h \otimes n = 1 \otimes \sum_{h=0}^{m-1} x^h n = 1 \otimes \sum_{h=0}^{m-1} n = 1 \otimes mn$ . e dunque  $H_0(C_m, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ,  $H_{2n}(C_m, \mathbb{Z}) = (0)$  e  $H_{2n+1}(C_m, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ .  $\square$

*Esercizio 21.* Con le stesse ipotesi dell'esercizio precedente calcolare  $H^n(C_m, \mathbb{Z})$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo la risoluzione  $\mathbb{Z}[C_m]$ -proiettiva dell'esercizio precedente

$$\dots \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{T} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{T} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Applicando il funtore  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(\cdot, \mathbb{Z})$  ed identificando  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(\mathbb{Z}[C_m], \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$  otteniamo il complesso

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{m\cdot} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{m\cdot} \dots$$

Infatti se  $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(\mathbb{Z}[C_m], \mathbb{Z})$   $T^*(\varphi)(1) = \varphi(x-1) = x\varphi(1) - \varphi(1) = \varphi(1) - \varphi(1) = 0$  e  $N^*(\varphi)(1) = \varphi(\sum_{h=0}^{m-1} x^h) = \sum_{h=0}^{m-1} x^h \varphi(1) = m\varphi(1)$ . Perciò  $H^0(C_m, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ ,  $H^{2n+1}(C_m, \mathbb{Z}) = \text{Ker}(m\cdot) = (0)$  e  $H^{2n}(C_m, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ .  $\square$

### 5.2.1 Applicazione: Teorema 90 di Hilbert

28/04/08

Se  $K$  è un campo ed  $E/K$  è un'estensione di Galois; allora  $G = \text{Gal}(E/K)$  agisce in modo ovvio sul gruppo additivo  $(E, +)$  e possiamo considerare  $E$  come uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo.

**Teorema 72** (90 di Hilbert in forma additiva). Sia  $E/K$  un'estensione di Galois finita con gruppo di Galois  $G = \text{Gal}(E/K)$ . Allora  $H^1(G, E) = 0$

*Dimostrazione.* La traccia  $\text{Tr} = \sum_{\tau \in G} \tau$  è combinazione lineare non nulla di caratteri di  $E^*$  a valori in  $E$  e quindi per il teorema di indipendenza dei caratteri di Artin  $\text{Tr} \neq 0$  ed esiste  $\vartheta \in E$  tale che  $\text{Tr}(\vartheta) \neq 0$ .

Sia  $\alpha \in \text{Der}(G, E)$ , dobbiamo fare vedere che  $\alpha$  è interna cioè che esiste  $b \in E$  tale che per ogni  $\sigma \in G$   $\alpha(\sigma) = (1 - \sigma)b$ . Prendiamo  $b = \frac{1}{\text{Tr}(\vartheta)} \sum_{\tau \in G} \alpha(\tau)\tau(\vartheta)$ . Per ogni  $\sigma \in G$  vale

$$\begin{aligned} \alpha(b) &= \frac{1}{\text{Tr}(\vartheta)} \sum_{\tau \in G} \sigma\alpha(\tau)\sigma\tau(\vartheta) = \frac{1}{\text{Tr}(\vartheta)} \sum_{\tau \in G} (\alpha(\sigma\tau) - \alpha(\sigma))\sigma\tau(\vartheta) = \\ &= \frac{1}{\text{Tr}(\vartheta)} \sum_{\tau \in G} \alpha(\sigma\tau)\sigma\tau(\vartheta) - \alpha(\sigma) \frac{1}{\text{Tr}(\vartheta)} \sum_{\tau \in G} \sigma\tau(\vartheta) = b - \alpha(\sigma). \end{aligned}$$

e quindi  $\alpha(\sigma) = b - \sigma(b) = (1 - \sigma)b$  ed  $\alpha \in \text{IDer}(G, E)$ .  $\square$

*Osservazione 28.* Spesso il teorema 90 è enunciato come: Sia  $E/K$  un'estensione ciclica,  $\gamma \in E$  allora  $\text{Tr}(\gamma) = 0 \Leftrightarrow \gamma = \beta - \sigma(\beta)$  per qualche  $\beta \in E$  (dove  $\sigma$  è un generatore di  $\text{Gal}(E/K)$ ). Vediamo come si può ricavare questa forma del teorema.

Sia  $G = C_m = \langle \sigma \rangle$ , una derivazione  $\alpha : C_m \rightarrow E$  è univocamente determinata da  $\alpha(\sigma)$  ed  $\alpha(\sigma) = \gamma$  definisce una derivazione se e solo se  $(1 + \sigma + \sigma^2 + \dots + \sigma^{m-1})\gamma = \text{Tr}(\gamma) = 0$ . Quindi possiamo identificare  $H^1(G, A) = \text{Der}(G, A)/\text{IDer}(G, A) \cong \text{Ker Tr}/(\sigma - 1)E$ .

Ora dal fatto che  $H^1(G, E) = 0$  abbiamo che  $\gamma = \alpha(\sigma) = (1 - \sigma)\beta$  (viceversa è chiaro che se  $\gamma = \beta - \sigma(\beta)$  allora  $\text{Tr}(\gamma) = 0$ ).

**Teorema 73** (Artin-Schreier). Sia  $K$  un campo di caratteristica  $p$ ;  $E/K$  un'estensione ciclica di grado  $p$ ,

(1) allora esiste  $\alpha \in E$  tale che  $E = K(\alpha)$  ed  $\alpha$  è radice di  $x^p - x - a$  con  $a \in K$ ;

(2) viceversa dato  $b \in K$   $x^p - x - b$  ha tutte le radici in  $K$  oppure è irriducibile.

*Dimostrazione.* Facciamo solo il primo punto, in cui si applica il teorema 90.  $\text{Tr}(-1) = -p = 0$  e quindi esiste  $\alpha \in E$  tale che  $-1 = (1 - \sigma)\alpha$  (dove  $\text{Gal}(E/K) = \langle \sigma \rangle$ ) e quindi  $\sigma\alpha = \alpha + 1$  e gli elementi  $\sigma^h\alpha = \alpha + h$  sono tutti distinti. In particolare  $[K(\alpha) : K] = p$  ed  $E = K(\alpha)$ . Per mostrare che  $\alpha$  è radice di  $x^p - x - a$  basta mostrare che  $\sigma(\alpha^p - \alpha) = (\sigma\alpha)^p - \sigma\alpha = (\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) = \alpha^p - \alpha$  e concludere utilizzando la corrispondenza di Galois.  $\square$

Se  $E/K$  è un'estensione di Galois finita e  $G$  è il suo gruppo di Galois possiamo considerare l'azione di  $G$  sul gruppo moltiplicativo  $E^*$ . Utilizzeremo la notazione esponenziale, cioè scriveremo  $\sigma(\gamma) = \gamma^\sigma$ .

**Teorema 74** (90 di Hilbert in forma moltiplicativa). Sia  $E/K$  estensione di Galois finita e  $G = \text{Gal}(E/K)$ , allora  $H^1(G, E^*) = 0$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\alpha \in \text{Der}(G, E^*)$ , dobbiamo mostrare che  $\alpha$  è una derivazione interna. Per il teorema di indipendenza dei caratteri esiste  $\vartheta \in E$  tale che  $\beta = \sum_{\tau \in G} \alpha(\tau)\vartheta^\tau \neq 0$ .

$$\beta^\sigma = \sum_{\tau \in G} \alpha(\tau)^\sigma \vartheta^{\sigma\tau} = \sum_{\tau \in G} \alpha(\sigma\tau)\alpha(\sigma)^{-1}\vartheta^{\sigma\tau} = \alpha(\sigma)^{-1} \sum_{\tau \in G} \alpha(\sigma\tau)\vartheta^{\sigma\tau} = \alpha(\sigma)^{-1}\beta.$$

Da cui  $\alpha(\sigma) = \beta^{1-\sigma}$  ed  $\alpha$  è una derivazione interna.  $\square$

*Osservazione 29.* Anche qui con un ragionamento analogo a quello precedente otteniamo la forma più popolare del teorema di Hilbert. Sia  $E/K$  estensione ciclica,  $\gamma \in E$ , allora  $N(\gamma) = 1 \Leftrightarrow \gamma = \frac{\alpha}{\sigma(\alpha)}$  (dove  $N(\gamma) = \prod_{\sigma \in \text{Gal}(E/K)} \sigma(\gamma)$  è la *norma*).

### 5.3 $\mathbb{Z}[G]$ -risoluzioni proiettive di $\mathbb{Z}$

Ricordiamo che  $H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$  ed  $H_n(G, B) = \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[G]}(B, \mathbb{Z})$ . Perciò per calcolare omologia e coomologia dei gruppi sarebbe utile avere a disposizione delle risoluzioni  $\mathbb{Z}[G]$ -libere standard di  $\mathbb{Z}$  (visto come lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale).

#### 5.3.1 Bar-resolution omogenea

Sia  $B_n$ ,  $n \geq 0$  il gruppo libero abeliano sulle  $n + 1$ -uple  $(y_0, y_1, \dots, y_n)$  con  $y_i \in G$ .  $B_n$  è uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo con l'azione a sinistra

$$\forall y \in G \quad y(y_0, y_1, \dots, y_n) = (yy_0, yy_1, \dots, yy_n).$$

Costruiamo il complesso  $B$

$$\cdots \longrightarrow B_n \xrightarrow{\partial_n} B_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow B_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

dove  $\partial_n$  è il solito bordo simpliciale:

$$\partial_n(y_0, \dots, y_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i (y_0, \dots, \hat{y}_i, \dots, y_n)$$

ed  $\varepsilon$  è l'augmentazione classica;  $B_0 = \langle (1) \rangle_{\mathbb{Z}[G]} \cong \mathbb{Z}[G]$  ed  $\varepsilon$  è data da  $\varepsilon(y_0) = 1$ .

I  $B_n$  sono  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli liberi sulla base

$$\{(1, y_1, \dots, y_n) : y_1, \dots, y_n \in G\}.$$

Infatti questi elementi generano  $B_n$  perché  $(y_0, \dots, y_n) = y_0(1, y_0^{-1}y_2, \dots, y_0^{-1}y_n)$ ; inoltre supponiamo di avere una relazione

$$0 = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{g \in G} m_g^i g \right) (1, y_1^i, \dots, y_n^i) = \sum_{i=1, g \in G}^n m_g^i (g, gy_1^i, \dots, gy_n^i).$$

e gli elementi  $(g, gy_1^i, \dots, gy_n^i)$  sono tutti distinti perché lo sono le prime coordinate. Quindi gli  $m_g^i$  sono tutti nulli e la relazione è banale.

Resta da vedere che il complesso definito è aciclico. Facciamo vedere che l'identità  $id_B : B \rightarrow B$  è omotopicamente nulla. Definiamo  $\Sigma : B \rightarrow B$  morfismo di moduli graduati di grado  $-1$  tale che  $\partial_{n+1}\Sigma_n + \Sigma_{n-1}\partial_n = id_B$ . Basta prendere  $\Sigma_n(y_0, \dots, y_n) = (1, y_0, \dots, y_n)$  e  $\Sigma_{-1}(1) = 1$ . Infatti

$$\begin{aligned} & (\partial_{n+1}\Sigma_n + \Sigma_{n-1}\partial_n)(y_0, \dots, y_n) = \\ & \partial_{n+1}(1, y_0, \dots, y_n) + \Sigma_{n-1} \left( \sum_{h=0}^n (-1)^h (y_0, \dots, \hat{y}_h, \dots, y_n) \right) = \\ & (y_0, \dots, y_n) + \sum_{h=0}^n (-1)^{h+1} (1, y_0, \dots, \hat{y}_h, \dots, y_n) + \\ & \sum_{h=0}^n (-1)^h (1, y_0, \dots, \hat{y}_h, \dots, y_n) = (y_0, \dots, y_n). \end{aligned}$$

Osserviamo che  $\Sigma$  è un omotopia sul *complesso aumentato* (cioè con  $B_{-1} = \mathbb{Z}$  e  $\partial_0 = \varepsilon$  è l'aumentazione) e questo va bene perché prova allo stesso tempo che il complesso è aciclico e che  $H_0(B) = \mathbb{Z}$ .

Per trovare un'altra risoluzione si possono introdurre sui  $B_n$  le relazioni

$$(y_0, \dots, y_i, y_i, y_{i+2}, \dots, y_n) = 0$$

(come si fa spesso in topologia algebrica); in questo modo otteniamo un modulo graduato che è un quoziente di quello costruito prima ed è facile vedere che l'operatore di bordo passa al quoziente e definisce un complesso. Anche l'omotopia  $\Sigma$  passa ai quozienti e quindi il complesso è ancora aciclico ed è semplice vedere che i moduli ottenuti sono ancora liberi.

### 5.3.2 Bar-resolution non omogenea

Definiamo  $B'_n$  come lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo libero sulle  $n$ -uple  $[x_1|x_2|\dots|x_n]$  con  $x_i \in G$ . Il bordo si definisce tramite:

$$\begin{aligned} \partial_n([x_1|x_2|\dots|x_n]) = & x_1[x_2|\dots|x_n] + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [x_1|\dots|x_i x_{i+1}|\dots|x_n] + \\ & (-1)^n [x_1|\dots|x_{n-1}] \end{aligned}$$

e l'aumentazione  $\varepsilon' : B'_0 \rightarrow \mathbb{Z}$  è data da  $\varepsilon'[\ ] = 1$ .

Questo complesso è *isomorfo* a quello precedente (e quindi il complesso è aciclico ed è una risoluzione proiettiva). Infatti, definiamo  $\varphi_n : B_n \rightarrow B'_n$ ,  $\varphi_n(1, y_1, \dots, y_n) = [y_1|y_1^{-1}y_2|y_2^{-1}y_3|\dots|y_{n-1}^{-1}y_n]$  e  $\psi_n : B'_n \rightarrow B_n$ ,  $\psi_n([x_1|\dots|x_n]) = (1, x_1, x_1x_2, \dots, x_1x_2 \dots x_n)$ .  $\varphi$  e  $\psi$  sono isomorfismi ed in particolare  $\varphi^{-1} = \psi$ .

Anche qui possiamo quozientare per il sottocomplesso generato da

$$\{[x_1 | \dots | x_n] : x_i = 1 \text{ per qualche } i\}$$

$\partial_n$  passa al quoziente e  $\varphi$  definisce un isomorfismo con il complesso ottenuto al paragrafo precedente.

*Esercizio 22.* Se  $G$  è un gruppo finito di ordine  $m$  ed  $A$  è un  $G$ -modulo, allora se  $i \geq 1$  ogni elemento di  $H_i(G, A)$  è di  $m$ -torsione (cioè ha ordine un divisore di  $m$ )<sup>1</sup>.

*Dimostrazione.* Consideriamo il complesso aumentato  $\tilde{B}'$

$$\dots \longrightarrow B'_n \xrightarrow{\partial_n} B'_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow B'_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

e costruiamo un'omotopia  $\Sigma : \tilde{B}' \rightarrow \tilde{B}'$  tra la mappa  $m \cdot$  e l'applicazione nulla. Lo facciamo per induzione, sia  $\Sigma_{-1}(1) = \left(\sum_{y \in G} y\right) \square$  (è facile vedere che questo è un omomorfismo di  $\mathbb{Z}[G]$ -moduli), allora  $\varepsilon \circ \Sigma_{-1}(1) = \left(\sum_{y \in G} y\right) 1 = o(G) = m$ . Vediamo il passo induttivo; dobbiamo trovare per ogni  $[x_1 | \dots | x_n] \in B'_n$  un elemento  $c \in B'_{n+1}$  tale che  $\partial_{n+1}c + \Sigma_{n-1} \circ \partial_n[x_1 | \dots | x_n] = m[x_1 | \dots | x_n]$  però

$$\begin{aligned} & \partial_n(\Sigma_{n-1} \circ \partial_n[x_1 | \dots | x_n] - m[x_1 | \dots | x_n]) = \\ & \partial_n \circ \Sigma_{n-1}(\partial_n[x_1 | \dots | x_n]) - m\partial_n[x_1 | \dots | x_n] = \\ & m\partial_n[x_1 | \dots | x_n] - \Sigma_{n-2}\partial_{n-1} \circ \partial_n[x_1 | \dots | x_n] - m\partial_n[x_1 | \dots | x_n] = 0 \end{aligned}$$

e siccome il complesso è aciclico abbiamo  $\Sigma_{n-1} \circ \partial_n[x_1 | \dots | x_n] - m[x_1 | \dots | x_n] = \partial_{n+1}c$  per qualche  $c \in B'_{n+1}$ . Questo prova che per ogni  $i \geq 1$   $(m \cdot)_* : H_i(G, A) \rightarrow H_i(G, A)$  è l'applicazione nulla.  $\square$

*Esercizio 23.* Dato un gruppo  $G$  ed un  $G$ -modulo  $A$ , individuare i 2-cocicli (cioè  $Z^2(G, A)$ ).

*Dimostrazione.* Consideriamo la risoluzione

$$B'_3 \xrightarrow{\partial_3} B'_2 \longrightarrow B'_1 \longrightarrow B'_0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Applichiamo  $\text{Hom}(\cdot, A)$ :

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(B'_0, A) \longrightarrow \text{Hom}(B'_1, A) \longrightarrow \text{Hom}(B'_2, A) \xrightarrow{\partial_3^*} \text{Hom}(B'_3, A)$$

<sup>1</sup>Questo non è vero per  $i = 0$ , infatti se scegliamo  $A = \mathbb{Z}[G]$  allora  $H_0(G, A) = \mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}[G]} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$  non ha  $m$ -torsione

*Omologia e coomologia di gruppi*

Sia  $f \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(B'_2, A)$ ;  $f$  è individuato da una funzione  $F : G \times G \rightarrow A$  ( $f([x|y]) = F(x, y)$ ).  $\partial_3^*(f)([x|y|z]) = f \circ \partial_3([x|y|z]) = f(x[y|z] - [xy|z] + [x|yz] - [x|y]) = xf([y|z]) - f([xy|z]) + f([x|yz]) - f([x|y])$  ed  $f \in Z^2(G, A)$  se e solo se  $\partial_3^*(f) = 0$ ; perciò possiamo identificare  $Z^2(G, A)$  con

$$\{F : G \times G \rightarrow A : xF(y, z) - F(xy, z) + F(x, yz) - F(x, y) = 0 \forall x, y, z \in G\}$$

□

29/04/08

*Osservazione 30.* Se  $A$  è un  $K$ -spazio vettoriale la mappa  $A \rightarrow A, x \mapsto mx$  con  $(m, \text{char } K) = 1$  (o  $\text{char } K = 0$ ) è invertibile ed induce un isomorfismo

$$H^i(G, A) \rightarrow H^i(G, A)$$

dove  $G$  è un gruppo finito che agisce su  $A$ , ed  $o(G) = m$ . Ma sappiamo da un esercizio precedente che la mappa  $m \cdot : B'_i \rightarrow B'_i$  è omotopicamente nulla se  $i \geq 1$ ; perciò

$$H^i(G, A) = (0) \quad \forall i \geq 1.$$

Da questo segue per esempio il teorema di Maschke<sup>2</sup> (la dimostrazione è simile a quella del teorema di Weyl; si veda anche l'esempio 5)

*Osservazione 31.* Se chiamiamo per ogni  $n$   $X_n = \{[x_1 | \dots | x_n] : x_i \in G\}$  allora  $B_n = FX_n$  ( $\mathbb{Z}[G]$ -modulo libero su  $X_n$ ). Nel paragrafo 2.3 abbiamo costruito un'equivalenza naturale  $\eta : \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(F \cdot, A) \rightarrow \mathfrak{S}(\cdot, GA)$  (dove  $G : \mathfrak{Ab} \rightarrow \mathfrak{S}$  è il funtore dimenticante). Gli insiemi  $\mathfrak{S}(X_n, GA)$  possono essere considerati come gruppi abeliani con la somma ovvia e a ben vedere  $\eta$  è un'equivalenza naturale tra i funtori  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(F \cdot, A) : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{Ab}$  e  $\mathfrak{S}(\cdot, GA) : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{Ab}$ . Inoltre possiamo identificare l'insieme  $X_n$  con  $G^n$ ; in questo modo al complesso

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(B_0, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(B_1, A) \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(B_n, A)$$

corrisponde il complesso

$$0 \longrightarrow \mathfrak{S}(\{*\}, A) \longrightarrow \mathfrak{S}(G, A) \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathfrak{S}(G^n, A)$$

dove se  $F : G^n \rightarrow A$  allora

$$\begin{aligned} \partial_n F(x_1, \dots, x_{n+1}) &= x_1 F(x_2, \dots, x_{n+1}) + \\ &\sum_{i=1}^n (-1)^i F(x_1, \dots, x_i x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) + (-1)^n F(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Questo ci permette di presentare la coomologia di gruppi come la coomologia di un complesso concreto *senza* utilizzare il funtore  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n$ <sup>3</sup>.

<sup>2</sup>Si veda [Lan02] e [Ser77]

<sup>3</sup>In alcuni libri la coomologia di gruppi viene definita in questo modo

## 5.4 Prodotti semidiretti ed estensioni

**Definizione 51.** Sia  $G$  un gruppo ed  $A$  un  $G$ -modulo; il *prodotto semidiretto*  $A \times G$  è il gruppo su  $A \times G$  (prodotto cartesiano di  $A$  e  $G$ )

$$\begin{aligned} &\text{con l'operazione} && (a, g)(a_1, g_1) = (a + ga_1, gg_1), \\ &\text{inverso} && (a, g)^{-1} = (-g^{-1}a, g^{-1}), \\ &\text{e neutro} && (0, 1). \end{aligned}$$

*Osservazione 32.* Si tratta del solito prodotto semidiretto di gruppi; se  $G$  ed  $H$  sono gruppi e  $\varphi : G \rightarrow \text{Aut } H$  è omomorfismo il prodotto semidiretto  $H \rtimes_{\varphi} G$  è il gruppo su  $G \times H$  dato da

$$(h_1, g_1)(h_2, g_2) = (h_1\varphi_{g_1}(h_2), g_1g_2).$$

$\varphi$  è un'azione di  $G$  su  $H$  e se  $H$  è abeliano ha una struttura di  $G$ -modulo indotta da  $\varphi$  e i due prodotti semidiretti definiti coincidono.

Se  $G$  è un gruppo ed  $A$  è un  $G$ -modulo la seguente successione di gruppi è esatta

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{i} A \times G \xrightarrow{p} G \longrightarrow 1$$

Questo è il primo esempio di estensione di  $G$  tramite  $A$ .

Dato un gruppo  $G$  ed un gruppo abeliano  $A$  consideriamo una successione esatta di gruppi

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{i} E \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \xleftarrow{s} \end{array} G \longrightarrow 1$$

Sia  $s : G \rightarrow E$  una qualunque funzione tale che  $ps = id_G$  (cioè una *sezione*). Facciamo agire  $G$  su  $iA \cong A$  nel seguente modo:

$$gia = s(g)ias(g)^{-1}$$

$iA = \text{Ker } p \Rightarrow iA \triangleleft E$  e quindi  $g(ia) \in iA$  per ogni  $g \in G$ . Ma vogliamo anche che valga

$$h(gia) = (hg)ia$$

verifichiamolo:  $hg = p(s(hg))$  ma  $h = p(s(h))$ ,  $g = p(s(g))$  e dal fatto che  $p$  è omomorfismo  $p(s(hg)) = hg = p(s(h))p(s(g)) = p(s(h)s(g))$  ed  $s(hg)s(h)^{-1}s(g)^{-1} = ia' \in \text{Ker } p = iA$ . Quindi  $(hg)(ia) = s(hg)ias(hg)^{-1} = s(h)s(g)(ia')(ia)(ia')^{-1}s(g)^{-1}s(h)^{-1}$ . E dal fatto che  $iA \cong A$  è abeliano abbiamo  $(ia')(ia)(ia')^{-1} = ia$  e  $(hg)(ia) = s(h)s(g)(ia)s(g)^{-1}s(h)^{-1} = h(gia)$ .

*Osservazione 33.* L'azione di  $G$  non dipende dalla sezione scelta. Infatti se  $t : G \rightarrow E$  è un'altra sezione allora per ogni  $g \in G$   $p(s(g)) = g = p(t(g))$  e quindi  $t(g)^{-1}s(g) = ia' \in \text{Ker } p = iA$  ed  $s(g)(ia)s(g)^{-1} = t(g)(ia')^{-1}(ia)(ia')t(g)^{-1} = t(g)(ia)t(g)^{-1}$  (dove l'ultima uguaglianza, come prima, viene dal fatto che  $iA$  è abeliano).

**Definizione 52.** Dato un gruppo  $G$  ed un  $G$ -modulo  $A$ , un'estensione di  $G$  tramite  $A$  è una successione esatta di gruppi

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

in cui l'azione di  $G$  su  $A$  costruita come sopra coincide con la struttura di  $G$ -modulo di  $A$ .

**Definizione 53.** Due estensioni si dicono *equivalenti* se esiste un morfismo  $E \rightarrow E'$  tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel & & \\ 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

Come nel caso delle estensioni di moduli tale morfismo è un isomorfismo e quindi quella data è una relazione d'equivalenza.

Indichiamo con  $M(G, A)$  l'insieme delle classi di equivalenza delle estensioni di  $G$  tramite  $A$ .

*Osservazione 34.* Se  $G$  è abeliano possiamo considerare le estensioni di  $G$  come  $\mathbb{Z}$ -moduli  $E(G, A)$ . Se consideriamo  $A$  come lo  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale abbiamo che  $E(G, A) \subseteq M(G, A)$  ma in generale l'inclusione è stretta, infatti le estensioni in  $E(G, A)$  coinvolgono soltanto gruppi abeliani.

*Osservazione 35.* Se  $G$  è un gruppo ed  $A$  un  $G$ -modulo la successione

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow A \times G \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

(dove  $A \times G$  indica il prodotto semidiretto) è un'estensione.

Infatti scegliamo la sezione  $s : G \rightarrow A \times G, g \mapsto (0, g)$ . Allora  $g(a, 1) = (0, g)(a, 1)(0, g)^{-1} = (ga, g)(0, g^{-1}) = (ga, 1)$ , cioè l'azione indotta su  $A$  dalla successione è la stessa che  $G$  aveva su  $A$  come  $G$ -modulo.

Si dice che un'estensione *spezza* se è equivalente a questa successione (ed in effetti in questo caso la sezione  $s$  è un omomorfismo).

*Esercizio 24.* Sia

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow E \xrightarrow{\quad} G \longrightarrow 1$$

$\curvearrowright$   
 $s$

un'estensione. Dimostrare che se la sezione  $s$  è un omomorfismo allora la successione spezza.

*Dimostrazione.* Costruiamo un omomorfismo  $\varphi : A \times G \rightarrow E$  che faccia commutare il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A \times G & \longrightarrow & G \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & E & \xrightarrow{p} & G \longrightarrow 1 \\ & & & & \longleftarrow s & & \end{array}$$

Definiamo  $\varphi(a, g) = i(a)s(g)$ ;  $\varphi$  è omomorfismo, infatti

$$\begin{aligned} \varphi((a_1, g_1)(a_2, g_2)) &= \varphi(a_1 + g_1 a_2, g_1 g_2) = i(a_1)i(g_1 a_2)s(g_1 g_2) = \\ &= i(a_1)s(g_1)i(a_2)s(g_1)^{-1}s(g_1)s(g_2) = i(a_1)s(g_1)i(a_2)s(g_2) = \varphi(g_1, a_1)\varphi(g_2, a_2) \end{aligned}$$

Inoltre  $p \circ \varphi(a, g) = p(i(a))p(s(g)) = g$  e  $\varphi \circ i(a) = \varphi(a, 1) = i(a)$ , cioè il diagramma commuta.  $\square$

Vogliamo arrivare a dire che  $H^2(G, A)$  classifica le estensioni di gruppi. Consideriamo l'estensione

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} G \longrightarrow 1$$

$\longleftarrow s$

dove  $s : G \rightarrow E$  è una sezione; definiamo

$$\begin{aligned} F : G \times G &\rightarrow iA \cong A \\ (x, y) &\mapsto s(x)s(y)s(xy)^{-1} \end{aligned}$$

Osserviamo che  $p(s(x)s(y)s(xy)^{-1}) = 0 \Rightarrow s(x)s(y)s(xy)^{-1} \in \text{Ker } p = iA$ . Ora abbiamo (in notazione moltiplicativa)

$$\begin{aligned} xF(y, z) - F(xy, z) + F(x, yz) - F(x, y) &= \\ (s(x)s(y)s(z)s(yz)^{-1}s(x)^{-1}) (s(xy)s(z)s(xyz)^{-1})^{-1} &= \\ (s(x)s(yz)s(xyz)^{-1}) (s(x)s(y)s(xy)^{-1})^{-1} &= \\ (s(x)s(y)s(z)s(yz)^{-1}s(x)^{-1}) (s(xyz)s(z)^{-1}s(xy)^{-1}) &= \\ (s(x)s(yz)s(xyz)^{-1}) (s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}) &= \\ (s(x)s(yz)s(xyz)^{-1}) (s(xyz)s(z)^{-1}s(xy)^{-1}) &= \\ (s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}) (s(x)s(y)s(z)s(yz)^{-1}s(x)^{-1}) &= \\ s(x)s(yz)s(z)^{-1}s(y)^{-1}s(y)s(z)s(yz)^{-1}s(x)^{-1} &= e. \end{aligned}$$

Dove le parentesi commutano perché  $iA$  è abeliano.

Ma allora  $F$  è un 2-cociclo.

*Esercizio 25.* Se si sceglie un'altra sezione si ottiene una funzione  $F$  che differisce dalla prima per un cobordo (un cobordo è  $F(x, y) = xg(y) - g(xy) + g(x)$  con  $g : G \rightarrow A$  funzione).

*Dimostrazione.* Siano  $s, t : G \rightarrow E$  due sezioni e definiamo  $g : G \rightarrow iA \cong A$  come  $g(x) = s(x)t(x)^{-1}$  (osserviamo che  $p \circ g(x) = e \Rightarrow g(x) \in iA$ ); siano  $F(x, y) = s(x)s(y)s(xy)^{-1}$  e  $H(x, y) = t(x)t(y)t(xy)^{-1}$ , allora

$$\begin{aligned} F(x, y) - H(x, y) - \partial g(x, y) &= \\ &= (s(x)s(y)s(xy)^{-1})(t(x)t(y)t(xy)^{-1})^{-1} \\ &= ((s(x)s(y)t(y)^{-1}s(x)^{-1})(s(xy)t(xy)^{-1})^{-1}(s(x)t(x)^{-1}))^{-1} = \\ &= (s(x)s(y)s(xy)^{-1})(t(xy)t(y)^{-1}t(x)^{-1}) \\ &= (t(x)s(x)^{-1})(s(xy)t(xy)^{-1})(s(x)t(y)s(y)^{-1}s(x)^{-1}) = \\ &= (s(x)s(y)s(xy)^{-1})(s(xy)t(xy)^{-1})(t(xy)t(y)^{-1}t(x)^{-1}) \\ &= (t(x)s(x)^{-1})(s(x)t(y)s(y)^{-1}s(x)^{-1}) = \\ &= s(x)s(y)t(y)^{-1}t(y)s(y)^{-1}s(x)^{-1} = e. \end{aligned}$$

□

*Osservazione 36.* Consideriamo due estensioni equivalenti

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & E & \xrightarrow{p} & G \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \vartheta & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i'} & E' & \xrightarrow{p'} & G \longrightarrow 1 \end{array}$$

e siano  $s : G \rightarrow E$  ed  $s' : G \rightarrow E'$  sezioni, allora  $\vartheta^{-1} \circ s'$  è una sezione di  $p$  e quindi i cocicli  $i^{-1} \circ F$  e  $i^{-1} \circ \vartheta^{-1} \circ H = i'^{-1} \circ H$  differiscono per un cobordo (dove  $F(x, y) = s(x)s(y)s(xy)^{-1}$  e  $H(x, y) = s'(x)s'(y)s'(xy)^{-1}$ ). In particolare estensioni equivalenti inducono lo stesso elemento di  $H^2(G, A)$ .

**Teorema 75.** La costruzione descritta sopra definisce una corrispondenza biunivoca

$$H^2(G, A) \leftrightarrow M(G, A)$$

ed in questo modo si può mettere su  $M(G, A)$  una struttura di gruppo abeliano.

*Dimostrazione.* Abbiamo già dimostrato che la corrispondenza è ben definita; cioè non dipende dalla sezione scelta e dal rappresentante nella classe di equivalenza di estensioni.

Costruiamo un'inversa. Sia  $F : G \times G \rightarrow A$  un cociclo; possiamo supporre che sia  $F(x, 1) = F(1, x) = 0$ , infatti consideriamo  $f : G \rightarrow A$  definita da  $f(x) = F(1, x)$  e definiamo  $F' = F - \partial f$ , dalla condizione di cociclo otteniamo

$$\partial F(x_1, x_2, x_3) = x_1 F(x_2, x_3) - F(x_1 x_2, x_3) + F(x_1, x_2 x_3) - F(x_1, x_2) = 0$$

e ponendo  $x_1 = 1, x_2 = x, x_3 = y$  otteniamo  $F(1, x) = F(1, xy)$  mentre ponendo  $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = 1$  otteniamo  $x F(y, 1) = F(xy, 1)$ . Ora

$$F'(x, y) = F(x, y) - x F(1, y) + F(1, xy) - F(1, x) = F(x, y) - x F(1, y)$$

da cui abbiamo immediatamente che  $F'(1, y) = 0$  mentre  $F'(x, 1) = F(x, 1) - x F(1, 1) = 0$ .

Fissato un cociclo  $F : G \times G \rightarrow A$  tale che per ogni  $g \in G$   $F(g, 1) = F(1, g) = 0$ , definiamo la seguente struttura di gruppo su  $A \times G$  (e indichiamo il gruppo ottenuto con  $A \times_F G$ ):

$$(a_1, g_1)(a_2, g_2) = (a_1 + g_1 a_2 + F(g_1, g_2), g_1 g_2)$$

dobbiamo verificare che quello definito è veramente un gruppo:

- Vediamo l'associativa.

$$\begin{aligned} ((a_1, g_1)(a_2, g_2))(a_3, g_3) &= (a_1 + g_1 a_2 + F(g_1, g_2), g_1 g_2)(a_3, g_3) = \\ &= (a_1 + g_1 a_2 + g_1 g_2 a_3 + F(g_1, g_2) + F(g_1 g_2, g_3), g_1 g_2 g_3) \\ (a_1, g_1)((a_2, g_2)(a_3, g_3)) &= (a_1, g_1)(a_2 + g_2 a_3 + F(g_2, g_3), g_2 g_3) = \\ &= (a_1 + g_1 a_2 + g_1 g_2 a_3 + g_1 F(g_2, g_3) + F(g_1, g_2 g_3), g_1 g_2 g_3) \end{aligned}$$

e dalla condizione di cociclo otteniamo  $F(g_1, g_2) + F(g_1 g_2, g_3) = g_1 F(g_2, g_3) + F(g_1, g_2 g_3)$ .

- Vediamo il neutro.

$$\begin{aligned} (a, g)(0, 1) &= (a + g \cdot 0 + F(g, 1), g) = (a, g) \\ (0, 1)(a, g) &= (0 + 1a + F(1, g), g) = (a, g) \end{aligned}$$

- E adesso l'inverso.

$$\begin{aligned} (a, g)(-g^{-1}a - F(g^{-1}, g), g^{-1}) &= (a - a - gF(g^{-1}, g) + F(g, g^{-1}), 1) = \\ &= (F(g, g^{-1}) - gF(g^{-1}, g), 1) \\ (-g^{-1}a - F(g^{-1}, g), g^{-1})(a, g) &= \\ (-g^{-1}a + g^{-1}a - F(g^{-1}, g) + F(g^{-1}, g), 1) &= (0, 1) \end{aligned}$$

ma dalla condizione di cociclo abbiamo che  $gF(g^{-1}, g) - F(1, g) + F(g, 1) - F(g, g^{-1}) = gF(g^{-1}, g) - F(g, g^{-1}) = 0$ .

*Omologia e coomologia di gruppi*

Definiamo  $p : A \rtimes_F G \rightarrow G$  come  $p(a, g) = g$  (è chiaramente omomorfismo) ed  $i : A \rightarrow A \rtimes_F G$  come  $i(a) = (a, 1)$ ;  $i$  è omomorfismo, infatti  $i(a_1)i(a_2) = (a_1, 1)(a_2, 1) = (a_1 + a_2 + F(1, 1), 1) = (a_1 + a_2, 1) = i(a_1 + a_2)$  ed è chiaro che la seguente successione è esatta

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{i} A \rtimes_F G \xrightarrow{p} G \longrightarrow 1$$

Dobbiamo ancora dire che questa mappa  $H^2(G, A) \rightarrow M(G, A)$  è ben definita, cioè che a cocicli equivalenti corrispondono estensioni equivalenti. Sia  $[F'] = [F]$  con  $F'(g, 1) = F'(1, g) = 0$  per ogni  $g \in G$ . Ora  $F' = F + \partial f$  e  $0 = F'(1, g) = F(1, g) + \partial f(1, g) = \partial f(1, g) = f(g) - f(1) + f(1) = f(g)$ . Consideriamo la mappa  $\varphi : A \rtimes_{F'} G \rightarrow A \rtimes_F G$  definita da  $\varphi(a, g) = (a + f(g), g)$ .  $\varphi$  è omomorfismo, infatti

$$\begin{aligned} \varphi(a_1, g_1)\varphi(a_2, g_2) &= (a_1 + f(g_1), g_1)(a_2 + f(g_2), g_2) = \\ &= (a_1 + g_1a_2 + f(g_1) + g_1f(g_2) + F(g_1, g_2), g_1g_2) = \\ &= (a_1 + g_1a_2 + F(g_1, g_2) + \partial f(g_1, g_2) + f(g_1g_2), g_1g_2) = \\ &= (a_1 + g_1a_2 + F'(g_1, g_2) + f(g_1g_2), g_1g_2) = \\ &= \varphi(a_1 + g_1a_2 + F'(g_1, g_2), g_1g_2) = \varphi((a_1, g_1)(a_2, g_2)). \end{aligned}$$

e adesso è facile vedere che il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i'} & A \rtimes_{F'} G & \xrightarrow{p'} & G \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & A \rtimes_F G & \xrightarrow{p} & G \longrightarrow 1 \end{array}$$

infatti  $\varphi(i'(a)) = \varphi(a, 1) = (a + f(1), 1) = (a, 1) = i(a)$  e  $p'(\varphi(a, g)) = p'(a + f(g), g) = g = p(a, g)$ .

Resta soltanto da vedere che le due mappe sono l'una inversa dell'altra. Sia  $[F] \in H^2(G, A)$ , scegliamo come sezione la mappa  $s : G \rightarrow A \rtimes_F G$ ,  $s(g) = (0, g)$ . All'estensione ottenuta è quindi associato il cociclo

$$\begin{aligned} s(x)s(y)s(xy)^{-1} &= (0, x)(0, y)(0, xy)^{-1} = \\ &= (F(x, y), xy)(-F((xy)^{-1}, xy), (xy)^{-1}) = \\ &= (F(x, y) - xyF((xy)^{-1}, xy) + F(xy, (xy)^{-1}), 1) = (F(x, y), 1) \end{aligned}$$

che è proprio  $F$ . Sia invece  $E$  estensione in  $M(G, A)$ ,  $s : G \rightarrow E$  sezione ed  $F(x, y) = s(x)s(y)s(xy)^{-1}$  il cociclo associato. Scegliendo  $s(1) = 1$  si ha che

$F(x, 1) = F(1, y) = 0$  e possiamo costruire l'estensione  $A \rtimes_F G$ .

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i'} & A \rtimes_F G & \xrightarrow{p'} & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel & & \\ 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & E & \xrightarrow{p} & G & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

definiamo  $\varphi(a, g) = i(a)s(g)$ .  $\varphi$  è omomorfismo, infatti

$$\begin{aligned} \varphi((a_1, g_1)(a_2, g_2)) &= \varphi(a_1 + g_1 a_2 + F(g_1, g_2), g_1 g_2) = \\ &= i(a_1)s(g_1)i(a_2)s(g_1)^{-1}s(g_1)s(g_2)s(g_1 g_2)^{-1}s(g_1 g_2) = \\ &= i(a_1)s(g_1)i(a_2)s(g_2) = \varphi(a_1, g_1)\varphi(a_2, g_2) \end{aligned}$$

e siccome  $s(1) = 1$  il diagramma commuta.  $\square$

*Osservazione 37.* Lo zero di  $M(G, A)$  è rappresentato dalla successione *split*

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow A \times G \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

*Osservazione 38.* Se  $G$  agisce banalmente su  $A$   $H^2(G, A)$  classifica le estensioni

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

dove  $A$  è *centrale* (cioè  $iA < Z(E)$ ).

## 5.5 Cambio di anelli

Sia  $\varphi : \Lambda \rightarrow \Lambda'$  un omomorfismo di anelli. Se  $M$  è un  $\Lambda'$ -modulo possiamo mettere su  $M$  una struttura di  $\Lambda$ -modulo nel seguente modo

$$\lambda \in \Lambda, m \in M \quad \lambda m = \varphi(\lambda)m.$$

In questo modo si definisce un funtore  $U\varphi : \mathfrak{M}_{\Lambda'} \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda}$ .

**Teorema 76.** Siano  $\Lambda, \Lambda'$  anelli ed  $U : \mathfrak{M}_{\Lambda'} \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda}$  funtore

- (1) Se  $U$  ha un aggiunto sinistro  $F : \mathfrak{M}_{\Lambda} \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'}$  e preserva le mappe surgettive, allora  $F$  manda proiettivi in proiettivi.
- (2) Se  $U$  ha un aggiunto destro  $\overline{F} : \mathfrak{M}_{\Lambda} \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'}$  e preserva le mappe iniettive; allora  $\overline{F}$  manda iniettivi in iniettivi.

Omologia e coomologia di gruppi

*Dimostrazione.* Sia  $P \in \mathfrak{M}_\Lambda$  proiettivo e consideriamo

$$\begin{array}{ccc} & FP & \\ & \downarrow \varphi & \\ A & \xrightarrow{\varepsilon} B & \longrightarrow 0 \end{array}$$

$F \dashv U$  e quindi possiamo costruire il seguente diagramma dove  $\eta$  è un'equivalenza naturale.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(FP, A) & \xrightarrow{\eta_{PA}} & \text{Hom}(P, UA) \\ (id, \varepsilon) \downarrow & & \downarrow (id, U\varepsilon) \\ \text{Hom}(FP, B) & \xrightarrow{\eta_{PB}} & \text{Hom}(P, UB) \end{array}$$

Applicando  $\eta$  otteniamo

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \psi \swarrow & \downarrow \eta_{PB}(\varphi) & \\ UA & \xrightarrow{U\varepsilon} UB & \longrightarrow 0 \end{array}$$

dove  $U\varepsilon$  è surgettiva perché  $U$  preserva le mappe surgettive. Allora  $\varphi = \eta_{PB}^{-1}(\eta_{PB}\varphi) = \eta_{PB}^{-1}(U\varepsilon \circ \psi) = \varepsilon \circ \eta_{PA}^{-1}(\psi)$  (dove l'ultima uguaglianza viene dalla naturalità di  $\eta$ ) e quindi

$$\begin{array}{ccc} & FP & \\ \eta_{PA}^{-1}(\psi) \swarrow & \downarrow \varphi & \\ A & \xrightarrow{\varepsilon} B & \longrightarrow 0 \end{array}$$

L'altro punto è analogo, consideriamo i seguenti diagrammi

$$\begin{array}{ccc} & \overline{FI} & \\ \eta_{BI}(\psi) \swarrow & \uparrow \varphi & \\ B & \xleftarrow{\nu} A & \longleftarrow 0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & I & \\ \psi \swarrow & \uparrow \eta_{AI}^{-1}(\varphi) & \\ UB & \xleftarrow{U\nu} UA & \longleftarrow 0 \end{array}$$

Dove  $\eta : \mathfrak{M}_\Lambda(U\cdot, \cdot) \rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'}(\cdot, \overline{F}\cdot)$  è equivalenza naturale e  $\eta_{BI}(\psi) \circ \nu = \eta_{AI}(\psi \circ U\nu) = \eta_{AI}(\eta_{AI}^{-1}(\varphi)) = \varphi$ .  $\square$

Se  $\gamma : \Lambda \rightarrow \Lambda'$  è omomorfismo allora  $U_\gamma$  manda mappe surgettive in mappe surgettive (perché se  $\varphi \in \text{Hom}_\Lambda(M, N)$  allora  $\gamma(\varphi) = \varphi$  come omomorfismi di gruppi abeliani e quindi come funzioni).

$U_\gamma$  si chiama *funtore di cambiamento di anello*. Se consideriamo  $\Lambda'$  come  $\Lambda$ -modulo destro possiamo costruire per ogni  $M \in \mathfrak{M}_\Lambda^l$  il gruppo abeliano

$\Lambda' \otimes_{\Lambda} M$ . Su questo possiamo mettere una struttura di  $\Lambda'$ -modulo sinistro nel seguente modo:

$$\lambda'_1(\lambda'_2 \otimes_{\Lambda} m) = (\lambda'_1 \lambda'_2) \otimes_{\Lambda} m.$$

**Proposizione 77.**  $U_{\gamma}$  ha come aggiunto sinistro il funtore

$$\begin{aligned} F : \mathfrak{M}_{\Lambda} &\rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'} \\ M &\mapsto \Lambda' \otimes_{\Lambda} M \end{aligned}$$

*Dimostrazione.* Dobbiamo costruire un'equivalenza naturale  $\eta : \text{Hom}_{\Lambda'}(\Lambda' \otimes_{\Lambda} \cdot, \cdot) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda}(\cdot, U_{\gamma} \cdot)$ . Sia  $\varphi : \Lambda' \otimes_{\Lambda} A \rightarrow B$  omomorfismo di  $\Lambda'$ -moduli, definiamo  $\eta_{AB}(\varphi)(a) = \varphi(1 \otimes a)$ . Osserviamo che  $\eta_{AB}(\varphi)$  è un omomorfismo di  $\Lambda$ -moduli, infatti è chiaramente omomorfismo di gruppi abeliani e

$$\eta(\varphi)(\lambda a) = \varphi(1 \otimes \lambda a) = \varphi(\gamma(\lambda) \otimes a) = \gamma(\lambda)\varphi(1 \otimes a) = \lambda\eta(\varphi)(a).$$

Inoltre  $\eta$  è naturale, infatti siano  $\alpha : A' \rightarrow A$  e  $\beta : B \rightarrow B'$  e consideriamo il quadrato

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\Lambda'}(\Lambda' \otimes_{\Lambda} A, B) & \xrightarrow{\eta_{AB}} & \text{Hom}_{\Lambda}(A, U_{\gamma} B) \\ (\alpha, \beta) \downarrow & & \downarrow (\alpha, \beta) \\ \text{Hom}_{\Lambda'}(\Lambda' \otimes_{\Lambda} A', B') & \xrightarrow{\eta_{A'B'}} & \text{Hom}_{\Lambda}(A', U_{\gamma} B') \end{array}$$

Sia  $\varphi : \Lambda' \otimes_{\Lambda} A \rightarrow B$ , allora  $(\alpha, \beta) \circ \eta_{AB}(\varphi)(a') = \beta \circ \eta_{AB}(\varphi)(\alpha(a')) = \beta \circ \varphi(1 \otimes \alpha(a'))$ , mentre  $\eta_{A'B'} \circ (\alpha, \beta)(\varphi)(a') = \eta_{A'B'}(\beta \circ \varphi \circ (id \otimes \alpha))(a') = \beta \circ \varphi(1 \otimes \alpha(a'))$ .

Vediamo che  $\eta$  è un'equivalenza. Definiamo  $\xi_{AB} : \text{Hom}_{\Lambda}(A, U_{\gamma} B) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda'}(\Lambda' \otimes_{\Lambda} A, B)$  come  $\xi_{AB}(\psi)(\lambda' \otimes a) = \lambda' \psi(a)$ . Ora se  $\varphi : \Lambda' \otimes_{\Lambda} A \rightarrow B$   $\xi_{AB} \circ \eta_{AB}(\varphi)(\lambda' \otimes a) = \lambda' \eta_{AB}(\varphi)(a) = \lambda' \varphi(1 \otimes a) = \varphi(\lambda' \otimes a)$  e se  $\psi : A \rightarrow U_{\gamma} B$  allora  $\eta_{AB} \circ \xi_{AB}(\psi)(a) = \xi_{AB}(\psi)(1 \otimes a) = \psi(a)$ . Perciò  $\xi_{AB} = \eta_{AB}^{-1}$ .  $\square$

Adesso consideriamo  $\Lambda'$  allo stesso tempo come  $\Lambda$ -modulo sinistro (e quindi possiamo costruire il gruppo abeliano  $\text{Hom}_{\Lambda}(\Lambda', M)$ ) e come  $\Lambda'$ -modulo destro. Possiamo quindi mettere su  $\text{Hom}_{\Lambda}(\Lambda', M)$  la struttura di  $\Lambda'$ -modulo sinistro definita da:

$$\lambda' \varphi(\lambda'_1) = \varphi(\lambda'_1 \lambda').$$

**Proposizione 78.**  $U_{\gamma}$  ha come aggiunto destro il funtore

$$\begin{aligned} \bar{F} : \mathfrak{M}_{\Lambda} &\rightarrow \mathfrak{M}_{\Lambda'} \\ M &\mapsto \text{Hom}_{\Lambda}(\Lambda', M) \end{aligned}$$

*Dimostrazione.* È una generalizzazione del teorema 21. Definiamo  $\eta_{AB} : \text{Hom}_\Lambda(U_\gamma A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda'}(A, \text{Hom}_\Lambda(\Lambda', B))$  come  $\eta_{AB}(\varphi)(a)(\lambda') = \varphi(\lambda'a)$  e come nel teorema 21 si dimostra che  $\eta_{AB}(\varphi)(a) \in \text{Hom}_\Lambda(\Lambda', B)$  e  $\eta_{AB}(\varphi) \in \text{Hom}_{\Lambda'}(A, \text{Hom}_\Lambda(\Lambda', B))$ .

Definiamo anche l'inversa  $\xi_{AB} : \text{Hom}_{\Lambda'}(A, \text{Hom}_\Lambda(\Lambda', B)) \rightarrow \text{Hom}_\Lambda(U_\gamma A, B)$  come  $\xi_{AB}(\psi)(a) = \psi(a)(1)$  e come prima il fatto che  $\xi_{AB}$  sia ben definita e che  $\xi_{AB} = \eta_{AB}^{-1}$  è analogo al teorema 21.  $\square$

**Corollario 79.** (1) Se  $\Lambda'$  è un  $\Lambda$ -modulo sinistro proiettivo (attraverso  $\gamma$ ) allora  $U_\gamma$  manda proiettivi in proiettivi.

(2) Se  $\Lambda'$  è un  $\Lambda$ -modulo destro piatto (attraverso  $\gamma$ ) allora  $U_\gamma$  manda iniettivi in iniettivi.

*Dimostrazione.* (1)  $U_\gamma$  è aggiunto sinistro di  $\bar{F}$  e  $\bar{F} = \text{Hom}_\Lambda(\Lambda', \cdot)$  preserva le mappe surgettive perché  $\Lambda'$  è proiettivo come  $\Lambda$ -modulo e si può applicare il teorema 76 (scambiando  $U$  ed  $F$  nell'enunciato).

(2)  $U_\gamma$  è aggiunto destro di  $F = \Lambda' \otimes_\Lambda \cdot$  e siccome  $\Lambda'$  è piatto come  $\Lambda$ -modulo  $F$  preserva le mappe iniettive e applichiamo il teorema 76.  $\square$

**Proposizione 80.** Sia  $U < G$ , allora  $\mathbb{Z}[G]$  è uno  $\mathbb{Z}[U]$ -modulo libero attraverso l'immersione  $\gamma : \mathbb{Z}[U] \rightarrow \mathbb{Z}[G]$ .

*Dimostrazione.*  $\mathbb{Z}[G]$  è il gruppo abeliano libero su  $G$ , ma  $G = \sqcup Ux$  dove  $Ux$  varia tra le classi laterali destre di  $U$  in  $G$ . Allora come gruppo abeliano  $\mathbb{Z}[G] = \oplus \mathbb{Z}[U]_{Ux}$  dove  $\mathbb{Z}[U]_{Ux}$  è il gruppo abeliano libero su  $Ux$ . Però  $\mathbb{Z}[U]_{Ux}$  è lo  $\mathbb{Z}[U]$ -modulo libero su  $\{x\}$  e quindi  $\mathbb{Z}[G] \cong \oplus_{Ux} \mathbb{Z}[U]$  come  $\mathbb{Z}[U]$ -modulo.  $\square$

Applicando il corollario 79 si ha immediatamente il seguente:

**Proposizione 81.** Ogni  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo proiettivo (iniettivo) è uno  $\mathbb{Z}[U]$ -modulo proiettivo (iniettivo).

*Osservazione 39.* Se  $G$  ha un elemento  $x$  di  $m$ -torsione (cioè se  $G$  contiene una copia isomorfa di  $C_m$ ) non possono esistere risoluzioni  $\mathbb{Z}[G]$ -proiettive finite di  $\mathbb{Z}$  come  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo banale perché altrimenti cambiando gli anelli con l'inclusione  $i : \langle x \rangle \rightarrow G$  si ha una risoluzione  $\mathbb{Z}[C_m]$ -proiettiva finita di  $\mathbb{Z}$  (che non può esistere per l'esercizio 20).

**Teorema 82.** Se  $F$  è il gruppo libero su  $S$ , allora  $IF$  è lo  $\mathbb{Z}[F]$ -modulo libero sull'insieme  $S - 1 = \{s - 1 : s \in S\}$ .

*Dimostrazione.* Mostriamo che, se  $M$  è un  $\mathbb{Z}[F]$ -modulo, ogni funzione  $f : S - 1 \rightarrow M$  si estende in modo unico ad un omomorfismo  $\tilde{f} : IF \rightarrow M$ . L'unicità segue immediatamente dal fatto che  $S - 1$  è un insieme di generatori per  $IF$  (come  $\mathbb{Z}[F]$ -modulo).

Sia  $M \times F$  prodotto semidiretto e consideriamo le proiezioni  $p : M \times F \rightarrow F$  e  $q : M \times F \rightarrow M$  (osserviamo che  $p$  è un omomorfismo di gruppi mentre  $q$  non lo è). Dal fatto che  $f$  è libero su  $S$  sappiamo che esiste un unico omomorfismo  $\bar{f} : F \rightarrow M \times F$  tale che per ogni  $s \in S$   $\bar{f}(s) = (f(s - 1), s)$ . Osserviamo anche che  $p \circ \bar{f} = id_F$  (perché coincidono sui generatori); vogliamo mostrare che  $\tilde{f} = q \circ \bar{f}$  è una derivazione:

$$(\tilde{f}(xy), xy) = \bar{f}(xy) = \bar{f}(x)\bar{f}(y) = (\tilde{f}(x), x)(\tilde{f}(y), y) = (\tilde{f}(x) + x\tilde{f}(y), xy)$$

e quindi  $\tilde{f}(xy) = x\tilde{f}(y) + \tilde{f}(x)$ . Con le notazioni del teorema 70 abbiamo un isomorfismo (naturale)  $\eta_M : \text{Der}(F, M) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(IF, M)$  ed  $\eta_M(\tilde{f})(s - 1) = \tilde{f}(s) = f(s - 1)$ ; cioè  $\eta_M(\tilde{f})$  estende  $f$ .  $\square$

**Corollario 83.** Se  $F$  è un gruppo libero, per  $n \geq 2$ ,  $H^n(F, A) = H_n(F, A) = 0$ .

*Dimostrazione.* Basta osservare che

$$0 \longrightarrow IF \longrightarrow \mathbb{Z}[F] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

è una risoluzione  $\mathbb{Z}[F]$ -libera di  $\mathbb{Z}$ .  $\square$

# Capitolo 6

## Coomologia delle algebre di Lie

05/05/08

**Definizione 54.** Sia  $K$  un campo. Un'algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  è uno spazio vettoriale su  $K$  insieme con un'applicazione bilineare

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

detta *bracket* che soddisfa le condizioni

- (1)  $[x, x] = 0$ ,
- (2)  $[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0$ .

La seconda condizione è detta *identità di Jacobi*. Osserviamo che da queste condizioni e dalla bilinearità del bracket si ottiene  $[x, y] = -[y, x]$ .

Un *omomorfismo* di algebre di Lie è una funzione  $f : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  che sia  $K$ -lineare e verifichi

$$f([x, y]) = [f(x), f(y)].$$

*Esempio 22.* Le seguenti sono algebre di Lie

- $gl(n, K)$  (matrici  $n \times n$ ) con il prodotto  $[A, B] = AB - BA$ ;
- $sl(n, \mathbb{C})$  (matrici a traccia nulla);
- $so(n, \mathbb{C}), so(n, \mathbb{R})$  (matrici che verificano  $A^T = -A$ );
- $su(n, \mathbb{C})$  (matrici che verificano  $\bar{A}^T = -A$ ).

Ad ogni gruppo di Lie è associata un'algebra di Lie come spazio tangente<sup>1</sup>; ad esempio al gruppo  $GL(n, \mathbb{C})$  è associata l'algebra  $gl(n, \mathbb{C})$  con l'applicazione  $e : gl(n, \mathbb{C}) \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$  (l'esponenziale di matrici).

---

<sup>1</sup>Si veda [BM75]

Si può dimostrare che se  $\text{char } K = 0$  ogni algebra di Lie si può immergere in un qualche  $gl(n, K)$ .

**Definizione 55.** Un *ideale* in un algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  è un sottospazio  $I \subseteq \mathfrak{g}$  tale che

$$\forall x \in \mathfrak{g}, y \in I : [x, y] \in I.$$

*Esempio 23.* Consideriamo l'algebra delle matrici triangolari superiori; le matrici strettamente triangolari superiori (cioè quelle con diagonale nulla) formano un ideale.

**Definizione 56.** Un'algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  si dice *abeliana* se per ogni  $x, y \in \mathfrak{g}$   $[x, y] = 0$ .

Nelle algebre di matrici questo vuol dire  $AB = BA$  (da cui il nome abeliana).

## 6.1 Algebra involupante universale

Vogliamo definire l'analogo del *group ring*  $\mathbb{Z}[G]$  nel contesto delle algebre di Lie.

**Algebra tensoriale** Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$ , definiamo per  $n \geq 1$

$$T_n V = \underbrace{V \otimes_K V \otimes_K \cdots \otimes_K V}_{n \text{ volte}}$$

e  $T_0 V = K$ . L'*algebra tensoriale* associata a  $V$  è lo spazio vettoriale  $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} T_n V$  con il prodotto definito da

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)(w_1 \otimes \cdots \otimes w_n) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_n \in T_{m+n} V$$

Il funtore  $T \cdot : \mathfrak{V}_K \rightarrow \mathfrak{Alg}_K$  è aggiunto sinistro del funtore dimenticante  $\mathfrak{Alg}_K \rightarrow \mathfrak{V}_K$ .

L'algebra tensoriale è la *K-algebra libera su V*; cioè per ogni  $K$ -algebra  $A$  ed applicazione lineare  $f : V \rightarrow A$  esiste un'unico omomorfismo di algebre  $Tf : TV \rightarrow A$  che estende  $f$ . Infatti per ogni  $n$

$$Tf(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = f(v_1)f(v_2)\cdots f(v_n)$$

è multilineare in  $v_1, \dots, v_n$  e quindi definisce un'unica mappa lineare  $T_n V \rightarrow A$  e poi si usa la proprietà universale della somma ottenendo una mappa lineare  $Tf : TV \rightarrow A$  che (si vede facilmente) è un omomorfismo di algebre.

**Definizione 57.** Se  $\mathfrak{g}$  è un'algebra di Lie, l'algebra involupante universale associata ad  $\mathfrak{g}$  è l'algebra  $U\mathfrak{g} = T\mathfrak{g}/I$  dove  $I \subseteq T\mathfrak{g}$  è l'ideale generato dagli elementi

$$x \otimes y - y \otimes x - [x, y], \quad x, y \in \mathfrak{g}.$$

In pratica introduciamo su  $T\mathfrak{g}$  le relazioni  $[x, y] = x \otimes y - y \otimes x$ .  $U\mathfrak{g}$  è un'algebra associativa con unità ma possiamo metterci una struttura di algebra di Lie con il prodotto

$$[v, w] = vw - wv, \quad \forall v, w \in U\mathfrak{g}$$

(questo si può fare con ogni algebra associativa). In questo modo (per via delle relazioni introdotte) l'inclusione  $\mathfrak{g} \rightarrow T_1\mathfrak{g} \rightarrow U\mathfrak{g}$  è un omomorfismo di algebre di Lie. Si può dimostrare il seguente (per una dimostrazione si veda [Jac79])

**Teorema 84.** L'inclusione  $\mathfrak{g} \rightarrow U\mathfrak{g}$  è un'immersione di algebre di Lie.

**Definizione 58.** Un'algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  agisce su di uno spazio vettoriale  $V$  se esiste un omomorfismo di algebre di Lie

$$\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$$

dove  $\text{End}(V)$  è un'algebra di Lie col bracket  $[\varphi, \psi] = \varphi \circ \psi - \psi \circ \varphi$ .

Uno spazio vettoriale  $V$  si dice  $\mathfrak{g}$ -modulo se  $\mathfrak{g}$  agisce su  $V$ . In questo caso l'azione di  $\mathfrak{g}$  su  $V$  si estende ad un omomorfismo di algebre di Lie  $U\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$ . Infatti essa si estende ad un omomorfismo di algebre  $T\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$  che conserva il prodotto bracket (se mettiamo su  $T\mathfrak{g}$  la solita struttura di algebra di Lie) e il fatto che  $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$  sia un omomorfismo di algebre di Lie fa sì che l'omomorfismo  $T\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$  rispetti le relazioni e quindi passi al quoziente definendo un omomorfismo  $U\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$ . Cioè, in analogia con il caso dei gruppi, le nozioni di  $\mathfrak{g}$ -modulo e di  $U\mathfrak{g}$ -modulo sono equivalenti. Se  $V$  è un qualunque  $K$ -spazio vettoriale possiamo mettere su  $V$  la struttura di  $U\mathfrak{g}$ -modulo banale, cioè quella ottenuta prendendo come azione  $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$  la mappa nulla.

**Definizione 59.** La mappa  $\varepsilon : U\mathfrak{g} \rightarrow K$ , definita da  $\varepsilon(x) = 0 \quad \forall x \in \mathfrak{g}$  si chiama *augmentazione*;  $I\mathfrak{g} = \text{Ker } \varepsilon$  si dice *ideale di augmentazione*.

Chiamiamo  $i : \mathfrak{g} \hookrightarrow U\mathfrak{g}$  l'immersione; allora  $I\mathfrak{g} = \langle i(\mathfrak{g}) \rangle$ .

## 6.2 Coomologia delle algebre di Lie

**Definizione 60.** Se  $A$  è un  $U\mathfrak{g}$ -modulo definiamo la *coomologia* di  $\mathfrak{g}$  a coefficienti in  $A$  come

$$H^n(\mathfrak{g}, A) = \text{Ext}_{U\mathfrak{g}}^n(K, A)$$

dove  $K$  è lo  $U\mathfrak{g}$ -modulo banale.

*Esempio 24.* In analogia con il caso dei gruppi si ha

$$H^0(\mathfrak{g}, A) = A^{\mathfrak{g}} = \{a \in A : xa = 0 \forall x \in \mathfrak{g}\}$$

gli elementi di  $A^{\mathfrak{g}}$  sono gli *invarianti per l'azione di  $\mathfrak{g}$* .

**Definizione 61.** Un'applicazione lineare  $d : \mathfrak{g} \rightarrow A$  è una *derivazione* se per ogni  $x, y \in \mathfrak{g}$

$$d([x, y]) = xd(y) - yd(x).$$

Una *derivazione interna* è un'applicazione lineare  $d : \mathfrak{g} \rightarrow A$  tale  $\exists a \in A, \forall x \in \mathfrak{g} : d(x) = xa$ .

*Osservazione 40.*  $H^n(\mathfrak{g}, A)$ ,  $\text{Der}(\mathfrak{g}, A)$  e  $\text{IDer}(\mathfrak{g}, A)$  sono  $K$ -spazi vettoriali.

Ancora una volta abbiamo che  $H^1(\mathfrak{g}, A) \cong \text{Der}(\mathfrak{g}, A)/\text{IDer}(\mathfrak{g}, A)$ .

$H^2(\mathfrak{g}, A)$  classifica ancora delle estensioni. In particolare ci interessano le successioni esatte del tipo

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} \mathfrak{h} \xrightarrow{p} \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

dove  $i$  e  $p$  sono omomorfismi di algebre di Lie ed  $A$  è un'algebra abeliana. Come per i gruppi  $\mathfrak{g}$  agisce su  $A$ ; sia  $s : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  una sezione *lineare* di  $p$  (che esiste perché  $\mathfrak{g}$  ed  $\mathfrak{h}$  sono spazi vettoriali). Definiamo l'azione di  $\mathfrak{g}$  su  $iA$  come

$$gi(a) = [s(g), i(a)].$$

Osserviamo che  $iA = \text{Ker } p$  è un'ideale di  $\mathfrak{h}$  e quindi  $gi(a) \in iA$ . Tale azione non dipende dalla sezione scelta, infatti se  $t : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  è un'altra sezione, allora per ogni  $g \in \mathfrak{g}$   $t(g) = s(g) + i(a')$  e per ogni  $a \in A$   $[t(g), i(a)] = [s(g) + i(a'), i(a)] = [s(g), i(a)] + [i(a'), i(a)]$  ma  $[i(a'), i(a)] = i([a', a]) = i(0) = 0$  perché  $A$  è abeliana.

**Definizione 62.** Un'estensione di  $\mathfrak{g}$  tramite un  $\mathfrak{g}$ -modulo  $A$  è una successione esatta di algebre di Lie

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} \mathfrak{h} \xrightarrow{p} \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

dove  $A$  è considerata come algebra abeliana e l'azione di  $\mathfrak{g}$  su  $A$  indotta dalla successione coincide con la struttura di  $\mathfrak{g}$ -modulo di  $A$ .

## Coomologia delle algebre di Lie

Anche qui definiamo il *prodotto semidiretto* tra un  $\mathfrak{g}$ -modulo  $A$  e  $\mathfrak{g}$  come l'algebra di Lie sullo spazio vettoriale  $A \times \mathfrak{g}$  definita da

$$[(a_1, g_1), (a_2, g_2)] = (g_1 a_2 - g_2 a_1, [g_1, g_2]).$$

Questo ci permette di definire l'*estensione split* di  $\mathfrak{g}$  tramite  $A$ :

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow A \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

che è una successione esatta di algebre di Lie. Come al solito definiamo due estensioni equivalenti se esiste un omomorfismo di algebre di Lie  $\mathfrak{h}_1 \rightarrow \mathfrak{h}_2$  tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \mathfrak{h}_1 & \longrightarrow & \mathfrak{g} \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \mathfrak{h}_2 & \longrightarrow & \mathfrak{g} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Indichiamo ancora con  $M(\mathfrak{g}, A)$  l'insieme delle estensioni di  $\mathfrak{g}$  tramite  $A$  modulo equivalenza. Si può dimostrare il seguente (per una dimostrazione si veda [HS97])

**Teorema 85.** Siano  $\mathfrak{g}$  un'algebra di Lie ed  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo; esiste una corrispondenza biunivoca  $H^2(\mathfrak{g}, A) \leftrightarrow M(\mathfrak{g}, a)$

### 6.2.1 Risoluzione speciale

Possiamo costruire una risoluzione  $\mathfrak{g}$ -libera di  $K$ , visto come  $\mathfrak{g}$ -modulo banale, "molto conveniente".

Sia  $\mathfrak{g}$  algebra di Lie e  $V$  il suo spazio vettoriale sottostante. Utilizziamo la seguente notazione Se  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \in \bigwedge^n V$  scriviamo

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

e se  $u \otimes (v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) \in W \otimes_K \bigwedge^n V$  scriviamo

$$u \otimes (v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = u \langle v_1, \dots, v_n \rangle$$

Costruiamo il complesso

$$C_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{\varepsilon} K \longrightarrow 0$$

dove per  $n \geq 1$   $C_n = U\mathfrak{g} \otimes_K \wedge^n V$ ,  $C_0 = U\mathfrak{g}$ ,  $\varepsilon$  è l'augmentazione e il bordo è definito da

$$\begin{aligned} \partial_n \langle x_1, \dots, x_n \rangle &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i \langle x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n \rangle + \\ &\sum_{1 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} \langle [x_i, x_j], x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, \hat{x}_j, \dots, x_n \rangle. \end{aligned}$$

Osserviamo che  $U\mathfrak{g}$  è un  $U\mathfrak{g}$ -modulo nel solito modo e  $\partial_n$  basta definirla sugli elementi del tipo  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$  perché imponiamo che sia una mappa di  $\mathfrak{g}$ -moduli.

Si dimostra<sup>2</sup> in modo non difficile ma molto laborioso che questa è una risoluzione libera di  $K$ .

**Corollario 86.**  $H^s(\mathfrak{g}, A) = 0$ ,  $\forall s \geq \dim \mathfrak{g} + 1$ .

### 6.3 Algebre semisemplici e risolubili

06/05/08

In questa sezione  $K$  è un campo a caratteristica 0 ed  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione finita.

**Definizione 63.** Un'algebra di Lie si dice *semisemplice* se non ha ideali abeliani (eccetto (0)).

Un'algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  può essere vista come  $\mathfrak{g}$ -modulo tramite l'azione (su se stessa) definita da

$$xy = [x, y].$$

In questo modo gli ideali sono tutti e soli i  $\mathfrak{g}$ -sottomoduli. Per i seguenti teoremi si può vedere [Jac79] e [HS97].

**Teorema 87.** Un'algebra di Lie semisemplice è somma diretta di ideali che sono semplici (come algebre di Lie), cioè che non hanno ideali propri:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{h}_n$$

e la somma diretta è (anche) somma di algebre di Lie.

**Teorema 88.** Sia  $\mathfrak{g}$  un'algebra di Lie semisemplice ed  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione finita *semplice e non banale*, allora

$$H^q(\mathfrak{g}, A) = 0 \quad \forall q \geq 0$$

---

<sup>2</sup>si veda [HS97]

### 6.3.1 Lemmi di Whitehead

**Proposizione 89** (Primo lemma di Whitehead). Se  $\mathfrak{g}$  è semisemplice ed  $A$  è un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione finita, allora  $H^1(\mathfrak{g}, A) = 0$ .

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione minima (e finita) tale che  $H^1(\mathfrak{g}, A) \neq 0$ . Supponiamo che  $A$  non sia semplice, allora esiste un ideale  $A' \subsetneq A$  con  $A' \neq (0)$  e possiamo considerare la successione esatta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A/A' \longrightarrow 0$$

Passando alla successione esatta lunga in omologia abbiamo

$$\cdots \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, A') \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, A) \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, A/A') \longrightarrow \cdots$$

ma  $\dim A', \dim A/A' < \dim A$  e quindi  $H^1(\mathfrak{g}, A') = H^1(\mathfrak{g}, A/A') = 0 \Rightarrow H^1(\mathfrak{g}, A) = 0$  che è assurdo.

Quindi  $A$  è semplice e per il teorema precedente è anche banale. Ora  $H^1(\mathfrak{g}, A) \cong \text{Der}(\mathfrak{g}, A)/\text{IDer}(\mathfrak{g}, A)$  ma  $A$  banale  $\Rightarrow \text{IDer}(\mathfrak{g}, A) = (0)$  e quindi  $H^1(\mathfrak{g}, A) \cong \text{Der}(\mathfrak{g}, A)$ .

Ora se  $d : \mathfrak{g} \rightarrow A$  è una derivazione,  $d([x, y]) = xd(y) - yd(x) = 0$  perché  $A$  è banale. Perciò  $\text{Der}(\mathfrak{g}, A) \cong \text{Hom}_K(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], A)$ .  $\mathfrak{g}$  è semisemplice quindi  $\mathfrak{g} = \mathfrak{h}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_n$  con gli  $\mathfrak{h}_i$  semplici. Se  $i \neq j$  allora  $[\mathfrak{h}_i, \mathfrak{h}_j] = 0$ , da cui

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = [\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_1] \oplus \cdots \oplus [\mathfrak{h}_n, \mathfrak{h}_n]$$

Se fosse  $[\mathfrak{h}_i, \mathfrak{h}_i] = 0$   $\mathfrak{h}_i$  sarebbe un ideale abeliano e questo non è possibile perché  $\mathfrak{g}$  è semisemplice, allora ( $\mathfrak{h}_i$  è semplice)  $[\mathfrak{h}_i, \mathfrak{h}_i] = \mathfrak{h}_i$ . Perciò

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = [\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_1] \oplus \cdots \oplus [\mathfrak{h}_n, \mathfrak{h}_n] = \mathfrak{h}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_n = \mathfrak{g}$$

e  $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = 0 \Rightarrow H^1(\mathfrak{g}, A) = \text{Der}(\mathfrak{g}, A) = 0$  che è assurdo.  $\square$

**Definizione 64.** Un  $\mathfrak{g}$ -modulo  $A$  si dice *riducibile* se è somma diretta di  $\mathfrak{g}$ -moduli semplici.

**Teorema 90** (Weyl). Se  $\mathfrak{g}$  è semisemplice ogni  $\mathfrak{g}$ -modulo  $A$  di dimensione finita è riducibile.

*Dimostrazione.* Per induzione su  $\dim_K A$ ; se  $\dim_K A = 1$   $A$  è già semplice e va bene. Vediamo il passo induttivo, se  $A$  è semplice non c'è nulla da dimostrare. Sia  $A' \subsetneq A$  un  $\mathfrak{g}$ -sottomodulo e consideriamo la successione esatta (dove  $A'' = A/A'$ )

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{\nu} A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

Allora la successione

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_K(A'', A') \longrightarrow \text{Hom}_K(A, A') \xrightarrow{\nu^*} \text{Hom}_K(A', A') \longrightarrow 0$$

è esatta (si tratta di spazi vettoriali). Se  $A$  e  $B$  sono  $\mathfrak{g}$ -moduli possiamo mettere una struttura di  $\mathfrak{g}$ -modulo su  $\text{Hom}_K(A, B)$  nel seguente modo (dove  $f : A \rightarrow B$  ed  $x \in \mathfrak{g}$ )

$$(xf)(a) = xf(a) - f(xa)$$

e in questo modo la successione sopra diventa una successione esatta di  $\mathfrak{g}$ -moduli. Gli invarianti di questa azione sono le applicazioni lineari  $f : A \rightarrow B$  con  $f(xa) = xf(a)$  per ogni  $x \in \mathfrak{g}, a \in A$ , cioè gli omomorfismi di  $\mathfrak{g}$ -moduli; in particolare  $H^0(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A, B)) = \text{Hom}_{U\mathfrak{g}}(A, B)$ . Adesso consideriamo la successione esatta in coomologia

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A'', A')) \longrightarrow H^0(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A, A')) \longrightarrow \\ H^0(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A', A')) \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A'', A')) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

per il primo lemma di Whitehead  $H^1(\mathfrak{g}, \text{Hom}_K(A'', A')) = 0$  e quindi possiamo riscrivere la successione come

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{U\mathfrak{g}}(A'', A') \longrightarrow \text{Hom}_{U\mathfrak{g}}(A, A') \xrightarrow{\nu^*} \text{Hom}_{U\mathfrak{g}}(A', A') \longrightarrow 0$$

e quindi esiste  $\delta : A \rightarrow A'$ , omomorfismo di  $\mathfrak{g}$ -moduli, tale che  $\nu^*(\delta) = \delta \circ \nu = id_{A'}$  e la successione

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

spezza. In particolare  $A \cong A' \oplus A''$  e per ipotesi induttiva  $A'$  ed  $A''$  sono somme dirette di  $\mathfrak{g}$ -moduli semplici.  $\square$

**Proposizione 91** (Secondo lemma di Whitehead). Sia  $\mathfrak{g}$  un'algebra di Lie semisemplice ed  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione finita, allora  $H^2(\mathfrak{g}, A) = 0$ .

*Dimostrazione.* Per assurdo sia  $A$  un  $\mathfrak{g}$ -modulo di dimensione minima tale che  $H^2(\mathfrak{g}, A) \neq 0$ . Se  $A$  non è semplice allora esiste un sottomodulo proprio  $A' \subsetneq A$  e possiamo considerare la successione esatta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A/A' \longrightarrow 0$$

e come nel primo lemma di Whitehead passando alla successione esatta in coomologia ed osservando che  $H^2(\mathfrak{g}, A') = H^2(\mathfrak{g}, A/A') = 0$  per minimalità di  $A$  si ha che  $H^2(\mathfrak{g}, A) = 0$  che è assurdo.

Dunque  $A$  è semplice e per il teorema 88 deve essere banale e quindi  $A = K$  (tutti i sottospazi sarebbero  $\mathfrak{g}$ -moduli). Noi sappiamo che  $H^2(\mathfrak{g}, K)$  classifica le estensioni, perciò ci basta dimostrare che ogni estensione di  $\mathfrak{g}$  tramite  $K$  spezza. Consideriamo

$$0 \longrightarrow K \xrightarrow{i} \mathfrak{h} \xrightarrow{p} \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

Sia  $s : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  una sezione lineare di  $p$ .  $s$  induce su  $iK$  l'azione banale ma possiamo fare agire  $\mathfrak{g}$  su tutto  $\mathfrak{h}$  nel seguente modo

$$xh = [s(x), h]$$

Osserviamo che l'azione è ben definita; bisogna infatti che  $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}_K(\mathfrak{h})$  sia un omomorfismo di algebre di Lie, cioè che per ogni  $x, y \in \mathfrak{g}, h \in \mathfrak{h}$  valga  $[s([x, y]), h] = [[s(x), s(y)], h]$ ; ma  $s([x, y]) = [s(x), s(y)] + k$  con  $k \in K$  e, come spazi vettoriali,  $\mathfrak{h} = K \oplus s(\mathfrak{g})$ . Quindi  $h = k' + s(z)$  e

$$[s([x, y]), h] = [[s(x), s(y)], h] + [k, h]$$

e  $[k, h] = [k, k'] + [k, s(z)] = 0$  dove  $[k, k'] = 0$  perché  $K$  è abeliana e  $[k, s(z)] = 0$  perché  $K$  è banale.

Con questa azione  $K$  è un  $\mathfrak{g}$ -sottomodulo di  $\mathfrak{h}$  e per il teorema di Weyl ha un complemento diretto, cioè  $\mathfrak{h} = K \oplus \mathfrak{h}_1$  come  $\mathfrak{g}$ -moduli. Osserviamo che  $\mathfrak{h}_1$  è una sottoalgebra di  $\mathfrak{h}$ , infatti  $[\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_1] \subseteq [\mathfrak{h}, \mathfrak{h}_1] = [K, \mathfrak{h}_1] + [s(\mathfrak{g}), \mathfrak{h}_1] = \mathfrak{h}_1$  dove  $[K, \mathfrak{h}_1] = 0$  come prima e  $[s(\mathfrak{g}), \mathfrak{h}_1] = \mathfrak{h}_1$  per definizione dell'azione di  $\mathfrak{g}$  su  $\mathfrak{h}$  (e per il fatto che  $\mathfrak{h}_1$  è un sottomodulo).

Ora possiamo scegliere la sezione  $s$  in modo che  $s(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{h}_1$ ; per ogni  $x, y \in \mathfrak{g}$  chiamiamo  $k_{xy} \in K$  tale che  $s([x, y]) = [s(x), s(y)] + k_{xy}$ , allora  $k_{xy} = s([x, y]) - [s(x), s(y)] \in \mathfrak{h}_1 \cap K \Rightarrow k_{xy} = 0$  ed  $s$  è omomorfismo di algebre di Lie. In particolare la successione spezza.  $\square$

### 6.3.2 Il teorema di Levi-Malcev

**Definizione 65.** Data un'algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  la sua *serie derivata* è la successione di ideali definita da

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}, \quad \mathfrak{g}_n = [\mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_{n-1}]$$

$\mathfrak{g}$  si dice *risolubile* se esiste  $n \geq 0$  tale che  $\mathfrak{g}_n = 0$  e il minimo di tali  $n$  si dice *lunghezza derivata* di  $\mathfrak{g}$ .

*Esempio 25.* Dato un campo  $K$ , la sottoalgebra di  $gl(n, K)$  delle matrici triangolari superiori è risolubile. Infatti se  $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{g}_n$  allora  $i < j + n \Rightarrow a_{ij} = 0$ .

**Lemma 92.** Sia  $0 \rightarrow \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{i} \rightarrow 0$  successione esatta di algebre di Lie, allora  $\mathfrak{g}$  è risolubile se e solo se lo sono  $\mathfrak{h}$  ed  $\mathfrak{i}$ .

*Dimostrazione.* Possiamo supporre che sia  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  e  $\mathfrak{i} = \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ . Supponiamo che  $\mathfrak{g}$  sia risolubile e sia  $n = l(\mathfrak{g})$ , allora  $\mathfrak{i}_n = \pi(\mathfrak{g}_n) = 0$  e  $\mathfrak{h}_n \subseteq \mathfrak{g}_n = 0$ .

Viceversa siano  $\mathfrak{i}$  ed  $\mathfrak{h}$  risolubili e  $n = l(\mathfrak{h})$ ,  $m = l(\mathfrak{i})$ . Allora  $\pi(\mathfrak{g}_m) = \mathfrak{i}_m = 0 \Rightarrow \mathfrak{g}_m \subseteq \mathfrak{h} \Rightarrow \mathfrak{g}_{m+n} \subseteq \mathfrak{h}_n = 0$ .  $\square$

**Lemma 93.** Se gli ideali  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{g}$  sono risolubili allora anche  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  lo è.

*Dimostrazione.* Basta considerare la successione esatta  $0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \rightarrow 0$ .  $\square$

Dunque ogni algebra di Lie di dimensione finita ha un ideale risolubile massimale  $\mathfrak{r}$ .  $\mathfrak{r}$  si chiama *radicale* di  $\mathfrak{g}$ .

**Proposizione 94.** Sia  $\mathfrak{g}$  un'algebra di Lie ed  $\mathfrak{r}$  il suo radicale, allora  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  è semisemplice.

*Dimostrazione.* Sia  $\mathfrak{a}/\mathfrak{r}$  un ideale abeliano di  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  e consideriamo la successione

$$0 \longrightarrow \mathfrak{r} \longrightarrow \mathfrak{a} \longrightarrow \mathfrak{a}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0$$

$\mathfrak{a}/\mathfrak{r}$  è abeliano e quindi risolubile mentre  $\mathfrak{r}$  è risolubile per definizione; allora  $\mathfrak{a}$  è risolubile e  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{r}$ ; da cui  $\mathfrak{a}/\mathfrak{r} = (0)$ .  $\square$

**Teorema 95** (Levi-Malcev). Ogni algebra di Lie  $\mathfrak{g}$  di dimensione finita è l'estensione split di un'algebra di Lie semisemplice tramite il radicale  $\mathfrak{r}$  di  $\mathfrak{g}$ .

*Dimostrazione.* Per induzione sulla lunghezza derivata di  $\mathfrak{r}$ . Se  $l(\mathfrak{r}) = 1$  allora  $[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] = 0$  ed  $\mathfrak{r}$  è abeliano; in particolare  $\mathfrak{r}$  è un  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ -modulo (l'azione di  $\mathfrak{g}$  su  $\mathfrak{r}$  passa al quoziente). Ma  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  è semisemplice e per il secondo lemma di Whitehead  $H^2(\mathfrak{g}/\mathfrak{r}, \mathfrak{r}) = 0$ ; segue che la successione

$$0 \longrightarrow \mathfrak{r} \longrightarrow \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0$$

spezza. Se invece  $l(\mathfrak{r}) > 1$  consideriamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{r} & \longrightarrow & \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0 \\ & & \pi \downarrow & & \pi \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{r}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] & \longrightarrow & \mathfrak{g}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] & \longrightarrow & \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0 \end{array}$$

dove  $\pi$  sono le proiezioni al quoziente.  $\mathfrak{r}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]$  è un  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ -modulo e la seconda riga è un'estensione. Allora sempre usando il secondo lemma di Whitehead e

il fatto che  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  è semisemplice si ha che la seconda riga spezza. In particolare esiste una sezione  $s : \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \rightarrow \mathfrak{g}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]$  che è un omomorfismo di algebre di Lie. Sia  $s(\mathfrak{g}/\mathfrak{r}) = \mathfrak{h}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]$ ; dal fatto che  $s$  è iniettivo abbiamo  $\mathfrak{h}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  e quindi è semisemplice ed  $[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]$  è il radicale di  $\mathfrak{h}$ . Possiamo quindi considerare

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & & & \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & [\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] & \longrightarrow & \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & \mathfrak{h} & & & & \\
 & \curvearrowleft & \downarrow & & & & \\
 & t & \mathfrak{h}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] & \longrightarrow & \mathfrak{g}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] & \longrightarrow & \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \curvearrowright & & \\
 & & 0 & & s & & 
 \end{array}$$

Dove la colonna spezza perché  $l([\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]) = l(\mathfrak{r}) - 1$  e si applica l'ipotesi induttiva. Quindi esiste una sezione  $t : \mathfrak{h}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] \rightarrow \mathfrak{h}$  che è omomorfismo di algebre di Lie. Consideriamo quindi l'omomorfismo  $t \circ s : \mathfrak{g}/\mathfrak{r} \rightarrow \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ ; chiamiamo  $\pi_1 : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}]$  e  $\pi_2 : \mathfrak{g}/[\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  le proiezioni al quoziente, allora  $\pi = \pi_2 \circ \pi_1 : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  è ancora la proiezione al quoziente e  $\pi \circ t \circ s = \pi_2 \circ \pi_1 \circ t \circ s = \pi_2 \circ s = id_{\mathfrak{g}/\mathfrak{r}}$  e  $t \circ s$  è una sezione per l'estensione originale che in questo modo spezza.  $\square$

**Teorema 96** (Lie). Sia  $K$  un campo di caratteristica 0 e algebricamente chiuso. Sia  $\mathfrak{g}$  un'algebra di Lie risolubile su  $K$  e sia  $\rho$  una rappresentazione di  $\mathfrak{g}$  su di uno spazio vettoriale  $V$  di dimensione finita su  $K$ . Allora esistono  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathfrak{g}^*$  ed una base di  $V$  tali che  $\forall x \in \mathfrak{g}$  sia

$$\rho(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1(x) & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n(x) \end{pmatrix}$$

**Teorema 97** (Ado). Sia  $K$  un campo a caratteristica 0, allora ogni algebra di Lie di dimensione finita possiede un embedding in  $\text{End } V$  con  $V$  spazio vettoriale di dimensione finita.

Le algebre di Lie semisemplici su  $\mathbb{C}$  sono tutte e sole le somme di copie di  $so(n, \mathbb{C})$ ,  $sp(n, \mathbb{C})$ ,  $sl(n, \mathbb{C})$  più cinque algebre speciali:  $G_2, F_4, E_6, E_7, E_8$ . Questo fatto, insieme ai teoremi precedenti, ci permette di caratterizzare le algebre di Lie nel caso complesso.

# Capitolo 7

## Cenni sulle successioni spettrali

**Definizione 66.** Un *modulo bigraduato differenziale*  $E$  su di un anello  $R$  è una collezione di  $R$ -moduli  $E^{pq}$  con  $p, q \in \mathbb{Z}$  ed un differenziale  $d : E \rightarrow E$  di grado  $(r, 1 - r)$  oppure  $(-r, r - 1)$  che soddisfi  $d \circ d = 0$ .

**Definizione 67.** Una *successione spettrale* è una famiglia di  $R$ -moduli bigraduati differenziali  $E = (E_r^{*,*}, d_r)$  dove  $r \in \mathbb{Z}^+$  e  $d_r$  di grado  $(r, 1 - r)$  per ogni  $r$  (oppure di grado  $(-r, r - 1)$  per ogni  $r$ ) e per ogni  $r$  vale  $E_{r+1}^{pq} = H^{pq}(E_r^{*,*}, d_r)$ .

I moduli bigraduati  $E_r^{*,*}$  si dicono *pagine*. Una successione spettrale si dice di *primo quadrante* se per ogni  $r \in \mathbb{Z}^+$   $p < 0$  o  $q < 0 \Rightarrow E_r^{pq} = 0$ . Osserviamo che una successione è di primo quadrante se e solo la pagina  $E_1$  lo è.

*Osservazione 41.* Se  $(E_r, d_r)$  (con  $d_r$  di grado  $(r, 1 - r)$ ) è una successione di primo quadrante allora per ogni  $p, q$  l'elemento  $E_r^{p,q}$  si stabilizza (cioè esiste  $k$  tale che per ogni  $r \geq k$ ,  $E_r^{p,q} = E_k^{p,q}$ ). Infatti sia  $r > p$  ed  $r > q + 1$ , allora  $q + 1 - r < 0 \Rightarrow E_r^{p+r, q+1-r} = 0$  e  $p - r < 0 \Rightarrow E_r^{p-r, q-1+r} = 0$  da cui  $E_{r+1}^{p,q} = H^{p,q}(E_r) = E_r^{p,q}$ .

Omettendo gli indici in alto chiamiamo  $Z_2 = \text{Ker } d_2$ ,  $B_2 = \text{Im } d_2$  (quindi  $E_3 = Z_2/B_2$ ),  $Z_3 = \text{Ker } d_3$ ,  $B_3 = \text{Im } d_3$ . Ora  $d_3 : Z_2/B_2 \rightarrow Z_2/B_2$  e possiamo considerare  $Z_3$  e  $B_3$  come sottomoduli di  $Z_2$  ed iterando otteniamo

$$B_2 \subseteq B_3 \subseteq B_4 \subseteq \dots \subseteq Z_4 \subseteq Z_3 \subseteq Z_2$$

Definiamo quindi  $B_\infty = \cup_{i=0}^\infty B_i$ ,  $Z_\infty = \cap_{i=0}^\infty Z_i$  ed  $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$ .

### 7.0.3 Moduli filtrati differenziali

13/05/08

**Definizione 68.** Una *filtrazione*  $F$  di un  $R$ -modulo  $A$  è una famiglia di sottomoduli  $F^p A = F^p$  con  $p \in \mathbb{Z}$  tale che

$$\dots \subseteq F^{p+1} \subseteq F^p \subseteq F^{p-1} \subseteq \dots \subseteq A.$$

*Cenni sulle successioni spettrali*

Questa è una filtrazione discendente, in modo analogo si definiscono le filtrazioni ascendenti.

*Esempio 26.* Sia  $A = \mathbb{Z}$  ed  $F^p\mathbb{Z} = 2^p\mathbb{Z}$ ; questa è una filtrazione infinita a sinistra ma finita a destra.

$$\dots \subseteq F^p\mathbb{Z} \subseteq \dots \subseteq F^0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

**Definizione 69.** Il *modulo graduato associato ad una filtrazione* è definito come  $E_0^p(A) = F^pA/F^{p+1}A$  (o, nel caso di una filtrazione ascendente  $E_0^p(A) = F^pA/F^{p-1}A$ ).

Supponiamo di lavorare con spazi vettoriali (cioè  $R$  è un campo) e di avere una filtrazione finita ( $F^0 = A$ ,  $F^{N+1} = 0$ ), allora dalla successione esatta  $0 \rightarrow F^1 \rightarrow F^0 \rightarrow E_0^0(A) \rightarrow 0$  (che spezza perché gli oggetti sono spazi vettoriali) abbiamo che  $A = F^0 = E_0^0(A) \oplus F^1$  ed iterando  $A = \bigoplus_{p=0}^N E_0^p(A)$ .

In generale però non è detto che si possa ricostruire il modulo  $A$  conoscendo tutti gli  $E_0^p(A)$ ; potrebbero esserci problemi di estensioni. Se riuscissimo a ricostruire induttivamente tutti gli  $F^pA$  allora potremmo ricostruire anche  $A$ .

Sia  $H^*$  un modulo graduato *filtrato* possiamo filtrare anche  $H^n$  definendo

$$F^pH^n = F^pH^* \cap H^n$$

e possiamo bigraduare il modulo  $E_0H^* = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} F^pH^*/F^{p+1}H^* = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} E_0^pH^*$  nel seguente modo

$$E_0^{pq}(H^*, F) = F^pH^{p+q}/F^{p+1}H^{p+q}.$$

**Definizione 70.** Una successione spettrale  $(E_r^{*,*}, d_r)$  converge al modulo graduato  $H^*$  se esiste una filtrazione  $F$  di  $H^*$  tale che  $E_\infty^{p,q} \cong E_0^{p,q}(H^*, F)$ .

**Definizione 71.** Un *modulo filtrato graduato differenziale* è un modulo

- (1)  $A = \bigoplus_{n=0}^\infty A_n$  (graduato),
- (2) con un differenziale  $d : A \rightarrow A$  di grado 1 o  $-1$  che verifica  $d \circ d = 0$ ,
- (3) con una filtrazione  $F$  di  $A$  tale che  $d : F^pA \rightarrow F^pA$  (cioè  $d$  rispetta la filtrazione).

Vogliamo filtrare la coomologia  $H^*(A)$ , il fatto che  $d$  rispetta la filtrazione ci permette di considerare  $(F^pA, d)$  come un complesso ed in questo modo l'inclusione  $i : F^pA \rightarrow A$  è un morfismo di complessi. Possiamo quindi considerare  $i_* : H^*(F^pA, d) \rightarrow H^*(A, d)$  e definire  $F^pH^*(A) = \text{Im } i_*$  (questa applicazione può non essere iniettiva, ma non importa).

**Teorema 98.** Ogni modulo filtrato graduato differenziale  $(A, d, F)$  determina una successione spettrale  $(E_r^{*,*}, d_r)$ ,  $r = 1, 2, \dots$  con  $d_r$  di grado  $(r, 1-r)$  (o, in notazione omologica, di grado  $(-r, r-1)$ ) ed  $E_1^{p,q} = H^{p+q}(F^p A / F^{p+1} A)$ .

Inoltre se la filtrazione è limitata (cioè se per ogni grado  $n$  esistono  $s(n) \leq t(n) \in \mathbb{Z}$  tali che  $F^{s(n)} A^n = 0$  e  $F^{t(n)} A^n = A$ ) allora la successione converge ad  $H^*(A, d)$  cioè

$$E_\infty^{p,q} \cong E_0^{p,q}(H^*(A, d)) = F^p H^{p+q}(A, d) / F^{p+1} H^{p+q}(A, d).$$

Una volta determinati gli  $E_0^{p,q}$  si può tentare di ricostruire  $H^n(A, d)$  (si dovranno utilizzare i  $p, q$  che verificano  $p + q = n$ ).

### 7.0.4 Coppie esatte

**Definizione 72.** Una *coppia esatta* è data da due moduli  $A, B$  e dai morfismi  $\alpha, \beta, \gamma$  tali che il triangolo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & A \\ & \searrow \gamma & \swarrow \beta \\ & B & \end{array}$$

sia esatto.

*Esempio 27.* Data una successione esatta di complessi

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} B \longrightarrow 0$$

Possiamo considerare la successione esatta lunga in omologia

$$\begin{array}{ccc} H^*(A) & \xrightarrow{a^*} & H^*(A) \\ & \searrow \omega & \swarrow b^* \\ & H^*(B) & \end{array}$$

che è una coppia esatta

*Esempio 28 (Bocksten).* Consideriamo la successione  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$  (dove la prima mappa è la moltiplicazione per  $p$ ) e sia  $C$  un complesso di gruppi liberi abeliani, allora applicando il funtore  $C \otimes_{\mathbb{Z}} \cdot$  otteniamo la successione  $0 \rightarrow C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \rightarrow C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \rightarrow C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$  che è esatta perché il

*Cenni sulle successioni spettrali*

complesso  $C$  è libero. Osservando che  $C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong C$  e prendendo la successione esatta lunga in omologia si ottiene

$$\begin{array}{ccc} H^*(C) & \xrightarrow{\quad} & H^*(C) \\ & \searrow \omega & \swarrow \\ & H^*(C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) & \end{array}$$

che è una coppia esatta.

Data una coppia esatta possiamo costruirne un'altra. Sia

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{i} & D \\ & \searrow k & \swarrow j \\ & E & \end{array}$$

coppia esatta di moduli. Definiamo  $d = j \circ k : E \rightarrow E$ ;  $d$  è un differenziale, infatti  $d \circ d = j \circ (k \circ j) \circ k = 0$ . Siano  $E' = \text{Ker } d / \text{Im } d$ ,  $D' = i(d)$  ed  $i' : D' \rightarrow D'$ ,  $i'(\gamma) \mapsto i(i(\gamma))$ . Costruiamo quindi

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & D' \\ & \searrow k' & \swarrow j' \\ & E' & \end{array}$$

dove  $j'(i(\gamma)) = [j(\gamma)]$  e  $k'([e]) = k(e)$ . Osserviamo che le mappe sono ben definite, infatti se  $i(\gamma_1) = i(\gamma_2)$  allora  $\gamma_2 = \gamma_1 + k(e)$  con  $e \in E$  e  $[j(\gamma_2)] = [j(\gamma_1) + d(e)] = [j(\gamma_1)]$  mentre  $k(e + d(e')) = k(e) + k \circ j \circ k(e') = k(e)$ , inoltre  $e \in \text{Ker } d \Rightarrow k(e) \in \text{Ker } j = \text{Im } i$ . Infine il triangolo costruito è esatto, vediamo perché. Sia  $i'(i(\gamma)) = 0$ , allora  $i(\gamma) = k(e)$  e  $d(e) = j \circ k(e) = j \circ i(\gamma) = 0$ ; sia ora  $j'(i(\gamma)) = 0 \Rightarrow j(\gamma) = d(e) = j(k(e)) \Rightarrow \gamma = k(e) + i(\gamma_1)$  ed  $i(\gamma) = i \circ k(e) + i(i(\gamma_1)) = i'(i(\gamma_1))$ , inoltre se  $k'([e]) = k(e) = 0$  allora  $e = j(\gamma)$  e  $[e] = j'(i(\gamma))$ . Quindi  $(D', E', i', j', k')$  è una coppia esatta.

**Definizione 73.**  $(D', E', i', j', k')$  si dice *coppia derivata* di  $(D, E, i, j, k)$ .

In questo modo se  $C$  è una coppia esatta possiamo costruire le successive coppie derivate  $C, C', C'', \dots, C^{(n)}$ .

**Teorema 99.** Siano  $D^{*,*}$  ed  $E^{*,*}$  moduli bigraduati e

$$\begin{array}{ccc} D^{*,*} & \xrightarrow{i} & D^{*,*} \\ & \searrow k & \swarrow j \\ & E^{*,*} & \end{array}$$

coppia esatta dove  $i$ ,  $j$  e  $k$  sono morfismi di moduli bigraduati con  $i$  di grado  $(-1, 1)$ ,  $j$  di grado  $(0, 0)$  e  $k$  di grado  $(1, 0)$ . Allora è determinata una successione spettrale  $(E_r^{*,*}, d_r)$  con  $E_1^{*,*} = E^{*,*}$ ,  $E_2^{*,*} = (E^{*,*})'$ ,  $\dots$ ,  $E_r^{*,*} = (E^{*,*})^{(r-1)}$  e  $d_r = j^{(r-1)} \circ k^{(r-1)}$ .

*Dimostrazione.* Che  $E_{r+1}^{p,q} = H^{p,q}(E_r^{*,*}, d_r)$  è vero per definizione; quindi l'unica cosa da dire è che  $d_r$  ha grado  $(r, 1 - r)$ . Ma si mostra facilmente per induzione che  $i^{(r)}$  ha grado  $(-1, 1)$ ,  $j^{(r)}$  ha grado  $(r, -r)$  e  $k^{(r)}$  ha grado  $(1, 0)$ ; perciò  $d_r = j^{(r-1)} \circ k^{(r-1)}$  ha grado  $(r - 1 + 1, -r + 1) = (r, 1 - r)$ .  $\square$

Torniamo adesso al problema di calcolare l'omologia di un complesso filtrato. Sia  $A$  un modulo graduato differenziale; possiamo considerare la successione esatta corta di complessi  $0 \rightarrow F^{p+1}A \rightarrow F^pA \rightarrow F^pA/F^{p+1}A \rightarrow 0$  (è una successione di complessi perché  $d$  rispetta la filtrazione) e passare alla successione esatta lunga in coomologia

$$H^{p+q}(F^{p+1}A) \rightarrow H^{p+q}(F^pA) \rightarrow H^{p+q}(F^pA/F^{p+1}A) \rightarrow H^{p+q+1}(F^{p+1}A) \rightarrow H^{p+q+1}(F^pA) \rightarrow H^{p+q+1}(F^pA/F^{p+1}A)$$

Definiamo i moduli bigraduati  $D^{p,q} = H^{p+q}(F^pA)$  ed  $E^{p,q} = H^{p+q}(F^pA/F^{p+1}A)$ , possiamo quindi riscrivere la successione esatta lunga come

$$D^{p+1,q-1} \rightarrow D^{p,q} \rightarrow E^{p,q} \rightarrow D^{p+1,q} \rightarrow D^{p,q+1} \rightarrow E^{p,q+1}.$$

Abbiamo, cioè, costruito la coppia esatta

$$\begin{array}{ccc} D^{*,*} & \xrightarrow{i} & D^{*,*} \\ & \swarrow k & \searrow j \\ & E^{*,*} & \end{array}$$

dove  $i$  ha grado  $(-1, 1)$ ,  $j$  ha grado  $(0, 0)$  e  $k$  ha grado  $(1, 0)$ . Da questa possiamo estrarre una successione spettrale usando il teorema 99 (perché le mappe hanno il grado giusto) e questa successione coincide con quella del teorema 98. Però adesso conosciamo tutte le pagine e tutti i differenziali; in questo modo possiamo calcolare  $E_\infty^{*,*}$  e quindi  $H^*(A)$ .

# Bibliografia

- [AHS90] J. Adámek, H. Herrlich, and G.E. Strecker. *Abstract and concrete categories: the joy of cats*. Wiley, 1990.
- [Ber91] P. Bernays. *Axiomatic Set Theory*. Courier Dover Publications, 1991.
- [BM75] W.M. Boothby and W. Munger. *An introduction to differentiable manifolds and Riemannian geometry*. Academic Press New York, 1975.
- [GY03] S.I. Gelfand and I. Manin Yuri. *Methods of homological algebra*. Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
- [Hat] A. Hatcher. *Spectral sequences in Algebraic Topology*.
- [Hat02] A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.
- [HS97] P.J. Hilton and U. Stammbach. *A Course in Homological Algebra*. Springer, 1997.
- [Jac79] N. Jacobson. *Lie Algebras*. Courier Dover Publications, 1979.
- [Lan02] S. Lang. *Algebra*. Springer, 2002.
- [McC00] J. McCleary. *A users guide to spectral sequences*. Cambridge Univ. Press, 2000.
- [Sch] S. Schröer. Baer's result: the infinite product of the integers has no basis. *Amer. Math. Monthly* (to appear).
- [Ser77] J.P. Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Springer Verlag, 1977.

# Indice analitico

- $G$ -modulo, 90
- $H^0(G, A)$ , 91
- $H^1(G, A)$ , 96
- $H^2(G, A)$ , 107
- $H_0(G, A)$ , 92
- $K[G]$ , 5
- $U\mathfrak{g}$ -modulo, 116
  - banale, 116
- $\Lambda^{opp}$ , 4
- $\mathfrak{G}^{opp}$ , 30
- $\mathfrak{g}$ -modulo, 116
  - riducibile, 120
- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ , 20
- $\mathbb{Z}[G]$ -modulo, 90
- abelianizzato, 30, 92
- algebra
  - di Lie, 114
    - abeliana, 115
    - risolubile, 122
    - semisemplice, 119
    - semplice, 119
  - invilupante universale, 115
  - libera, 115
  - polinomiale, 38
  - tensoriale, 38, 115
- anello commutativo, 66
  - parte di  $r$ -torsione, 66
- augmentazione, 90, 116
- bar-resolution non omogenea, 101
- bar-resolution omogenea, 100
- base, 17
- bifuntore, 49, 52
  - bilanciato, 89
- bordo, 71
- bracket, 114
- caratteristica di Eulero, 71
- categoria, 28
  - additiva, 67, 68
  - equivalenza, 31
- catena, 71
- ciclo, 71
- classe, 28
- complesso
  - aciclico, 79
  - augmentato, 101, 102
  - derivato, 71
  - di catene, 67
  - positivo, 79
  - proiettivo, 79
- conucleo, 5, 41, 61
- coomologia
  - di algebre di Lie, 116
  - di gruppi, 90
- coppia derivata, 128
- coppia esatta, 127, 129
- coprodotto, 33, 41, 61, 68
- costruzione universale, 32
- derivazione, 95, 117
  - interna, 96, 117
- dominio ad ideali principali, 15, 17, 20, 62, 63
- dominio d'integrità, 20, 62
- equivalenza naturale, 31

*Indice analitico*

- equivalenza omotopica, 78
- estensione
  - banale, 42
  - di moduli, 42
  - di un'algebra di Lie tramite un  $\mathfrak{g}$ -modulo, 117
  - di un gruppo tramite un  $G$ -modulo, 104
  - equivalenza, 42
  - spezza, 49, 105
  - split, 118
  - zero, 110
- estensione ciclica, 98
- estensione di Galois, 98
  
- fibrazione di Milnor, 95
- filtrazione, 125
- functore, 30
  - $E(\cdot, \cdot)$ , 42, 53
  - $\text{Ext}$ , 42, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 85, 87
  - $\text{Hom}$ , 7, 8, 30
  - $\text{Tor}$ , 63, 76, 89
  - additivo, 69, 77
  - aggiunto destro, 38, 41, 110, 112
  - aggiunto sinistro, 38, 40, 60, 110, 111
  - biduale, 32
  - cambiamento di anello, 111
  - controvariante, 30
  - derivato, 49, 79, 82
  - dimenticante, 37, 38
  - duale, 38
  - fedele, 31
  - full embedding, 31
  - identico, 30
  - isomorfismo, 30
  - pieno, 30
  - rappresentato, 30, 95
  
- gruppo, 30
  - degli omomorfismi, 7
  - delle trecce, 94
  - delle trecce pure, 94
  - di torsione, 33
  - finito, 101
  - fondamentale, 30
  - libero, 38, 113
  - gruppo abeliano, 22, 58, 65, 66
    - colibero, 22
    - divisibile, 21
    - finitamente generato, 14, 20, 58, 71, 72
    - parte di  $m$ -torsione, 65
    - torsione, 59
  - ideale, 115
  - ideale di augmentazione, 90, 92, 116
  - identità di Jacobi, 114
  - inclusione, 10, 33, 68
  - insieme, 29
    - di cardinalità 2, 33
    - parzialmente ordinato, 30
  - invarianti
    - di un  $U\mathfrak{g}$ -modulo, 117
    - di uno  $\mathbb{Z}[G]$ -modulo, 92
  - legge di composizione, 28
  - Lemma
    - del serpente, 83
    - di Whitehead, 119, 121
  - lunghezza derivata, 122
  - modulo, 4
    - bigraduato differenziale, 125
    - colibero, 24, 25
    - destro, 5
    - di omologia, 71
    - divisibile, 20, 21
    - filtrato graduato differenziale, 126
    - finitamente generato, 17, 63
    - graduato, 67
      - associato ad una filtrazione, 126

- filtrato, 126
- iniettivo, 18, 20, 25, 49, 110, 113
- libero, 10, 15, 17, 37, 63, 112
- libero da torsione, 62, 63
- piatto, 61, 62
- proiettivo, 9, 11, 13, 17, 49, 61, 110, 113
- sinistro, 4
- morfismo, 28
  - di complessi, 67
  - di moduli graduati, 67
- nucleo, 39, 40
- oggetto, 28
  - iniziale, 34
  - libero, 38
  - terminale, 34
  - zero, 29
- omologia, 71, 79
  - di gruppi, 90
  - di un complesso filtrato, 129
- omomorfismo
  - di algebre di Lie, 114
  - di connessione, 73, 84
  - di moduli, 5
- omotopia, 77, 79, 81
- pagina, 125
- parte di torsione, 76
- presentazione
  - iniettiva, 59
  - piatta, 66
  - proiettiva, 50, 52, 63
- prodotto, 32, 40, 68, 69
  - diretto, 11, 18
  - libero, 34
  - semidiretto, 103, 117
    - di gruppi, 103
- prodotto tensore, 60, 61
- proiezione, 11, 32
- proprietà universale
  - del conucleo, 39
  - del coprodotto, 33
  - del nucleo, 39
  - del prodotto, 11, 32
  - del pull back, 34
  - della somma, 10
- pull back, 34, 40, 43–45
  - in  $\mathfrak{G}$ , 35
  - in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ , 35
  - in  $\mathfrak{S}$ , 35
- push out, 36, 41
  - in  $\mathfrak{G}$ , 36
  - in  $\mathfrak{M}_\Lambda^l$ , 36
- quadrato commutativo, 64
  - immagine, 64
  - nucleo, 64
- quoziente, 21
- radicale, 123
- rango, 71, 72
- rappresentazione di un gruppo finito, 27
- rappresentazione di un'algebra di Lie, 124
- risoluzione
  - $\mathfrak{g}$ -libera di  $K$ , 118
  - incompleta, 85
  - iniettiva, 81
  - proiettiva, 78, 79
    - esistenza, 81
    - finita, 97, 113
- rivestimento universale, 94
- serie derivata, 122
- small category, 28
- sollevamento, 50, 79, 81
- somma diretta, 10, 34, 69
  - di moduli divisibili, 22
- sottocategoria, 29, 31
  - piena, 29, 31
- sottogruppo, 30

*Indice analitico*

- di torsione, 33, 66
- divisibile massimale, 22
- sottomodulo, 15, 17, 25
- spazio topologico
  - $n$ -connesso, 93
  - asferico, 94
  - di Eilenberg-MacLane, 94
- spazio vettoriale, 14, 26, 31, 71, 116
  - biduale, 32
- successione
  - Hom-Ext, 75, 85
  - derivata, 50
  - esatta lunga
    - in (co)omologia, 73
    - in (co)omologia di gruppi, 91
    - per i funtori derivati, 84, 87
  - esatta sui proiettivi, 87
  - spezza, 12, 13, 55
- successione spettrale, 125, 127, 129
  - convergenza, 126
  - di primo quadrante, 125
- Teorema
  - 90 di Hilbert in forma additiva, 98
  - 90 di Hilbert in forma moltiplicativa, 99
  - dei divisori elementari, 17
  - di Ado, 124
  - di Artin-Schreier, 99
  - di Hopf, 94
  - di Kan-Thurston, 94
  - di Levi-Malcev, 123
  - di Lie, 124
  - di Stein-Serre, 59
  - di Weyl, 120
- tipo di omotopia, 78
- traccia, 98
- trasformazione naturale, 24, 31, 32, 51
  - componenti, 31
- unione disgiunta, 34
- zero, 55, 68